

中草药 资料大全

红软基地 www.rsdown.cn（压制）

序列号	草药名称	草药别名	草药科目	草药简介	OK
1	一点红	散血丹、红背莲、 叶下红、羊蹄草、 紫背草、红背草	菊科	植物形态：一年生草本。高10~40厘米。叶互生，稍为肉质，下部叶通常卵形，琴状分裂成具钝齿，上叶部常小而全缘，无柄，且多少抱茎，叶背面紫红色。花紫红色，头状花序顶生，圆筒状，长12~14毫米，具长柄，总苞绿色，基部膨大，约与花冠等长，花全为管状。瘦果狭圆柱形，有棱，冠毛白色，细柔。 生态分布：产我国长江以南各省，各地田边、沟边有生长。 药用部分：全草入药，夏秋季采集。 用途：性味苦、辛，凉。能清热解毒，散血，消肿止痛。治疮毒，损伤，痢疾，咽喉炎，乳疮，湿疹，蛇伤。 用量：3钱~1两。外用不拘。	
2	一年蓬	千层塔，野蒿，治 疟草，姬女苑。	菊科	植物形态：一年生草本。高约60厘米，茎直立，多分枝，具有纵条纹及短柔毛，老时基部木质化。叶互生，基生叶卵形，倒卵形以至匙形，长6~15厘米，宽2~7厘米，基部渐狭，全缘，先端尖或钝，边缘具粗齿，有时成不规则的羽状分裂，两面均有短柔毛，具长叶柄；上部叶有短柄，或几无柄，倒卵形，长随圆形或披针形，先端尖，边缘有2~4锯齿，中部以下渐狭而全缘；在枝上或近茎梢着生的叶呈线形或线状披针形，通常全缘。花淡紫色至粉红色，中部黄色，头状花序呈伞房状排列，边缘为雌性的舌状花，中央为两性的管状花。瘦果狭而扁，具刺毛状白色冠毛。 生态分布：产我国中部至南部各省；多生于原野、路旁及屋旁荒地。 药用部分：全草入药。夏季采用。 用途：全草治痢疾，有良效。	
3	一见喜	圆锥须药草，穿心 莲，榄核莲，斩蛇 剑，苦胆草。	爵床科	植物状态：一年生草本，高达1米。茎方形，有棱，分枝多，节稍膨大；茎及叶有苦味。叶对生，卵状椭圆形，长2~8厘米，款1.5~3厘米，基部楔形，先端渐尖，全缘，叶柄短或近于无柄。花白色，花冠近唇形，顶生或腋生聚伞花序，苞片小，萼小，5深裂，花冠纤弱，2唇形，雄蕊2枚，子房上位，2室。蒴果长椭圆形，长约1.5厘米，宽约0.5厘米，2瓣裂，果瓣的背中部有槽；种子有种钩。 生态分布：我国南部有栽植。 药用部分：全草及叶入药；夏季采叶，凉干，秋季采全草，洗净，切段，晒干备用，或研成细粉备用。 用途：性味苦，寒。能清热解毒、消肿止痛。主治急性菌痢，胃肠炎；感冒发烧、扁挑腺炎、咽喉炎、肺炎；疮疖肿毒、外伤感染；肺结核；毒蛇咬伤。用量：3~5钱，水煎服；干粉5份~1钱，冲服，每日3次。外用浸酒或以酒调干粉涂患处。	
4	一支香	兔耳一支香，杏香 兔耳风，铁火掀兔 儿风，石母香。	菊科	植物形态：多年生草本，高30~60厘米。根茎较短，匍匐；花茎单一，直立，不分枝，有棕色茸毛。叶5~6片，聚生基部呈莲座状，平铺地表，卵状长椭圆形，长约5~10厘米。宽2.5~3.5厘米，基部心形，先端钝，全缘或呈波状，背面呈紫红色，叶柄3~10厘米。花白色，头状花序，细长有短柄或近无柄，在花茎上排成总状花序，花全为营状花花冠5裂。瘦果披针形，冠毛多数，羽状。 生态分布：产我国中部及南部各省；多生于丘陵山地，林边或灌丛边。 叶平贴地面，只有花茎直立，故名一支香。 药用部分：全草或根入药，秋夏采用。 用途：性味甘、谈，寒。能消炎解毒，止血生肌，舒筋活血，发表祛风，治跌打损伤，风湿痹痛，斑痧闭症，穿板龟，疖肿疗毒，肠痛，毒蛇咬伤，用量：2~5钱，外用不拘。	
5	一枝黄花	开喉剑，见血飞， 大败毒，黄花草， 大叶泥鳅窜，一支 香，山马兰。	菊科	植物形态：多年生草本。高20~70厘米。茎直立，光滑，暗红色，不分枝。叶互生，根生叶椭圆形或长卵形，长3~6.5厘米，宽1~3厘米，基部浑圆，先端尖或钝圆，边绿细疏齿，叶片下延成翼，有长柄；茎上叶互生，卵圆形至长圆形，长1~2.5厘米，基部楔形或下延成柄，先端尖，近全绿，叶面有疏毛。花黄色，头状花序，顶生或腋生，排列成总状，边缘为舌	

			<p>状花，中央管状花。瘦果圆柱形，光滑或有小柔毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各省，生长于丘陵山坡及路边。</p> <p>药用部分：全草及根供药用，夏秋采药。</p> <p>用途：性味辛、苦，微温。能疏风解毒，退热行血，消肿止痛，散寒止呕，去头风。治毒蛇咬伤，喉咙肿痛，跌打扭伤，疖疮感染。用量：全草3钱~1两。外用不拘。</p>
6	七叶一枝花	草河车，重楼，七叶莲，七枝莲，多叶重楼，金钱重楼，铁灯台，蚤休。	<p>百合科，延龄草科。</p> <p>植物形态：多年生草本，全株滑无毛，根茎横生，指状，直径1~2厘米，外皮黄褐色，内面白色。茎直立，单生，高30~100厘米，叶4~9片，轮生茎顶，长椭圆或倒披针形，长7.5~15厘米，先端渐尖，基部浑圆形或楔尖，有主脉3条，表面深绿色；叶柄短，长约1厘米。花黄绿色，单生于叶轮之上；花被外轮4~6片，广披针形，有3脉；内轮花被丝状，黄色；雄蕊常10枚，子房上位，3室。浆果绿色，熟后3~6裂。</p> <p>生态分布：产我国南部和西南部，多生长于阔叶林下或林边以及溪边阴湿处。</p> <p>药用部分：根茎入药，以秋季采集最好。</p> <p>用途：为常用的民间草药，根茎捣烂或用酒研磨敷治毒蛇咬伤，跌打损伤及无名肿毒有效。谚语：“藏有七叶一枝花，毒蛇不进家”。性味苦、微寒，有小毒。为清热解毒药，能清热散结，退肿，解毒蛇，治肿痛，瘰癧，腮腺炎，阑尾炎，乳腺炎，乳癌，疟疾，惊痫，蛇虫药伤。又能治扁桃腺炎和喉炎等。用量：1~5钱，外用适量。</p>
7	八角乌	铁冬苋，独脚莲，马蹄莲。	<p>菊科</p> <p>植物形态：常绿多年生草本。根茎短，粗壮。根生叶丛生，质厚。有长柄，圆状肾形，长4~15厘米，宽6~30厘米或更大。表面深绿色，有光泽，基部心脏形。边缘波状，具疏生细齿。花黄色，伞房状头状花序，花茎长约60厘米，总苞一列，淡绿色，头状花序周围为舌状花，中央为管状花。瘦果褐色，被冠毛。</p> <p>生态分布：产我国各地；</p> <p>药用部分：全草或根入药，全年可采。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。行气活血，破瘀消肿，清热解毒，化腐生肌。用量：2钱~5钱。</p>
8	八角枫	八角金盘，八角梧桐，八角将军，华瓜木，翻天印，八角木。	<p>瓜木科，八角枫科。</p> <p>植物形态：落叶小乔木或灌木。叶互生，变异性甚大，斜卵形、圆形或椭圆形，长5~18厘米，宽4~12厘米，先端长尖，基部偏形、阔楔形，截形或略成心形，全缘或2~7裂，裂片大小不一，三角状卵形，或为粗齿状，表面散生细柔毛，或仅基部沿脉有毛、背面沿脉有毛，脉腋有毛丛，叶柄长2~4.5厘米，常带红色。花白色，腋生聚伞花序；萼钟状，有6~8小齿，花瓣6~8瓣，线形，长约12毫米，开放后反卷，雄蕊6~8枚，子房下位，柱头3裂。浆果卵形，熟时黑色。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于阔叶林边或松杉林中，公路边及砍伐迹地多有生长。</p> <p>药用部分：根（根名白金条，须根名白龙须）、叶、花、树皮入药，夏、秋、冬采收。</p> <p>用途：根性味辛平，有毒。治风湿麻木瘫痪，跌打损伤及蛇咬伤，疗吐血及疟疾；花治胸腹胀满等。用量：根1~2钱。</p>
9	八角莲	独角莲，独脚莲，八角金盘，八角盘，鬼白。	<p>小蘗科</p> <p>植物形态：多年生草本。有粗壮横行根茎，茎直立，无毛，淡绿色。茎叶1~2个、盾状、圆形，直茎至25厘米，边缘4~9浅裂，表面绿色，光滑、背面有疏生毛，裂片卵圆形或卵状长椭圆形，长2.5~4厘米，宽5~7.5厘米，先端锐尖，边缘有针状细齿，叶柄长10~14.5厘米。花深红色，为无根梗聚伞花序、具5~8朵花，下垂；萼片、花瓣均6片，雄蕊6枚，子房上位，1室，柱头大，盾状。浆果，椭圆形。</p> <p>生态分布：产我南部各省，多生于阔叶林或竹林下阴湿处。</p> <p>药用部分：根茎供药用，秋冬季采收。</p> <p>用途：性味苦、辛、温、有毒。能散风解毒、杀虫。治毒蛇咬伤、疖毒，有特效。民间称：“身藏八角莲，可以共蛇眠”。用量：1钱~3钱。（孕妇</p>

			忌服)
10	九头狮子草	川白牛夕，九节 篙，接骨草，竹叶 青。	爵床科 植物形态：多年生草本。茎高30~50厘米，节显著膨大，上部有分枝。叶 对生、椭圆形或披针状卵圆形，长3~7厘米，宽0.8~1.5厘米，先端渐狭， 钝头，基部楔形，叶柄长3~4厘米。花紫红色，腋生短聚伞花序，有苞片 4枚，其中2枚较大；萼5片，花冠二唇状，雄蕊2枚，子房上位，2室。蒴 果短柱形，二瓣裂，而弹出种子。 生态分布：产我国中部各省；多生于山坡湿地及沟谷草丛中。 药用部分：全草供药用，夏秋采收。 用途：性味淡，凉。能疏风解热行气活血，解毒消肿，接骨止血。用量： 3钱~1两。
11	十大功劳	阔叶十大功劳，土 黄柏，黄柏，黄天 竹，鼠不爬，山黄 柏，大叶黄连。	小蘗科 植物形态：常绿灌木，高可达3米、茎粗壮，直立，通常不分枝，全体无 毛。叶互生，奇数羽状复叶，长达25~35厘米，小叶9~17枚，对生、卵圆 形至卵状长椭圆形，长4~14厘米，宽3~8厘米，先端尖，有锐刺，茎部不 对称，截形或心行，边缘反卷，每侧有2~5粗大硬刺齿，表面暗绿色，背 面带白色，脉自基部分出，表面微下陷，或平贴，下面隆起，顶生小叶 柄长1~1.5厘米，侧生小叶无柄，叶轴圆形，节膨大。花黄色，顶生总状 花序，萼9片，排为3轮，外轮较小，内轮3枚较大，花瓣6片，雄蕊6枚， 子房上位，1室。浆果卵圆形，蓝黑色，有白粉。 生态分布：产我国中部各省，多生于常绿阔叶树林下，以赣南为最多， 也有栽植于庭园中。 药用部分：根、茎、叶及果实入药；根、茎、叶全年可采，果实秋夏采。 用途：性味微苦、寒。能清热解毒，消肿止通，止血，健胃止泻。治肺 结核、支气管扩张，体虚潮热、头晕耳鸣。用量：3钱~8钱。
12	刀豆	刀梢豆，挟剑豆， 大刀豆，刀豆角。	豆科 植物形态：一年生草质大藤本。叶互生，三出复出叶，叶柄长8~15厘米， 小叶柄长约1厘米，小叶阔卵形，或卵状椭圆形，长约12厘米，宽约8厘 米，全缘。花紫色，蝶形，腋生总状花序，花萼基部合生，先端有2裂片， 旗瓣圆形，常略卷皱不平，雄蕊10枚，连合为单体，子房具短柄。荚果 大而扁，长10~30厘米，直径3~5厘米，被伏生短细毛，先端弯曲成钩状， 内含种子10~14粒。种子粉红色或红色。 生态分布：我国中部至南部各省栽植。 药用部分：根、种子、豆壳入药。秋季种子成熟时收集。 用途：种子性味甘、温。能行气活血；刀豆壳性味苦，平。用于散瘀活 血，止呃逆，治腰痛，血气通；刀豆子治肾虚腰痛，疝气，心气痛；根 治跌打损伤，腰痛。用量：刀豆子1钱5分~3钱。
13	丁香蓼	小丁香，水丁香， 团蓼草。	柳叶菜科 植物形态：一年生草本。高20~50厘米，全株光滑无毛。主根木质化，具 多数须根。茎幼时平卧地上或倾斜，以后直立上升，有棱角，多分枝， 枝节四方形，入秋后变紫红色。叶互生，披针形，长4~7.5厘米，宽1~2 厘米，先端渐尖，全缘，基部渐狭，叶柄极短。花黄色，1~2朵，腋生， 无梗；萼筒甚短，4~5裂，宿存，花瓣、雄蕊与萼同数，子房下位，4室。 蒴果长线行，具四棱，熟时变为绿紫色。 生态分布：我国南北均有分布；多生长于浅水泽及水沟边，为水稻田中 的杂草。 药用部分：全草药用，于8月结果时采收。 用途：性味苦、涩、凉，无毒。能破血生新。治红白痢疾，吐血，外伤 出血，目翳，黄疸水积，火疔及蛇虫咬伤等症，用量：3~5钱。
14	丁癸草	乌蝇翼草，人字 草，铺地锦，苦地 枕，二叶丁癸草， 丁黄草。	豆科 植物形态：矮小，一年生或多年生宿根草本。茎纤细，线形多分枝，披 散或直立，高15~40厘米。叶互生，2小叶生于叶柄顶端，小叶披针形， 长8~15毫米，有时长达2厘米，先端短尖；托叶卵状披针形，基部着生处 伸延，而成一距，有明显的脉数条。花蝶形，黄色、顶生总状花序，长 2~6厘米，花为一对卵形的苞片所包藏，萼5裂，旗瓣倒卵形或长椭圆形， 雄蕊10枚，单体，花药二型，子房上位、1室。荚果，由2~6个荚节所成， 通常有小刺。

			<p>生态分布：产我国南部及中部，多生于溪边草地或村落附近旷地上。</p> <p>药用部分：全草入药，夏季采收。</p> <p>用途：性味苦、甘，寒。能去痰火，清肝热，消瘀、凉血、解毒。用量：3~5钱。</p>
15	三七	滇三七，参三七，金不换。	五加科 <p>植物形态：多年生宿根草本，地下根茎纺锤形或圆锥形，肉质，茎直立，高达50厘米，秃净，有纵条纹，绿色或带紫色，基部着生处有残留的鳞片，或痕迹。叶为掌状复叶，对生或3、5片轮生，一年生的植株仅有一片掌状复叶，以后逐渐增多；柄细柔，长5~8厘米，小叶通常5片，罕为3片，具短柄，叶片纸质，绿色，椭圆状倒卵形至披针形，长5~15厘米，宽1~5厘米，下面2片较小，基布浑圆形或楔形，先端短尖，两侧不等，缘具密锯齿，沿脉有细毛。花杂性，黄绿色，顶生伞形花序，球形头状，总花柄长20~30厘米，小花多数，萼5裂，花瓣5片，雄蕊5枚，子房位下，2室。浆果肾形或三棱形，成熟时红色，内含种子1~3粒。</p> <p>生态分布：产我云南、广西、四川、湖北、江西等地。</p> <p>药用部分：根茎和茎、叶、种子均可入药选生长3~7年以上植株，于秋季挖用。</p> <p>用途：性味甘、苦、微温。本品历来作止血、散瘀、定通、消肿药，适用于刀伤、枪伤及跌扑创伤出血不止；又可治吐血，衄血，便血，尿血，血痢，血崩、经水不止，产后恶血不下，血晕，血痛，目赤通肿，兽咬蛇伤等症。据说对肝癌亦有疗效。用量：1钱5分~3钱。</p>
16	三加	白勒花，鼓鹅掌勒，三加皮。	五加科 <p>植物形态：落叶灌木或攀缘状，高2~5米。树皮灰白色，茎枝有刺，刺先端向下弯曲，基部扁阔，通常疏生于叶柄之下，叶互生，3小叶，小叶椭圆形状卵形，长2~8厘米，宽1.5~3厘米，先端长尖或微钩曲，基部楔形或圆钝形，叶基部稍偏斜，边缘浅波状或有细锯齿。花淡黄白色，顶生伞形花序，排列成总状或复伞形花序，萼、花瓣、雄蕊均5数，子房下位，2室。果为浆果状，球形。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于溪边，山坡灌丛中。</p> <p>药用部分：根皮、茎、叶入药，夏秋采集。</p> <p>用途：性味苦、辛，微温，无毒。能退热去风，舒筋活血；皮可治刀伤，生肌。用量：5钱~1两。</p>
17	三颗针	黄柏刺，豪猪刺，鸡脚刺，九连小蘗。	小蘗科 <p>植物形态：常绿有刺灌木，高达2~3米，多分枝，老枝灰黄色，具槽，幼枝淡黄色，具显著的槽，表面散布黑色细小疣点，节间长2~4厘米，叶刺粗壮，呈3分叉，刺开展，中刺约4厘米，黄色或淡褐色，表面亦散布黑色疣点，背面具槽。叶常5片，丛生于刺腋节上，叶片革质。坚硬光滑无毛，卵形至披针形，或为倒披针形，长3~8厘米，先端急尖，边缘具10~20细长的针芒状锯刺，刺长约2.5毫米，表面绿色，有光泽，中肋凹陷，侧脉显著，稍凸起。花黄白色。约14朵丛生于叶腋，小苞片3片，卵圆或披针形，先端圆形或微尖，着于花萼下，萼、花瓣均6片，雄蕊6枚，稍短于花瓣，子房上位，1室。浆果椭圆形，熟时蓝黑色，表面被淡蓝色粉，种子椭圆形。通常1粒。</p> <p>生态分布：产我国长江流域中，上游各省至滇，黔；多生于阔叶树林中，以赣西北一带山区较多。</p> <p>药用部分：根、茎均供药用，秋季采集。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。杀诸虫，去心腹中热气，治口疮，血崩。用量：根1~2两。</p>
18	三白草	过山塘，过山龙，百节藕，白花莲，一白二白，九节藕，塘边藕，白叶莲。	三白草科 <p>植物形态：多年生草本，地下茎白色，节上生须状小根，茎直立，高30~90厘米，有纵沟纹。叶互生，卵形或披针状卵形，长5~16厘米，宽2~7.5厘米，先端短尖或渐尖，基部心形，5脉，全缘，两面无毛，茎端2~3片叶于开花时呈白色，故名“三白草”；叶柄长1~3厘米。花黄绿色，顶生总状花序与叶对生；花小，无花被，生于一卵圆形苞片内，雄蕊6枚，子房上位，由4个合生心皮所成。蒴果成熟后顶端开裂。</p> <p>生态分布：产长江以南各省；多生长于水沟边，水泽或池塘边。</p>

			<p>药用部分：地下根茎及带花全草供药用，夏秋采集。</p> <p>用途：性味甘、寒，有小毒。能清热，利尿，祛痰、消肿疔。用量：5钱~1两。</p>
19	三叶木通	八角哪，牛卵子，野毛蛋，哪瓜，黄狗肾，八月扎，杨扎藤，黄蜡骨藤，木王瓜，炸瓜，八月瓜，羊开口。	<p>木通科</p> <p>植物形态：落叶或半常绿藤本，茎缠绕，长可达6米或更长。枝灰褐色或灰色，有纵纹或疣状突起。叶常数枚丛生，三出复叶，叶柄长6~12厘米，小叶三枚，生于叶柄顶端，革质，卵形或长卵圆形，长3~7厘米，宽24厘米，先端椭圆，微凹，亦有略尖者，基部圆形，心脏形或阔楔形，全缘或微波状，表面绿色，背面粉白，叶脉在背面明显突起。花紫红色，腋生总状花序，雌花1~3朵，生于花序下部，雄花较多，生于花序上部，萼3片，雄蕊6枚，子房上位，1室。果为浆果，熟时紫色，沿纵缝线裂开，露出红黑色种子。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于疏林中，林边或灌丛中。</p> <p>药用部分：秋季果实成熟采摘人药用，或用根，藤茎。</p> <p>用途：果性味、甘、寒，无毒。能行气活血，生津止渴，消炎利水，镇痛排脓催生，杀虫。孕妇不宜内服。用量：果3钱~1两，藤茎3~5钱。</p>
20	大豆	毛豆，黑豆，黄豆。	<p>豆科</p> <p>植物形态：一年生直立草本，高达150厘米。枝梢有时呈蔓状，茎部密被浅褐色硬毛。叶为三出复叶，总叶柄长4.5~12厘米（或更长），密被棕黄色硬毛，托叶披针形，顶端渐尖，被长硬毛；小叶片卵形或狭卵形，侧生小叶斜卵形，长5~12厘米，宽3~7厘米，基部宽楔形，顶端钝或急尖，具短尖小，上面黄绿色，两面均被棕黄色长硬毛，于下面尤密，全缘，膜质；顶生小叶柄长1~2厘米，侧生小叶柄仅3~4毫米，基部具线形小托叶，和小叶密棕黄色长硬毛。花蝶形，紫色和白色，腋生短总状花序，着花2~10朵；花萼钟状，上面2裂通常连合，旗瓣倒卵形，顶端微缺，雄蕊10枚，两体；子房无柄。荚果带状，长椭圆形，密被棕黄色长硬毛。种子椭圆形或近圆形，光滑，成熟时呈青绿，棕色，黑等色泽（随品种而异）具小种脐。</p> <p>生态分布：产我国南北各省。</p> <p>药用部分：种子及其制品，大豆卷，黑豆衣，淡豆豉均人药；夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘，平。黑大豆，黑豆衣；能补肾养心，祛风明目，清热解毒，活血利水。大豆卷：清热，化湿，治湿热初起，胃中积热，水肿湿痹，筋挛膝疼。淡豆豉：解表清热，除烦下气，治胸闷烦热呕吐及血尿等。用量：黑大豆3钱~1两。</p>
21	大青	鸭公青，大叶青，土常山，牛舌枫，牛换青，臭叶，猪屎青，亲泉母，淡亲家，淡婆婆，大百解，菜生紫，牛皮青。	<p>马鞭草科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高可达3米。树皮灰白色，老枝黄褐色，嫩时被短茸毛，渐次脱落。叶对生，长椭圆形，卵形或椭圆状披针形，长8~16厘米，宽2~7厘米，基部近圆形或急尖。先端渐尖，全缘或上缘有不整齐浅波状小齿，表面深绿色，背面淡绿色，主脉隆起，侧脉6~8对，表背两面沿叶脉有短茸毛，叶柄长1.5~5厘米，叶柄上面有小槽，背面圆形，被白色短软毛。花白色，顶生圆锥状聚伞花序，花萼钟状，5裂，花冠筒状，5裂，雄蕊4枚，雌蕊1枚，子房上位，不完全4室。核果倒卵形或球形，兰色，花萼宿存。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于山坡林边灌丛中或荒山草地上。</p> <p>药用部分：根、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦，寒。能清热解毒，利水，治丹毒、黄疸、扁桃腺炎、喉头炎、牙龈出血、细菌性痢疾、偏头痛等。用量：叶5钱~1两。</p>
22	大蒜	葫，葶菜。	<p>百合科</p> <p>植物形态：多年生草本，鳞茎有小鳞瓣6~10枚，全部包于银白色、淡红色或紫红色膜质鳞片内。叶数枚生自鳞茎，扁平线状披针形，灰绿色，长达50厘米，宽至2.5厘米，先端渐尖。花白色带紫色，顶生伞形花序，生于花茎上，伞形花序下有膜质苞片1~3枚，浅绿色，花被6片，雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果，种子黑色。</p> <p>生态分布：产我国南北各省。</p> <p>药用部分：春季采鳞茎药用。</p> <p>用途：性味辛，温。能化湿消胀，健胃，杀虫解瘟疫，消痈肿，祛谈镇</p>

				咳，解毒散寒。
23	大麻	火麻	大麻科，桑科。	<p>植物形态：一年生草本，高达3米，分枝多，表面有纵沟，密被绒毛。叶互生，掌状复叶，小叶5~11片，通常3~5片，披针形，边缘粗锯齿，两面均具有毛茸，总叶柄长4~15厘米，亦被毛茸，托叶线状或披针形。花单性异株，雄花圆锥花序，黄绿色，花被5片，雄蕊5片；雌花成丛，顶生或腋生，绿色，每花有一卵形苞片宿存，花被5枚，雌蕊1枚，花柱2，子房球形。瘦果扁卵状。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：雌株带花梢枝（大麻草），果实（火麻仁），叶入药，7~9月采收。</p> <p>用途：花：性味辛、温，无毒。麻仁（果实）：性味甘、平，无毒。叶：性味辛，有毒。大麻草煎服，可作麻醉、镇痉、镇痛剂，常用于躁狂症和痉挛性咳嗽、喘息、神经痛。种子煎服，能利尿、通便、调经、镇痉、治癫痫、叶夹入烟草中吸之治喘息有效。用量：果实3~5钱。</p>
24	大蓟	红毛帚，勒莎草，老虎卵，勒菜，野蒲公英，野红花，乌不扑，刺蓟。	菊科	<p>植物形态：多年生有刺本草，高可达1米。宿根多数，纺锤形或柱状圆锥形，长5~10厘米，直径5~8毫米，淡紫褐色；茎直立，粗壮，表面有纵条纹，密被白色绵毛。叶互生或基生；基生叶至开花时尚存在。叶片倒卵状长椭圆形，长10~35厘米，羽裂，裂片长椭圆状披针形，先端尖，边缘有不整齐浅裂，有不等长针刺，表面深绿色疏生绵毛，背面白绿色，脉上有白色绵毛，基布渐狭而呈两侧有翼的叶柄；茎生叶基部心形，抱茎，下面密被白色绵毛。花紫红色，为大型头状花序，单生枝顶端，总苞球形，苞片复瓦状紧密排列，有粘着腺体；花托平坦；花全为管状花，两性，花冠筒近中部以下为细管状，白色，中部以上稍膨大，顶端5裂，雄蕊5枚，花药连合成管状，子房下位，1室。瘦果，椭圆形而扁，顶端截形，冠毛羽毛状。</p> <p>生态分布：产我国南北各省，多生于丘陵、路旁，旷野荒地，村落城镇庭院均有生长。</p> <p>药用部分：春夏采全草，根供药用。</p> <p>用途：性味甘、苦、凉。能凉血、止血、行瘀消癥。治热性出血病，腹脏瘀血等。研细，酒冲服或捣汁能破宿血，生新血，外用治恶疮疥癣毒虫咬伤。捣汁服效果更显著。用量：全草1钱5分~3钱。</p>
25	大藻	水浮莲，大浮萍。	天南星科	<p>植物形态：浮水生草本，无茎，有白色纤维状根，集生成束，悬垂水中。叶丛生，斜立，排列成杯状；叶片倒卵状楔形，长2.5~10厘米，基部较厚，先端钝圆，两面均无毛茸，叶脉下面凸起，扇状。花单性，无花被，肉穗花序生于佛焰苞内，且与苞筒背合生，上部分离；佛焰苞小形，具短柄，白色，长约1.2厘米，下部筒状，上部张开，生于叶簇中央。雄花序位于花序顶端，雄蕊2枚，雌花序单生于下端，圆锥状卵形，子房1室。浆果有种子多粒。</p> <p>生态分布：产华南、华东各省。</p> <p>药用部分：全草入药，夏季采收。</p> <p>用途：性味淡、寒。能发汗散湿，利尿消肿，通经。煎水可洗去汗斑，止痒，治跌打损伤，肿痛。南方农村常繁殖为养猪饲料。用量：3~5钱。</p>
26	大叶桉	白蜡树，蜡树皮。	木 樨 科	<p>植物形态：落叶小乔木，高约15米。树皮灰色光滑，老时浅裂。叶对生。奇数羽状复叶，小叶3~7片，广卵形、长卵形或椭圆状倒卵形，长4~12厘米，宽3.5~7厘米；顶端中央小叶特宽大，基部楔形，下延呈翼状或与叶柄结合，先端尖，边缘有浅而粗的钝锯齿，背面叶脉有褐色柔毛，小叶柄对生处膨大，有黄褐色柔毛。花白色，顶生圆锥花序，萼4片，无花冠，雄蕊2枚，子房上位，2室。翅果倒披针形，含种子1粒。</p> <p>生态分布：产我国东北，华北或长江流域各省，多生于向阳山坡、阔叶林中、河边湿地。</p> <p>药用部分：树皮供药用，5~6月采集。</p>

				用途：性味苦，微寒。为健胃药，有清热、止泻、消炎等功用。主治是泄泻，热痢，目赤肿，羞明，迎风落泪等症。对细菌性痢疾有良好的治疗效果。用量：皮1钱2分~3钱。
27	大叶桉	大叶有加利，桉树。	桃金娘科	<p>植物形态：常绿乔木，高达15米。树皮粗糙而有纵槽纹，暗褐色，枝的外皮淡红色。叶互生，革质，于幼苗及萌生枝上的叶多为对生；卵状披针形，全缘长8~18厘米，宽3.5~7.5厘米。基部楔尖，先端渐尖，侧脉极多而纤细，在边缘处连合。花白色，腋生伞形花序，萼管狭陀螺形或稍近壶形状，与子房合生，长6~8毫米，下部渐狭而成柄；萼片与花瓣合生成一帽状体，开放时由萼管顶部成环状裂开而脱落；雄蕊及多数，分离，子房下位，通常3室。蒴果藏于萼筒内，成熟时顶部开裂成3~4果瓣，果瓣长期粘合或迟裂。</p> <p>生态分布：我国南部广栽培。</p> <p>药用部分：叶入药，全年可采收。</p> <p>用途：性味微辛、微涩、平，气芳香。能疏风解热，防腐止痒。用量：鲜1~2两，干2~3钱。内服量不宜大，以免呕吐。</p>
28	大叶楠	尖箬肚，薄叶楠。	樟科	<p>植物形态：常绿乔木，高达8米。小枝粗壮，暗棕褐色，无毛。叶互生，近革质，倒卵状椭圆形，长12~24厘米，宽3.5~7厘米，基部狭楔形或楔形，顶端短渐尖或长渐尖成尾状，全缘，表面深绿色，无毛，背面苍白色，初时被银白色绢毛，于叶脉处较密，后渐脱落变光滑，中脉在表面凹陷、背面隆起，羽状侧脉14~20对、在两面微隆起，略带红色，具细微的网脉；叶柄长1~3厘米，上部有浅沟槽，无毛。花两性，黄绿色，腋生圆锥花序，花被6深裂，雄蕊9枚，花约4室；雌蕊1枚，子房近球形。浆果球形，直径约1厘米，具向外反折的宿存花被。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省，多生于山坡、山谷、溪沟常绿阔叶林中。</p> <p>药用部分：根入药，夏、秋、冬季均可采收。</p> <p>用途：消炎解毒。</p>
29	大茶叶	断肠草，黄藤，葫蔓藤，大茶藤，大茶藤，大炮叶。	马钱科	<p>植物形态：常绿缠绕性灌木，全株秃净，茎皮栓质。叶对生，卵形至卵状披针形，长7~12厘米，宽2~5.5厘米，基部长圆形或楔形，先端钝尖，全缘，叶柄长约1厘米。花淡黄色，顶生或腋生，成三叉状分枝聚伞花序，萼5片，花冠漏斗状，5裂，雄蕊5枚，子房上位，2室。蒴果2瓣裂，种子多数，有翅。</p> <p>生态分布：产我国南部，西南各省；多生于山坡林边、灌丛中或荒山草地。</p> <p>药用部分：根、叶入药；夏秋均可采收。</p> <p>用途：根有剧毒，误食能致命。（但猪食少量可增加毛的光泽，寻乌称为“大茶叶”。市集上有售卖，供养猪用）。主治金疮乳痈，咳逆上气，水肿，并能治脚膝痹痛，四肢痉挛，恶疮疥虫等。</p>
30	大活血	红藤，活血藤，血藤，血灌肠，大血藤。	木通科，大血藤科。	<p>植物形态：常绿木质大藤本，长达10米。茎圆柱形，有纵条纹，扭曲，幼枝红色。叶互生，小叶3枚，各不相等，叶柄长3~15厘米，中间小叶倒卵形，全缘，两侧小叶偏或椭圆形，全缘；表面暗绿色，背面灰白色，两面均无毛且稍为光泽。花黄绿色，单性异株，腋生总状花序，雄花萼片，花瓣及雄蕊均6枚；雌花萼片，花瓣均6枚，退化雄蕊6枚，心皮多数，分离。果为聚合浆果，每一果近于球形，经约7厘米，暗蓝色而被有白粉，具有肉质果柄。种子球状卵形，基部为楔形，黑色有光泽。</p> <p>生态分布：特产我国中、南部至东部；多生于阔叶林中及灌丛中。</p> <p>药用部分：根、藤入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、平。能通经补血，强筋壮骨，行血，驱虫。治跌打损伤，风湿疼痛，阑尾炎，血丝虫病，血晕，血淋，疮疖等。用量：5钱~1两。</p>
31	大花卫矛	野杜仲，金丝杜仲，四棱子。	卫矛科	<p>植物形态：常绿灌木或小乔木，高约4米。树皮灰黑色，小枝圆筒形，灰绿色，折断后有白丝；幼枝黄绿色，有四棱。叶对生，薄革质，倒卵形至卵状倒长圆形，或椭圆形至长圆状椭圆形，长6~11厘米，基部楔形或</p>

			<p>圆形，先端渐尖或短尖，边缘具均匀的细锯齿，上面深绿色，下面淡绿色，两面均无毛，下面主脉明显隆起；叶柄长0.5~1厘米。花白色，腋生聚伞花序，由5~9朵组成，花大，直径约2厘米，4数。蒴果有4锐棱，成熟时呈黄色。种子黑色，外被深红色的假种皮。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至西南部，多生于山坡灌丛中或沟谷林缘，常见于石灰岩山地。</p> <p>药用部分：树皮、根皮、果、叶、入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：治痢疾初起腹疼。用量：树皮5钱~1两。</p>
32	大种半边莲	山梗菜，水菟菜，苦菜，节节花，水白菜。	<p>半边莲科，桔梗科。</p> <p>植物形态：多年生草本，高可达1米。全株无毛，根茎斜生，茎直立，叶互生，椭圆形至椭圆状披针形，长2~7厘米，宽1~2.5厘米，基部楔形，先端渐尖，边缘有细锯齿，无叶柄。花紫色，腋生总状花序，萼钟形，5裂，萼管半球状梨形，长0.5~1厘米，有棱角，花冠唇形，倾向一边，长2~3厘米，下唇特大，花冠筒约1.5厘米，雄蕊5枚，花药聚生，子房上位，2室。蒴果球形，膜质，无毛，表面有细棱。</p> <p>生态分布：产我国东北部，中部和南部；多生于丘陵山地阴湿处及水沟湿地。</p> <p>药用部分：全草和根供药用，夏秋季采收。</p> <p>用途：性味甘、平。根有利尿、催吐、泻下作用。用于伤风发热及疱毒等。用量：2~3钱。</p>
33	小茴香	茴香，香丝菜，怀香。	<p>伞形科</p> <p>植物形态、：多年生草本。全株无毛，具强烈芳香，表面具有白粉，茎直立，高达1.5米，圆柱形，有细的纵浅沟，上部分枝。叶为羽状复叶，根生叶丛生，有长柄，茎生叶互生，叶柄由下而上渐短，叶柄基部呈鞘状，宽大而抱茎，两侧底部具一对卵状三角形的叶耳，叶3~4回羽状复叶，叶片细线形，先端渐尖。花黄色，顶生复伞形花序，径3~15厘米，无总苞和小苞，伞梗20枝左右，不等长，每一小伞形花序有5~30朵花，花小形，两性，萼齿缺少，花瓣5片，雄蕊5枚，雌蕊1枚，子房下位，2室。双悬果卵状长圆形，具强烈香气，分果椭圆形，具五条隆起棱。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽植。</p> <p>药用部分：果实、嫩叶、全草入药，秋末采收。</p> <p>用途：性味辛、温。果实有祛寒疗疝、健脾开胃的功效。用作兴奋、驱风、健胃、矫味、祛痰及催乳剂。治霍乱呕吐，脘腹胀满，寒疝，腹痛，并解鱼肉毒。用量：1~3钱。</p>
34	小赤麻	赤麻	<p>荨麻科</p> <p>植物形态：多年生草本或亚灌木，高可达1米。茎直立，红色，有分枝。叶互生，带红色，菱状卵形，长4~8厘米，叶柄红色，长5~12厘米。花单性同株，红绿色，为腋生下垂的穗状花序，花序长达15厘米；雄花花被3~5裂。雌花花被管状2~4裂。雄蕊3~5枚，子房上位，1室。果为瘦果。</p> <p>生态分布：产我国东北，北部和南部各省，多生于溪谷林边和灌丛边的阴湿处。</p> <p>药用部分：根入药，夏秋采收，</p> <p>用途：供跌打损伤药用。</p>
35	小通草	旌节花	<p>旌节花科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高达3米，小枝具有大髓心，幼枝赤褐色或栗褐色，有光泽。叶椭圆状卵形至卵状披针形，基部圆形，先端渐尖，边缘锯齿状而疏生有牙齿，表面绿色有光泽，无毛，长8~16厘米。花黄色，腋生总状花序，下垂，5.3~8厘米，花钟状，萼与花瓣均4片，雄蕊8枚，子房上位，为不完全的4室。果为浆果状，球形、黄绿色，带黄色喙。</p> <p>生态分布：产在我国中部；多在于阔树林中或林边，以庐山最为常见。</p> <p>药用部分：髓部入药、夏秋采收。</p> <p>用途：性味淡、平，无毒。能利尿渗湿，治热病小便赤黄或尿闭，湿热癰淋等症。用量1~2钱。</p>
36	小毛茛	猫爪草，三散草。	<p>毛茛科</p> <p>植物形态：多年生小草本，高达5至15厘米。须根纤维状，中间杂以几个狭纺垂状小块根，形似猫爪，故名“猫爪草”。茎纤弱，疏生短柔绒毛，后渐变无毛。根出叶具长柄，长2.5~6厘米，3深裂乃至3全裂，或不分裂，</p>

			<p>裂片肾圆形或倒卵状楔形，顶裂片较大，顶端有时更分3浅裂，侧裂有时更分2裂，裂片边缘具齿状浅裂，根出叶也有细裂成线状裂片；茎生叶几无柄，通常3深裂而成线状，裂片钝头。花鲜黄色，单生茎顶，花萼5片，花瓣5片，基部具1小形鳞片，雄蕊多数，心皮分离，多数，集成球形，瘦果宽卵圆形，光滑，顶端宿存花柱变成短而弯曲的钩状嘴。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省，多生于水田边，村落、城镇附近湿地、或山坡草地。</p> <p>用药部分：全草及块根入药，夏秋初采收集。</p> <p>用途：性味辛、温，有毒。用治淋巴结核，偏头痛，牙痛，疟疾等。用量：3~5钱。</p>
37	小槐花	杨大归，扁草子，逢人打，粘身草，路边肖，野毛豆，山蚂蝗，巴人草，水至草，拿身草，豆子草，饿蚂蝗，粘衣刺，草鞋板，路边鸡。	豆科 <p>植物形态：亚灌木，高30~90厘米。茎直立，分枝。叶互生，三出复叶，叶柄长2~4厘米，小叶长椭圆形或披针形，长3~8厘米，宽1~3.5厘米，基部楔形或阔楔形，先端尖，表面光滑；背面叶柄上有毛，中央小叶较大，小叶柄较长。花蝶形，白色，腋生或顶生总状花序，长约8~15厘米，花萼5片，有毛，旗瓣椭圆形，雄蕊10枚，两体，子房无柄。荚果褐色，长2~6厘米，有4~8节，为扁平念珠状，两端较狭，密生钩状刚毛，易粘人衣服。</p> <p>生态分布：产我国中部、南部、西南部各省；多生于山坡林缘、灌丛及路边草丛中。</p> <p>药用部分：全草、根、叶入药。夏秋季采收。</p> <p>用途：性味微苦，温。能祛风杀虫，利尿，活血利湿。用量：全草3钱~5钱。</p>
38	小二仙草	蚁塔，豆瓣草。	小二仙草科，蚁塔科。 <p>植物形态：多年生小草本，纤弱，丛生，高10~40厘米。茎直立，基部匍匐分枝，茎四棱形，带赤褐色。叶对生，但上部有互生者，并逐渐缩小成苞叶，叶具短柄或近于无柄；叶片阔卵形或近于卵形，长6~10厘米，基部圆形，先端短尖或钝，边缘有小齿，两面均秃净，叶淡绿色或紫褐色。花为淡红色，细小，为顶生总状花序，或分枝成圆锥花序，萼管4裂，宿存，花瓣4枚，比萼片长约2倍。雄蕊8枚，子房下位，2~4室。坚果近球形，有8棱。</p> <p>生态分布：产我国中南部，多生于荒山草地中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采集。</p> <p>用途：性味苦、凉，无毒。能消瘀血。治大小便不通，疗赤痢，并治热淋，跌打损伤，月经不调。咳嗽、哮喘等症。用量：鲜草1~2两。</p>
39	小眼子菜	小叶眼子菜，水板凳，水案板。	眼子菜科 <p>植物形态：多年生水生草本。茎细长，丝状，叶有两种，沈水叶线形，长约6厘米；浮水叶椭圆形或披针形，长1.5~3厘米，宽4~10毫米，具平行叶脉，基部钝尖，先端尖锐或钝尖，全缘，两面无毛；托叶细小，分离。花绿色，腋生穗状花序，伸出水面，花被4片，雄蕊4枚，雌蕊4枚，子房上位，各1室。小核果斜广卵形，顶端有喙。</p> <p>生态分布：产我国南北各地，多生于池沼及水田中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采用。</p> <p>用途：性味微苦、凉，无毒，能清热消肿；治火眼，利水通淋，消气膨胀，疗黄疸，瘰癧，痔疮，调月经，治红崩白带，避孕，并治小儿疳气腹痛。用量：0.5~1两。</p>
40	小叶黄杨	瓜子黄杨，千年矮，乌龙木。	黄杨科 <p>植物形态：常绿灌木或小乔木，高1~3米。树皮灰色，栓皮质，呈有规则的剥离，茎枝均呈四棱，小枝开展。叶对生，革质，具短柄，叶片卵形、倒卵形、卵状长椭圆形，或椭圆状披针形，通常中部比较宽，顶端稍凹，基部狭楔形，长1~3厘米，宽7~15厘米，全缘，表面深绿色，有光泽，被面灰绿色，主脉粗大。花黄色，单性，丛生于叶腋及枝端，通常顶端具一朵雌花，其余均为雄花，雄花具小苞片，萼片4片，雄蕊4枚；雌花萼片6，子房3室，柱头3枚，蒴果圆球形，成熟时黑色，沿室背3瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国中部各省。</p> <p>药用部分：茎、枝、叶入药，全年可采收。</p>

			用途：性味苦，平。能止痛，解毒。治牙疼，疝疼，暑月疮疖以及跌打损伤，用量：叶3钱~4钱。
41	小叶三点金	路路星，太阳草，红梗草，大叶关门草，漆大伯，碎米柴，消毒草。	<div>豆科</div> <div>植物形态：矮小灌木，高80厘米。根粗壮，木质，茎多少倾倒，基部多分枝，初时疏生白色柔毛，后渐脱落。叶为三出复叶，有时为单叶互生，叶轴（连叶柄）长3~5毫米，最长达1厘米，纤细无毛；托叶披针状钻形，长3~4毫米。褐色，膜质；小叶椭圆形，长椭圆形，有时倒卵形，长4~16毫米，宽3~8毫米，基部圆形或浅心形，顶端圆形或微凹，具小针头，表面无毛，背面疏生白色柔毛，主脉于下面隆起，网脉不甚明显，全缘，膜质；小叶柄极短，被白色短柔毛，小托叶线形，呈刚毛状。花蝶形，淡红色，3~6朵或多达10朵，排列成总状花序，生于叶腋，或分枝顶端，长2~4厘米；花小，长约4毫米，花萼5深裂，旗瓣近圆形，顶端凹入，基部具短而宽的爪，雄蕊10枚、2体，子房线形。荚果线形，扁平稍弯，具3~4节（有时2节），各节成圆形。</div> <div>生态分布：产我国长江流域至南部、西南各省；多生于山坡疏林下，山麓灌丛或荒山草到中。</div> <div>药用分布：根入药，夏秋采收。</div> <div>用途：性味甘，平。能清热明目。用量：5钱~1两。</div>
42	小果千金榆	野梅树，大叶马料。	<div>榛科</div> <div>植物形态：落叶乔木。高达15米。树皮褐色，有鳞片状浅裂；小枝赤褐色、有光泽、具黄色圆形的皮孔。叶互生，椭圆形或卵状椭圆形、长6~12厘米、宽4~6厘米，基部浅心形、两侧稍不对称，顶端渐尖，边缘具尖细锯齿，表面绿色，疏生短柔毛，老时光滑，背面淡绿色，侧脉17~24对，表面凹陷，背面明显突起；叶柄长1.2~2厘米，在嫩枝上，叶柄、叶背、叶脉及果柄上均密生短柔毛。花单性、黄绿色，雄茅荑花序叶生，下垂；花密生、无花被，基部着雄蕊10枚，雌茅荑花序顶生，每苞内有雌花2朵、左右各有3小苞或付苞，以后结果时即成果苞，雌花具萼，与子房附着，子房下位，不完全的2室。果序长12厘米，果苞叶状、阔卵状短圆形，小坚果椭圆形，压扁状，被密叠的果苞所复盖。</div> <div>生态分布：产我国中部至长江流域各省，多生于背阳山谷较湿润肥沃的针、阔叶混交林或杂木林中。</div> <div>药用部分：根皮入药，秋季采收。</div> <div>用途：性味淡、平，无毒。治劳动过度，疲乏。用量：1~2钱。</div>
43	土三七	白田七草，血三七，破血丹，狗头七，五子爬山，野田七，散血草，三七草，天青地红，三七。	<div>菊科</div> <div>植物形态：多年生草本。宿根肉质肥大。茎直立，多分枝，高1~1.5米，带肉质，幼时呈紫绿色。表面光滑无毛，有棱角。基生叶多数，全缘，有锯齿或作羽状分裂，幼时表面深绿色，背面紫绿色；茎生叶互生，形大，羽状分裂，裂片卵形或披针形，边缘疏生锯齿或浅裂，先端尖或渐尖，基部有托叶1对，3~5裂，叶表面绿色，平滑无毛。花黄色，头状花序，为顶生散房状排列，总苞绿色，筒状或钟状，苞片10~12片，1列，花托扁平；全为管状花，花冠5裂；雄蕊5枚，药连合而围于花柱上端，子房下位，1室。瘦果线形，细小，表面有棱，褐色，冠毛多数，柔软，白色。</div> <div>生态分布：产我国长江以南至西南各省。</div> <div>药用部分：药用根、叶及全草，根最适宜冬季采用，全草春、夏、秋可采。</div> <div>用途：性味淡、温，有毒。为止血药，能活血消肿。用量：1~5钱。</div>
44	土人参	土洋参，山高丽参，野高丽参，栌兰，土高丽参。	<div>马齿苋科</div> <div>植物形态：多年生草边，高达60厘米。茎圆柱形，直立，绿色，茎下部多分枝，基部稍木质化。叶互生，扁平肉质，倒卵形或卵状椭圆形，长5~8厘米，宽2~4厘米，基部渐狭而成短柄，先端尖或钝圆，全缘，两面绿色，光滑。花淡紫红色，顶生圆锥花丛，总花柄成紫绿色或暗绿色，花萼2枚。早脱落；花瓣5枚，雄蕊10枚，子房上位，1室。蒴果灰褐色。</div> <div>生态分布：我国长江以南各省均有栽植。</div> <div>药用部分：根入药，夏秋采收。</div> <div>用途：性味甘，平。滋补强壮。用量：1~2两。</div>
45	土党参	金钱豹，蔓桔梗。	<div>桔梗科</div> <div>植物形态：多年生缠绕性草质藤本，长达2米，有乳汁，根黄白色，纺垂</div>

				<p>形，肉质。叶对生，有时互生，卵状心脏形，长3~8厘米，宽2~6厘米，基部心脏形，先端钝，边缘有钝齿，叶柄细长，常扭曲。花黄绿色，单生叶腋，萼、花冠钟形，5裂，雄蕊5枚，子房上位，5室。浆果略呈球形，熟时紫色。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于山坡丛林中、沟谷灌丛草地中。</p> <p>药用部分：根入药，秋冬采收。</p> <p>用途：性味甘，平。能补虚润肺，益气生津。主治病后体虚，疲劳倦怠、多汗、食欲不振，心跳不宁；肺结核、夏季热等症。用量：根3~5钱，水煎服。</p>
46	土大黄	金不换，红筋大黄。	蓼科	<p>植物形态：多年生草本。茎高1米左右，绿紫色，有多数纵沟，根肥厚且大，黄色。叶有根生、茎生两种，根生叶丛生状，有长柄，托叶膜质，卵形或卵状椭圆形；茎生叶互生，卵状披针形，茎上部叶渐小而变为苞叶。花淡绿色，顶生大形圆锥花序，由叶丛间抽出，花被6片，雄蕊6枚，子房上位，1室。瘦果卵形，有三棱，紫褐色。</p> <p>生态分布：产我国东部各省。</p> <p>药用部分：根供药用，9~10月采收。</p> <p>用途：性味辛、苦，无毒。能清热，通便，凉血，散血。外用治外伤，肿毒；内服开胃，健脾，补虚。用量：5钱~2两。</p>
47	土荆芥	臭草，鹅脚草，杀虫芥，钩虫草。	藜科	<p>植物形态：一年生草本。茎直立，高可达1米，有分枝，茎有纵槽纹，被腺毛，揉之有特殊芳香。叶互生，具短柄，着生于茎基部的叶为长椭圆形至长椭圆状披针形，长3~16厘米，边缘有不规则的钝齿及波浪边缘；着生在茎上部的叶较小，全缘，逐步变狭小而成线形或线状披针形的苞片，叶背有腺点。花杂性，绿色，顶生或腋生，穗状花序，再汇成为具叶的圆锥花序；萼片5枚，有时3枚；无花瓣，雄蕊5枚；子房上位，1室。胞果，长不及1毫米，包藏在萼内。</p> <p>生态分布：产我国南部和西南部；生于村落附近旷地、田边较低湿地方。</p> <p>药用部分：茎、叶种子供药用，夏末秋初采收。</p> <p>用途：性味辛、苦，芳香，有小毒，有特殊臭气。除直接应用全草外，尚可提取挥发油用，能杀虫驱虫，驱风消肿，祛湿止痒。用量：全草8分~1钱。</p>
48	土茯苓	山遗粮，硬饭头，冷饭团，土苓，白土苓，光叶菝葜。	菝葜科，百合科	<p>植物形态：多年生常绿藤本。茎细瘦，无刺，根状茎长而稍呈念珠状，坚硬，深生于土层中。叶互生，革质，卵状披针形，长4~4厘米，宽1~5厘米，基部圆或钝，先端渐尖，3~5脉，表面深绿色，背面淡绿色有白粉，叶柄长1~1.6厘米，常具有卷须2条。花浅黄色，为腋生伞形花序，花被6片，2轮，雄蕊6枚，子房上位，3室。浆果球形，紫红色。</p> <p>药用部分：根茎入药，春季或秋后采集。</p> <p>用途：性味甘、淡，平。能除湿，利关节，解毒。治梅毒恶疮，拘挛骨痛及解汞粉、银珠毒。服药前忌饮茶。用量：5钱~1两。</p>
49	土栾儿	九牛子，子鸡生旦，九子羊，低栗子。	豆科	<p>植物形态：多年生蔓生草本。地下有球形的块根，皮黄褐色，内部肉白色，茎细长，有稀疏的硬毛，缠绕他物。叶互生，羽状复叶，小叶3~5片，卵形或长卵形，长5~7.5厘米，宽2.5~3.5厘米，顶端渐尖，具细尖，全缘，基部圆形或广楔形，表面叶脉上疏生短硬毛，背面近于无毛，总叶柄长6~8厘米，小叶柄短，花绿色，碟形，腋生总状花序，萼稍成二唇形，龙骨瓣卷为一半圆圈，最长，旗瓣较短，翼瓣最短，雄蕊10枚，两体，子房和花柱无毛，花柱卷成半圆圈，荚果扁平。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡林边，灌丛中或荒山草地。</p> <p>药用部分：叶及块根供药用，春采叶，秋后挖取块根。</p> <p>用途：性味甘，平。块根可供食用，能利湿解毒，祛痰止咳。种子可杀</p>

				虫。用量：块根5钱~1两。
50	土牛膝	红牛夕，牛膝，怀牛膝，对叶草，野牛夕，白牛夕。	苋科	<p>植物形态：多年生草本，高30~90厘米。枝条分散，具纵棱条，棱条带红色，其中四角的四条较粗，使茎成为近似方形，节膨大，呈红色；嫩枝上有细毛，老枝上毛稀少或无毛，叶对生，椭圆形，长5~15厘米，宽2~5.5厘米，先端尖，全缘，嫩叶两面均有白色的细柔毛，老叶几无毛，表面绿色，背面色较淡，叶脉明显，叶柄长1~2厘米，向上一面具凹沟，红色，向下面绿色。花绿色，顶生或腋生穗状花序，有时3穗同出或下垂，苞膜质，长圆形，上部突尖成刺；小苞2，生于花的两侧，刺状，略向外曲，基部两侧各具1膜质耳形的裂片，成长后倒向下垂；花被5片，线形，顶端尖，直立，雄蕊5枚，基部合生，退化雄蕊有齿；子房上位，1室。胞果长圆形，内含一粒种子。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于山坡林边、灌丛边，村落附近常有生长。</p> <p>药用部分：根、茎、叶入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味甘，微苦，平、微寒；无毒。通经，利尿，并可治脚气，关节炎，痛风，使腰脚肌肉强健，又可治打扑损伤淋症，腹痛及间歇热等，用量：1钱5分~3钱。孕妇忌用。</p>
51	土马鬃	千年纵，大金发藓，独根草。	金发藓科，土马鬃科	<p>植物形态：常绿小草本，高10~30厘米，多成片丛生，茎不分枝，上部深绿色，下部密生假根，老时呈棕红色，或暗红色。上部叶螺旋状密生，下部叶渐小而渐疏；叶长披针形，先端突生成刺状，边缘具细锯齿。单性异株；雄株稍矮，顶端着生雄器状似花苞，从中央常生出新枝，雌株较高大，顶生四棱柱形孢蒴，蒴柄长达10厘米，孢蒴棕红色。幼时直立，老时多变弯垂，孢蒴外复盖有膜状蒴帽，呈棕黄色，孢子细小，圆球形，黄色，平滑。</p> <p>生态分布：产我国南北各省，自平原至海拔1500米的丘陵山地均有分布，多生于阴湿山坡，山沟林下或林边，岩石腐殖土上。</p> <p>要用部分：全草药用，夏秋季采收。</p> <p>用途：性味甘、酸、寒，无毒。能黑发，通大小便，活血。治骨热，毒壅，鼻衄，九窍出血，二便不通，湿疹，少年发白。用量：3钱~1两。</p>
52	川榛	木里仙	榛科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达7米。树皮灰褐色，小枝被灰褐色线状长毛。叶互生，阔卵形至倒卵形或圆形，长6~10厘米，宽4~6厘米，基部心形，顶端长渐尖或急尖，有时具浅裂，边缘有不规则的重锯齿，表面近无毛，背面被稀疏短柔毛，侧脉7~8对，在上面下陷，下面隆起；叶柄长1~2厘米，有腺毛或短柔毛。花单性，同株，先叶开放，雄花序茅荑状，2~3条生于上年枝上，下垂，雄花无花被，每苞片内有雄蕊8枚，雌花序头状，着生于枝顶或雄花序的下方，每苞片内有花2朵，无花被，花柱红色，2裂伸出。坚果近球形，通常3个一丛，外面1个叶状总苞所包被，总苞边缘有不规则的分裂。</p> <p>生态分布：产我国中部至西南各省，多生于山坡林边或灌丛中。</p> <p>药用部分：干果供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：治胃纳不馨。</p>
53	广豆根	山豆根	豆科	<p>植物形态：落叶灌木，高达2米。茎灰绿色，多分枝，枝、嫩叶及花都有灰黄色或灰白色的粗毛。叶互生，奇数羽状复叶，总叶柄长5~11厘米，小叶11~12枚，对生，椭圆形，长约1~2.5厘米，宽约0.5~1.5厘米，顶端小叶较大，长1.5~4厘米，宽0.8~2厘米，先端尖或圆，全缘，基部圆形，小叶柄短，长约1厘米，托叶小，早落。花蝶形，淡黄色，总状花序，顶生或腋生，萼钟状，5裂，旗瓣圆形，先端凹入，雄蕊10枚，分离，雌蕊1枚，荚果圆柱形，种子与种子间紧缩，呈念珠状。</p> <p>生态分布：产我国南部各省声；多生于山坡林边或灌丛中。</p> <p>药用部分：根供药用，在夏秋两季采收。</p> <p>用途：根有清热解毒，散肿止痛之功，通常用治咽喉肿通，肺热咳嗽，</p>

			齿疼眼肿，黄疸，便秘等症。用量：1~3钱。
54	广东万年青	万年青，粤万年青。	天南星科 植物形态：常绿多年生草本，直立，高可达1米许，常不分枝，节明显，鲜绿色，秃净。叶互生，卵形，长10~25厘米，宽8~10厘米以上，基部浑圆，先端渐尖，有滴水叶尖，全缘，侧脉5对，叶柄长约为叶片的2/3或等长，基部有叶鞘包茎。花黄绿色，单性，腋生肉穗花序，短于叶柄，佛焰苞长4~7厘米，钝头而具小锐尖，花被缺，雄蕊2枚，分离，子房上位，1~2室。果为浆果状，熟时鲜红色。 生态分布：产我国广东、广西常绿阔叶林下湿地，各地广栽培于水瓶中，常年不凋。 药用部分：全草入药，全年均可采用。 用途：性味淡、寒、微苦。能清热凉血、消肿拔毒、止痛。主治毒蛇咬伤、咽喉肿痛；小儿脱肛；疔疮肿毒；热咳、咳血；大肠结热；狂犬咬伤等症。用量：鲜草0.5~1两。外用煎水洗（脱肛）或捣烂敷患处。
55	千日红	千金红	苋科 植物形态：一年生直立草本，高约50厘米。茎粗壮近圆柱形，节膨大，叉状分枝，枝微具4棱，被有粗毛，常紫红色。叶对生，具短柄，叶片椭圆形至倒卵状椭圆形，长5~10厘米，宽2~5厘米，基部楔性，逐渐狭窄成柄，顶端尖或钝，全缘，表面粗糙，具细毛，背面有较长的白色软毛，花淡紫色，深红色或白色，顶生，球形头状花序，基部有2个叶状总苞片，具长的总梗。外轮苞片短小，花被5片，花被之外有两层干膜质苞片；雄蕊5枚，子房上位，1室。胞果圆形。 生态分布：我国各地庭园均有栽植。 药用部分：干燥头状花序供药用，夏秋采集。 用途：性味微咸，平。能平肝明目。用量：1~3钱。
56	千里光	九里明，黄花母，七里光，千里急，千里及，九里光。	菊科 植物形态：多年蔓生大草本，长4米。茎细长，蔓生于灌丛或草丛中。叶互生，卵形或椭圆形披针形，长4~10厘米，宽2~4厘米，基部截形或戟形，先端渐尖，边缘有不规则钝齿，微波状或近于全缘，两面均有细柔毛，主脉隆起，侧脉7~8对，叶柄长0.5~1厘米。花黄色，顶生圆锥状排列的头状花序，边缘有舌状花，中央为管状花。瘦果圆柱形而有棱，有丰富白色冠毛。 生态分布：产我国中部，南部各省，多生于丘陵山地林边，灌丛和草丛、路边。 药用部分：全草入药，夏秋采收。 用途：性味苦，寒。能解热，消炎，明目。外用洗疮毒、痈肿及皮肤病。捣汁与胆汁熬膏，能去腐生肌，为治疮要药。有“识得千里光，永远不生疮”的传说。又可治小儿胎毒，用量：5钱~1两。
57	千斤拔	打地钻，金钢钻，钉家黎，蔓性千斤拔，吊马敦，钻甲梨，箭根，野黄芪	豆科 植物形态：落叶蔓性草本或亚灌木，高可达1米。幼枝有棱角，密被白色柔毛。叶互生，三出复叶，托叶2枚；小叶卵状长椭圆形至卵状披针形，长3~9厘米，宽1.5~4厘米，先端急尖或钝，全缘，具疏茸毛，表面绿色，背面浅绿色，密生长茸毛；叶柄长1~3厘米。花紫色，蝶形，短总状花序，萼5裂；花冠比萼略短；雄蕊10枚，两体，雌蕊1枚。荚果2瓣裂。 生态分布：产我国中部至南部各省，多生于丘陵、平地，荒山草地、路旁、田畦草丛中。 药用部分：根入药，夏秋采收。 用途：性味甘、微涩，无毒。能强筋壮骨，散寒解表。治产后关节痛，妇女白带，跌打损伤。用量：5钱~1两。
58	千金藤	金线吊虾蟆，大叶青香，土广木香，倒地拱，小青藤，金线吊葫芦。	防己科 植物形态：缠绕性落叶木质藤本；块根椭圆形，茎圆柱形，老茎木质化，幼茎绿色，长可达5米，全体光滑无毛，小枝纤细而柔韧，表面有细纵条纹。叶互生，广卵状卵圆状盾形，长4~8厘米，宽3~6.5厘米，基部近圆形，先端钝，全缘，表面深绿色，有光泽，背面灰白色，两面均平滑无毛，幼时膜质，老时略呈革质；叶脉掌状7~9条脉。花黄绿色，单性异株，腋生伞状至聚伞状花序；雄花萼片6~9片；花瓣3~5片，雄蕊6枚，花丝愈合呈柱状体，顶端药亦愈合呈圆盘状，雌花萼片、花瓣3~5片，无退化雄蕊，子房上位圆形，顶端有3~6裂的花柱。果核果状，近球形。

			<p>生态分布：产我国长江流域至南部及西部；多生于山坡灌丛边，溪畔，路旁。</p> <p>用药部分：秋季采根供药用。</p> <p>用途：性味苦、辛，寒，无毒。能祛风，利水，清下部湿热。治水肿，风湿痹痛，下部湿疮，虚劳及恶性疟疾有效；民间又用于治毒蛇咬伤。</p> <p>用量：1~5钱。</p>
59	千层塔	打不死，狗牙齿，矮罗汉，虱婆药、雪山一枝蒿。	<p>石松科</p> <p>植物形态：多年生常绿草本，高15~40厘米。茎直立1~2次两歧分枝，下部往往倾斜，着生多数须根。叶螺旋状或近于轮状排列，薄草质，长椭圆形披针形，长1~1.5厘米，宽0.2~0.3厘米，先端尖锐，基部渐狭，边缘具不整齐锯齿，中脉明显，表面微显粗糙，深绿色或黄绿色。孢子囊黄色，着生于叶腋，遍布上部叶腋或全株，无营养叶于孢子叶分别。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于林边灌丛、草丛、排水良好的坡地。</p> <p>药用部分：全草入药，全年均可采收。</p> <p>用途：性味甘、平、无毒。能退热止血，消炎解毒。用量：5钱~1两。</p>
60	万年青	铁扁担，斩蛇剑，开口剑，青鱼胆，包谷漆，竹根匕，金时代，开喉剑，蜈蚣七，海带青，鹅不吃，牛大黄。	<p>百合科</p> <p>植物形态：多年生常绿草本。根茎直立，肥厚而短，圆柱形，须根多数，细长。叶自根茎丛生，质厚，倒披针形或带形，长20~50厘米，宽约3~7厘米，基部渐狭，先端钝尖，全缘，平行脉明显，主脉较粗，有光泽，表面深绿色。花淡黄白色，肉穗花序，由叶丛中伸出，花被6枚，下面愈合成盘状，雄蕊6枚，子房上位，3室。浆果，球形，肉质，子房上位，3室。浆果，球形，肉质，桔红色或赤黄色。</p> <p>生态分布：产我国中部。</p> <p>药用部分：根茎及全草入药，全年可采。</p> <p>用途：性味甘，苦。能清胃降火，解毒，催吐，利尿。治咽喉肿痛、扁桃腺炎。有“开口箭”之称。用量：根茎鲜1钱~1两。</p>
61	万年松	无	<p>石松科</p> <p>植物形态：多年生常绿草本，高可达30厘米。基部分枝，上部再分成2~5回叉状分枝，小枝多弯垂。叶螺旋状排列，线状披针形，长约2厘米，基部无柄，先端渐尖，全缘，深绿色，平滑无毛。孢子囊肾形，淡黄色，无柄，着生于上部枝近梢端的叶腋内，不形成孢子囊穗，成熟后上面横裂成2片，放出黄色粉末状的孢子。着生孢子囊的叶片与不着生的叶片相同或稍短。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省，多生于山林中或瀑布附近阴湿的岩石积土上，与苔藓，石吊兰及兜藓（花石耳）一起生长。</p> <p>药用部分：全草入药，全年可采。</p> <p>用途：能治麻疹，有透发解毒作用。</p>
62	及己	四叶对，四叶细辛，四大天王，四大金刚，四块瓦，多穗金粟兰。	<p>金粟兰科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达60厘米。全体无毛，须根多数，茎一枚或数枚皆自根生，绿色无毛，中部4~5节。叶对生，4~6枚，常为4枚，生于茎端，故名“四大天王”。叶片椭圆形或卵状椭圆形，长7~10厘米，宽4.5~5.5厘米，基部楔形，先端渐尖或长尖，边缘有锯齿；叶柄长1~2厘米。花白色，顶生穗状花序，2~3条，花苞微小，鳞片状；无花被；雄蕊3枚，子房上位，1室。核果梨形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛，苦。能杀虫，祛风散寒，行血破瘀，止咳化痰，开胃，解毒。主治诸恶疮疥痂，皮肤虫痒。用量：1~2钱；对重症外伤科可用3~5钱。</p>
63	女贞	大叶女贞，女贞冬青，女贞子，白蜡树。	<p>木樨科</p> <p>植物形态：常绿乔木，高可达10米。树皮灰色，平滑，小枝灰绿色，皮孔黄褐色，细圆突起，甚明显。叶对生、革质，卵形或卵状披针形，长约7~11厘米，宽3~5厘米，全缘，基部广楔形，先端渐尖，表面深绿色，有光泽，背面浅绿色，花白色稍有芳香，顶生圆锥花序，萼钟形，4齿裂，绿色，宿存，花冠基部合生成管，上端4裂而反卷，雄蕊2枚，生在花冠的裂口处，子房上位，2室，花柱棒形，伸出于花冠外，浆果椭圆形，蓝</p>

			<p>黑色，表面被白粉。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省。</p> <p>药用部分：果入药，秋季采收。</p> <p>用途：叶，性味微苦、平，无毒。果实，性味甘、苦、平，无毒。果能强健筋骨，补益精血，治肝肾阴亏、腰漆酸软，阴虚发热及头晕等症。</p> <p>果（女贞子）用量：2~5钱。</p>
64	女萎	木通，万年藤，白龙须，山木通，木通草，白木通。	毛茛科 <p>植物形态：落叶攀缘性藤本，茎长达10米左右，有纵沟密被细毛。叶对生，三出复叶，中央小叶较大，卵形或广卵形，长3~7厘米，宽2.5~5厘米，基部圆或稍呈心脏形，先端尖，边缘有2~3粗缺刻，多为三浅裂，叶两面及柄皆密短茸毛，叶柄长5~10厘米，常呈卷曲，两侧小叶柄长0.5~2厘米，中央小叶柄长1.5~4厘米。花白色，腋生圆锥状聚伞花序，花被4枚，外面毛茸密集，雄蕊多数，雌蕊多数，分离。瘦果细小，狭卵形，果成熟时花柱延长呈羽毛状。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部：多生于山坡或灌丛中。</p> <p>药用部分：根、茎藤入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能止痢，消食，降心火，清肺热，利湿热，镇痛，排脓，消水消肿。用量：3~5钱。</p>
65	卫矛	五加皮，鬼箭羽，四棱树。	卫矛科 <p>植物形态：落叶灌木，高达3米，小枝通常四棱形，上有2~4片硬木栓质羽翼，棕褐色，为卫矛的主要特点。叶对生，椭圆状长椭圆形以至披针状长椭圆形，长1.5~8厘米，基部狭窄，先端渐尖，边缘为细锯齿。花黄绿色，腋生聚花序，萼、花冠及雄蕊均为4数，子房与花盘合生，1~3室，上位。蒴果倒卵圆锥形，种子多数红色，并有桔红色假种皮。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于山坡疏林或灌丛中。</p> <p>药用部分：茎、叶、枝入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味酸、苦，寒。为通经药，用于止血崩，产后瘀血，经闭，瘀血性腹痛。用量：1钱5分~5钱。</p>
66	马勃	灰菰，牛尿菰。	马勃科 <p>植物形态：子实体球形，大形，径10~30厘米，最大达50厘米，幼时内外纯白色，内部肉质，稍带粘性，易破裂，皮层三层，厚1.2~1.6毫米，表面平滑，成熟时有水液浸出，内部组织崩解，最后全体干燥，化为黄褐灰色，轻松而富弹力，受震动时会散出孢子。孢子球形而小，褐色。</p> <p>生态分布：产东北、内蒙至长江中下游各省；多生于松林或疏竹林下的草丛或荒山草地上。</p> <p>药用部分：子实体及孢子入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味平、辛，无毒。孢子为收敛性消炎止血药。治吐血、衄血。拌蜜涂抹治恶疮、马疥，又可治扁桃体腺炎及咳嗽。用量：1~3钱，作煎剂。</p>
67	马兰	铁马边，田边菊，黄鳅串，一枝香，马兰格，田埂菜，黄鸡菜，马兰头，马连甲，鱼鳅串，路边菊，紫菊。	菊科 <p>植物形态：多年生草本，高约80厘米。地下有根茎，匍匐平卧，白色，节上有鳞片1枚；地上茎圆柱形，肉质，绿色，带紫红色，光滑无毛。叶互生，近于无柄；叶片为倒卵形，椭圆形至披针形，长2~7厘米，先端有尖头，边缘有粗锯齿或浅裂或为羽状深裂，裂片形式甚不一致，通常下部的叶有锯齿或浅裂，中部的叶有时为羽状深裂，上部分枝的叶形小而全缘，少分裂，为披针形，但无论锯齿、浅裂或深裂其裂片的先端都有尖头凸出，基部狭楔形，表面绿色，背面淡绿色，无毛，只边缘有疏毛，下部叶的叶脉有时甚明显。花淡黄紫色，顶生头状花序，总苞片2~3列，彼此分离；边缘为舌状花。中央为管花状。瘦果扁平；无冠毛，但有极小的鳞片</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于溪边、荒山草地，田边；村落、城镇庭园湿地均有生长。</p> <p>药用部分：夏秋季采收全草入药。</p> <p>用途：性味辛、微苦、温、无毒。能消食积，除湿热，利小便，退热止咳，解毒，治外感风热，肝炎，消化不良，胃溃疡，中耳炎，疖肿及蛇伤。用量：5钱~1两。</p>

68	马齿苋	瓜子菜，耐旱草，长寿菜，九头狮子草，长命菜，酸苋。	马齿苋科	<p>植物形态：一年生肉质草本，茎圆柱形，下部匍匐，上部直立，淡红色，偏体无毛。叶对生，肉质而肥厚，有短柄，长椭圆状倒卵形或长方形，长1~2厘米，宽6~10毫米，基部阔楔形，先端圆或微凹，全缘，表面深绿色，背面淡绿色。花淡黄色，无柄，单生或数朵丛生枝端；总苞叶状，4~5片，膜质；花萼2片，花瓣5瓣，雄蕊12枚，雌蕊1个，子房半下位，1室，卵形，花柱较花丝短，顶端4~5裂。蒴果盖裂，种子细小，多数，黑色。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于园庭及路旁，田边及荒地中。</p> <p>药用部分：全草供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：性味酸、寒，无毒。为解毒治疮药，有消炎利尿作用，对细菌性痢疾有显效，又治虫蛇咬伤。用量：2钱~1两。</p>
69	马鞭草	铁马鞭，狗尾巴，五枝香，酒药草，疳积草，铁扫把，紫顶龙芽草，刀口草。	马鞭草科	<p>植物形态：多年生草本，高达120厘米。茎4方，棱及节上有刚毛。叶对生，基叶倒卵形，或长卵形，长4~6厘米，宽1~4厘米，基部楔形，先端尖，边缘有粗锯齿和缺刻，叶片形态不一，多数3深裂，大裂片复分小裂片，两面具粗毛，有柄。上部叶深羽状分裂或有齿牙，或渐小而披针形，有时裂片下延成翼或无柄。花淡紫色或蓝色，顶生及腋生穗状花序，总花梗具四棱，花萼管状，5裂，花冠漏斗状，5浅裂，雄蕊4枚，二强，子房上位，4室。蒴果，长方形，成熟时裂成4小坚果。</p> <p>生态分布：产我国南北各省，多生于路边或村落城镇庭园中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋均可采收。</p> <p>用途：性味苦、寒，有微毒。治下部匿疮，症瘕，久疟，痈肿，疝痛，月经不调，闭经，喉痹，乳痈，赤白痢，梅毒。用量：1钱5分~3钱。</p>
70	马甲子	铁菱角，铁篱笆，马甲刺。	鼠李科	<p>植物形态：落叶灌木，高可达3米。树皮暗灰色，老枝灰色，新枝绿色，有绒毛。叶互生，阔卵形，长4~6厘米，基部广楔形，两边不对称，先端钝圆，边缘有锯齿，表面深绿色，有光泽，无毛，背面淡绿色，无光泽，脉上具微毛，叶脉为基出3主脉；叶柄长约5毫米，有毛，基部具2个刺状托叶。花淡黄绿色，腋生聚伞花序，花萼基部合生，杯状，上端5裂；花冠5瓣，着生于花托边缘，绿色，花盘黄色，甚显著，雄蕊5枚；子房大部陷入花盘之内，子房圆形，上位，3室。果为木质蒴果，扁圆形，边缘有浅翅。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于丘陵林边灌丛中，或荒山草地上，村落中常栽植为围篱。</p> <p>药用部分：根、叶入药，10~11月挖根，四季采叶。</p> <p>用途：性味苦、平，无毒。根能除寒活血，发表解热，消肿，治跌打损伤及心腹疼痛；叶治无名肿痛。每日用量：5钱~1两，作煎剂。</p>
71	马樱丹	野眼菜，臭草，五色梅，烂草，广叶美人樱，如意花。	马鞭草科	<p>植物形态：落叶直立或半藤本状有刺灌木，高达2米。茎方形，有钩刺或稍被毛，全株有恶臭气味。叶对生，卵形或长椭圆状卵形，长3~9厘米，宽2~3.5厘米，基部截形或楔形，先端渐尖，边缘有锯齿，表面粗糙而有短刺毛，背面被刚毛。花粉红、红色、黄色或橙红色，腋生头状花序，萼、花冠4~5裂，雄蕊4枚，子房上位，2室。果肉质，成熟时紫黑色。</p> <p>生态分布：归化植物，产我国广东南部及南海岛，各地庭园均有栽培。</p> <p>药用部分：花及全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：活血、清凉解毒。用量：3~5钱。</p>
72	马尾松	松树，青松，山松，从树。	松科	<p>植物形态：常绿乔木，高可达30米。有黄褐色柔软的小枝，树皮下部灰黑色，纵裂长方形的薄片，上部赤棕色，鳞片状剥离。叶螺旋状着生，针形，两枚1束，间有3枚者，长10~30厘米，柔细，鲜绿色，边缘有小锯齿，叶鞘长6~8毫米，永存，棕栗色乃至灰黑色。花单性同株，雄花黄色，雄花序常长椭圆形，多数聚生于嫩枝下部，雌花紫色，雌花序卵状球形，2~3枚着生嫩枝顶端，雄花1雄蕊，2花药；雌花胚鳞具2胚株。由胚珠发育成为具单翅的种子，多数种鳞聚生成“球果”，球果长椭圆形，卵圆形或卵状圆锥形，具短柄，暗褐色，至翌年十一月成熟，种鳞扁平，顶部有一隆起的鳞背，种子有斧状薄翅。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；丘陵山地海拔1000米以下地区均</p>

				<p>普遍有分布。</p> <p>药用部分：松油脂及松香、叶、根、茎节、嫩叶（俗称树心）等入药。</p> <p>用 途：性味苦、温、无毒。能祛风湿，活血祛瘀，止痛，止血。用量：根，叶5钱~1两。</p>
73	马瓠儿	老鼠拉冬瓜	葫芦科	<p>植物形态：柔弱，多年生草质藤本，长达2米，有不分枝的卷须；块根似薯状，叶互生，膜质，三角卵形，长3~8厘米，基部戟形，先端尖或渐尖，全缘或有不规则的钝齿或稍分裂，两面均粗糙而有白色小斑点；叶柄稍较叶耳为短。花白色，单生或丛生叶腋，单性同株，萼、花冠均5裂，雄蕊3枚，子房下位，1室。瓜果卵形或椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于山坡灌丛边。溪谷边，村落附近也有生长。</p> <p>药用部分：根及全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、苦、微涩，微寒。能消肿拔毒，除痰散结，清肝利水。主治痈疮疔肿、皮肤湿疹；咽喉肿痛、腮腺炎；尿路感染、结石；急性结膜炎，小儿疳积。用量：干根5钱~1两，水煎服。外用鲜根、叶捣烂或干根研粉调敷患处。</p>
74	马尾黄连	马尾莲，尿桶草，金丝黄连，多叶白莲草。	毛茛科	<p>植物形态：多年生草本，高约60厘米，可达1.5米。根木质、粗大，须根亦较粗而长，断面均呈黄色。茎直立、光滑、绿色或暗紫色。叶为3~4回三出复叶，总叶柄基部膨大，鞘状，有耳；小叶阔倒卵形至阔卵形，有时椭圆形或扁圆形，长1~3厘米，宽1~2厘米，边缘为深浅不一的大齿裂，齿端钝或有短刺，基部通常心脏形，表面白灰绿色，背面较淡。花紫红色，顶生圆锥花丛，苞片卵状披针形，有3条显著的脉纹；花梗约1厘米，纤细；萼4~5片，无花瓣；雄蕊多数，心皮2~5个，分离。果2~5个。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部；多生于山林边或山坡草地。</p> <p>药用部分：根供药用，9~11月至次年1~2月挖采。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。能清热祛风，去皮里膜外及筋络之郁热。治小儿热症伤风及豆疹难透。用量：1~3钱。</p>
75	唐松草	水黄连，白蓬草，福氏白蓬草，软水黄连。	毛茛科	<p>植物形态：多年生宿根草本，高可达50厘米。茎纤细，略直立，有时呈倾卧状，微扁形，有棱纹，绿色带紫色。叶互生，3出的2~3回羽状分裂；叶柄细长，约为6厘米，叶片近于圆形，长15~22厘米，先端圆，边缘在中部以上有5~7个圆齿，基部楔形或圆形，表面绿色，背面粉绿色，基生5脉。花淡紫红色，顶生伞形圆锥花序，花被4片，早落；雄蕊10枚；雌蕊2~4枚，离生，子房纺锤形，有4棱。瘦果长椭圆形，两端尖，有棱。</p> <p>生态分布：产我国中部及长江流域各省；多生于山坡湿润的树阴下，溪流旁边，或岩石积土上。</p> <p>药用部分：3~4月采集全草入药。</p> <p>用途：性味苦寒，无毒。治目赤，热痢，黄疸，胃热及蛔虫病，并消肿，去湿，犬咬伤。用量3~5钱。</p>
76	飞燕草	还亮草，峨山草乌，鱼灯苏，车子野芫荽。	毛茛科	<p>植物形态：一年生草本，高35~50厘米；根纤细稠密，茎直立，叉状分枝，具棱线，密被白色丝状毛，下部有时呈淡紫色。叶互生，1回羽状复叶，最下一对小叶位于总叶柄基部，贴附茎上，小叶片更分裂呈深浅不等的缺刻状裂片，裂片边缘有时又呈疏齿状，顶生裂片锐尖或长尖，表面深绿色，背面淡绿色，质地柔软；下部小叶柄长1~2厘米，上部小叶柄较短或几无柄；位于茎上部的小叶均无柄而呈羽状全裂，总叶柄长2~4.5厘米；位于茎下部的叶柄较长，被白色丝状毛。花淡紫红色，顶生总状花序，花两侧对称，花萼5片，基部稍合生，在背部的一片，基部延伸成6~8毫米的长距；花瓣4片，上方两瓣斜楔形，中央有浅凹口，基部成距状延伸于萼距内，下方两瓣圆卵形，深2裂，基部狭窄成爪；雄蕊多数；雌蕊心皮常3枚，分离，子房表面密生白色柔毛，上位，各1室，花柱短。果为聚生骨突果，顶端有宿存花柱呈钩曲状嘴；种子4~5粒、球形，具有螺旋状环褶。</p>

				<p>生态分布：产我国长江以南各省，多生于溪谷草丛，疏林下或林湿处。</p> <p>药用部分：全草药用，夏秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、温，有毒。能镇痛、祛风除湿；治中风半身不遂，风湿筋骨疼痛并治痢疮癰癤。用量：8分~2钱。</p>
77	飞龙掌血	勒钩，血见飞，溪椒。	芸香科	<p>植物形态：常绿藤状灌木，高达2米，茎枝有明显的皮孔和下弯的钩刺。叶互生，3小叶，叶柄长2~4厘米，小叶椭圆形，或倒卵状椭圆形，长4~7厘米，宽1.3~2厘米，基部楔形，先端锐尖，边缘有细锯齿，表面绿色光泽，背面主脉上有钩刺。花单性，黄绿色，腋生圆锥形花序，萼，花瓣，雄蕊4~5枚，子房上位，5室。浆果扁球形，果皮有油腺点，熟时黄色。</p> <p>生态分布：产我国东南至西南各省，多生于山坡林边，沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：根、茎皮入药，全年可采。</p> <p>用途：性味辛、甘、微苦、温，有小毒。能祛瘀、止痛。主治胃病，风湿肿痛，外伤疼痛。肋间神经痛，疖疮肿毒。用量：皮4~6钱。</p>
78	山秋	牛舌草，大火草，白头翁。	菊科	<p>植物形态：多年生草本，全草密被白色绵毛，高达60厘米。叶互生，线状披针形至长椭圆形，长约8厘米，宽达2厘米；向上渐小渐尖，基部常抱茎，无叶柄，叶表面绿色，有白色绵毛，背面白色，密被白色绵毛。花淡黄白色，顶生头状花序，排成伞房状，总苞多层，白色，干膜质，头状花序全为管状花，边缘为雌性花；中央为两性花，多不孕。瘦果长椭圆形，冠毛羽毛状，白色，一列。</p> <p>生态分布：产我国中部，多生于山坡灌丛边及荒山草地。</p> <p>药用部分：全草及根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、苦，有小毒，能消肿散毒，治跌打损伤，红肿，瘰癧疮毒，痢疾腹泻，（胃弱，久痢忌用）。用量：2~3钱。</p>
79	山茶	山茶花，晚山茶。	山茶科	<p>植物形态：常绿灌木或乔木，高达10米。叶互生，革质，表面平滑，光亮，具短柄，叶片卵形或椭圆形，长5~10厘米，宽3~4厘米，边缘具小锯齿，基部圆形或阔楔形，先端渐尖。花单生枝顶，无柄，红色，淡红色或白色，大形；单瓣或重瓣；小苞多数，萼5片，花瓣通常5~7片，有时重瓣且与雄蕊合着；雄蕊多数合生；子房上位，3室，蒴果圆形，室背裂开。</p> <p>生态分布：产我国南方各省。</p> <p>药用部分：花入药，冬季采收。</p> <p>用途：性味苦、微辛、寒，无毒。花为收敛止血剂，主治肠胃出血，鼻衄，咳血及子宫出血。红茶花为吐血红崩要药之一，亦治肠风下血；白茶花治白带。外用火汤伤，创伤出血等。用时研末用麻油调。用量：1~3钱。</p>
80	山枸	南藤，香藤。	胡椒科	<p>植物形态：常绿藤本，常以气根攀缘于树上或石上，茎秃净，节上生根，长可达数米，全体有气香，叶互生，具柄，革质，长椭圆形或椭圆状披针形，长6~12厘米，宽2.5~4.5厘米，基部楔尖，先端渐尖，3脉或5脉而下面一对较小，两面均秃净，表面深绿色，背面灰绿色，叶柄长3~8毫米。花单性，绿色或黄绿色，穗状花序与叶对生，长于叶或短于叶；苞片圆形，盾状，无花被，雄蕊2枚，子房上位，1室。浆果球形，黄色。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省，多生于阔叶树林中的树皮上，以及沟谷阴湿处岩石上。</p> <p>药用部分：全草入药，四季可采。</p> <p>用途：性味辛、温。能祛寒，补肾状阳，舒筋活血。治风湿关节炎，咳嗽气喘，小儿高烧。用量：5钱~1两。</p>
81	山莓	三象皮，蛇泡子，三月藤，黄莓，悬钩子，三月桴，秧苗桴。	蔷薇科	<p>植物形态：落叶灌木，高达2.5米。茎上有刺散生，微向上曲。叶互生，卵形至卵状披针形，长4~10厘米，宽2~5厘米，边缘有不甚整齐的小锯齿，基部心脏形，从基部生出3脉，在近基部有短钝的裂片或无，先端尖，叶柄与主脉背面均具疏生钩曲的刺，在新苗枝条上所生的叶形状差异较大，一般叶形较大，均匀三裂，中央裂片较长，叶片上面淡绿色，新苗的叶色则浓些，下面灰绿色。花白色，单生于短枝端，萼片、花瓣均5片，雄蕊多数，雌蕊多数，心皮分离。核果集聚而成扁球形的聚合果，熟时红</p>

			<p>色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省，多生于林边、灌丛中、荒山草地，以及村落附近。</p> <p>药用部分：果实，全草及根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、涩，平。能活血、止血、治吐血，痔出血，赤白带下，月经不调，跌打损伤，遗精，疗虫牙痛及肾亏劳伤。孕妇忌用。用量：根5钱~1两。</p>
82	山姜	姜七，高良姜，鸡爪莲，九龙盘，箭杆风。	<p>姜科， 藎荷科</p> <p>植物形态：多年生常绿草本，高达80厘米。根茎匍匐，互相连结，棕褐色，有分枝，须根多数。叶互生，披针形至狭椭圆形，无柄或有短柄，长25~45厘米，宽5~7厘米，全缘，基部渐狭，先端渐尖，两面密生细软毛，尤以背面较多，中肋粗壮，表面凹下，背面隆起，侧脉多数，羽状，表面平贴，不明显，背面隆起。花白色，顶生总状花序。长10~15厘米，密生细毛，每花基部有长椭圆形苞片1枚，早落，花萼管状，3裂，花冠圆筒状，唇瓣阔，倒卵形，雄蕊1枚，子房下位，3室。肉质蒴果椭圆形，红色，有细毛，种子黑色，有芳香。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省。多生于沟谷林下阴湿处，或溪边灌丛中。</p> <p>药用部分：花、种子及根供药用。根全年可采，花、种子夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能除风湿，解疮毒，又为健胃剂。治霍乱，消化不良，风湿关节痛，又可解酒毒，根可治腹中冷痛，根茎含挥发油，可提取香料。用量：根2~8钱。</p>
83	山疆	副山苍	<p>樟科</p> <p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达6米。树皮平滑有黑斑，小枝黄绿色，无毛，叶互生，纸质，叶片椭圆形或倒卵状椭圆形，至椭圆状卵形，偶两侧不对称，长4~12厘米，宽2~5厘米，基部阔楔形或圆形，先端渐尖，全缘，表面绿色，无毛，背面灰绿色，被柔毛，老时脱落，叶脉羽状，侧脉5~8对；叶柄长5~12毫米，初时生有褐色柔毛，老时近无毛。花黄色，单性，异株，腋生伞形花序，花被6深裂，雄花有雄蕊9枚，花药2室，子房上位，1室。核果球形，熟时深红色。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省，多生于山坡林缘或路旁灌丛中。</p> <p>药用部分：根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛，温。能止血，消肿，治疥癣风疹。用量：8分~2钱。</p>
84	山麻	鸡树，马鞭麻；芙蓉麻，龟尾麻，掌叶麻，薏柠麻	<p>荨麻科</p> <p>植物形态：多年生草本，高可达1米。根暗赤色，茎圆柱形，有钝棱，密生白色短粗毛。叶对生，有柄，下部的叶圆卵形或扁圆形，长10~12厘米，宽11~15厘米，顶端锐尖，基部截形，边缘有三角状深齿牙、缺口愈近上部愈深，至顶端成三齿裂片，中间裂片锐尖，为龟尾状；上部的叶呈广卵圆形，长10~15厘米，宽9~11厘米，顶端长尾状锐尖，基部圆，边缘三角状齿牙较小；叶柄长1~5~3厘米，表面有短粗毛，背面被白色毛，托叶披针形。花绿色或紫色，单性，形小，腋生长穗状花序，通常比叶长，雌花序生上方，雄花序生下方，绿色或带紫色，雄花萼4裂，雄蕊4枚，与萼对生；雌花的花萼合生成筒状，紧包子房，雌蕊1个，有毛，花柱截形。瘦果长倒卵形，聚集成球状。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部各省，多生于溪谷及林边湿地。</p> <p>药用部分：根供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：治跌打损伤。</p>
85	山芝麻	白头公，野芝麻，假油麻，芝麻头，油麻甲，山油麻，岗芝麻，岗油麻。	<p>梧桐科</p> <p>植物形态：落叶矮灌木，高0.6~1.5米，枝密被茸毛。叶互生，长椭圆状披针形至狭披针形，长4~8厘米，宽1~1.5厘米，先端短尖或钝，基部钝，基出3脉，全缘，表面近无毛或薄被星状小柔毛，背面密被灰色星状茸毛。花淡紫色，2~4朵，丛生于腋生的短花序柄上，苞片线状，花梗短；萼管5裂，被茸毛，花瓣5枚，长约为花萼的一倍半，雄蕊多数，与雌蕊柄合生，子房上位，5室，蒴果卵状圆柱形，密被星状柔毛。</p> <p>生态分布：产我国南部。生于丘陵荒山草地上。</p> <p>药用部分：根、叶供药用，夏秋季采收。</p>

			用途：性味苦，寒。能清热，凉血，散瘀，通大便。用量：根3~5钱。叶捣烂敷疮毒。
86	山蚂蝗	逢人打，扁草子。	<div>豆科</div> <div>植物形态：小灌木，高1米余。茎下端有棱角。叶互生，三出复叶，顶端小叶椭圆状菱形，基部楔形，先端短尖或钝圆，两侧小叶为斜长椭圆形，长4~9厘米，宽1.5~3.5厘米，表面光滑，无毛，背面叶腋疏被柔毛，全缘，叶柄长2~6厘米，托叶线形，细小。花粉红色，蝶形，顶生总状花序，花梗很短，花萼筒状，5裂，旗瓣阔圆形，雄蕊10枚，单体。荚果2节，波状弯曲，被钩毛，易粘着人衣服。</div> <div>生态分布：产我国中部、南部及西南部各省。多生于山坡林缘，灌丛中，路边草丛及荒山草地中。</div> <div>药用部分：全草或根入药，夏秋采收。</div> <div>用途：同小槐花。能去瘀止血，消肿止痛。治崩中带下，跌打损伤，风湿关节炎，风湿腰痛，毒蛇咬伤。用量：全草3~5钱。</div>
87	山乌柏	山柳，红叶乌柏。	<div>大戟科</div> <div>植物形态：落叶乔木或灌木，高可达10米。小枝灰褐色，有皮孔，嫩枝及嫩叶带红色。叶互生，椭圆形或长椭圆形，长2.5~8厘米，宽1.5~3厘米，基部钝，先端短尖或钝，表面绿色，背面粉绿色或白色，叶柄柔弱，长约叶片的1/3，顶端有小腺体1~2个。花绿色，单性同株，顶生穗状花序，雄花常3朵聚生于一苞片内，雌花丛生于花序基部，苞片有腺体，萼3裂，雄蕊2~3枚，子房上位，3室。蒴果具3棱。</div> <div>生态分布：产我国东部至南部。多生于山坡疏林或沟谷丛林中。</div> <div>药用部分：叶及根皮入药，夏秋采收。</div> <div>用途：性味苦、涩、寒，有小毒。能散瘀、消肿、利尿。主治跌打扭伤、痈疮、毒蛇咬伤；大便秘结、小便不利，腹水等症。用量：干根皮3~5钱，水煎服。外用鲜叶捣烂敷患处。</div>
88	山扁豆	含羞草叶决明，夜合草，正西风草，蛇药，狗麻蛇药，土柴胡，飞天漆。	<div>云实科，豆科</div> <div>植物形态：一年生或多年生亚灌木草本，高达40厘米，上部有分枝，小枝密生灰褐色卷曲细柔毛。叶互生，一回偶数羽状复叶，长7.5~10厘米，叶轴有细毛，阴天或夜间小叶常合闭；小叶25~60对，对生，线状镰形，长3~10毫米，有尖头，中脉靠近上缘。花黄色，假蝶形，1~2朵生于叶腋，具短柄，柄上有细毛；萼5片，花瓣5片；雄蕊10枚，5长5短间而生，子房上位，1室。荚果线形，灰黑色，扁平，表面疏生细毛，种子16~25粒。</div> <div>生态分布：产我国南部各省。多生于梯田边，路旁荒田中，山坡灌丛及伐迹地常有生长。</div> <div>药用部分：全草及种子入药，秋冬季采收。</div> <div>用途：性味微苦，寒。种子为利尿剂，治肾脏炎，并有健胃整肠作用；根治痢疾并可祛痣，也用于治胃痉挛；全草可作蛇药。用量：全草1~2两。</div>
89	山木香	明目茶。狗屎刺，小果蔷薇。	<div>蔷薇科</div> <div>植物形态：落叶藤本状灌木，枝纤弱，有散生钩状的皮刺。叶互生，小叶3~5枚，长椭圆形，长3~5厘米，宽1~1.5厘米，基部钝形，先端渐尖，边缘有细锯齿，齿尖细而刚硬，两面均无毛，表面深绿色，背面较淡，通常顶端小叶较大，叶柄具刺，托叶尖形，边缘有细锯齿，易脱落，亦有宿存者。花白色。顶生伞房花序，萼筒光滑无毛，萼片，花瓣均5数，雄蕊多数，心皮多数，分离，隐常于萼筒内。瘦果，包藏于淡红色球形萼筒内，约5粒，成熟时黄褐色。</div> <div>生态分布：产我国长江以南各省，多生长于灌木丛和疏林边，荒山草地及村落边灌丛中也有生长。</div> <div>药用部分：根、叶药用，夏秋采收。</div> <div>用途：性味辛，无毒。能利尿泻下，并治哮喘、筋骨痛。用量：根3钱~1两。</div>
90	山慈姑	野薤子，光慈姑。	<div>百合科</div> <div>植物形态：多年生草本，地下鳞茎卵圆形，外包多层赤褐色膜质鳞片；中央为白色肉质鳞茎。叶通常2片，根生，广线形，基部下延呈鞘状，抱茎，先尖端，全缘，具平行脉，两面均光滑无毛，表面绿色，基部略带淡红色，长10~28厘米，宽6~12毫米。花白色，单生于花茎顶端，钟状，直立；花下通常有对生苞片2枚，短线形；花被6片，离生，二轮排列，狭长椭圆状披针形，先端尖，白色，外面有暗紫色纵纹；雄蕊6枚，3长3</div>

				<p>短，雌蕊1个，较雄蕊稍短，子房上位，3室，卵形，具三棱。蒴果绿色，倒卵形，有三棱。</p> <p>生态分布：产我国长江流域及河南，多生于丘陵草地路边及疏林下。</p> <p>药用部分：鳞茎入药，4月采收。</p> <p>用途：为清热解毒剂，功能清热，解毒，散结。主治痈疽，疗肿，瘰癧，结核等。</p>
91	山桔子	大力王，大黄鸡卵，酸桐子，白树仔，山竹子。	藤黄科	<p>植物形态：常绿乔木或灌木，高可达12米，树皮灰白色，粗糙；小枝绿色，无毛。叶对生，厚革质，卵形或长圆状卵形至长圆状倒卵形，长7~16厘米，宽2~8厘米，基部楔形；先端钝，急尖或渐尖，无毛，边缘反卷，干时背面褐色，中脉在表面凹下，侧脉纤细，每边10~20条，疏展，与中脉长50~60度角；叶柄粗壮，长1~4厘米。花橙黄色，单性，稀杂性，单生叶腋或腋生聚伞花形序，花萼、花瓣均4数，合生成4束，子房上位，2室。浆果球形，卵形至倒卵形，熟时青黄色；直径2.5~3厘米，顶端有宿存柱头；果皮有黄色树脂，果味酸甜，可食。</p> <p>生态分布：产我国南部及云南，多生于沟谷常绿阔叶树林中。</p> <p>药用部分：树皮、根、果入药，根夏秋采收，果秋季采收。</p> <p>用途：树皮性味苦、涩、凉，有小毒。能消炎止痛，消肿收敛。根可治关节炎症，果可做跌打损伤药用。用量：树皮5分~2钱。</p>
92	山核桃	小核桃	胡桃科	<p>植物分布：落叶乔木，高至30米。树皮灰白色，平滑，枝具坚实的髓部。叶互生，奇数羽状复叶，长20~35厘米，小叶5~7片，对生，披针形或倒卵状披针形，长9~18.5厘米，宽3.5~5.5厘米，基部楔形或宽楔形，先端渐尖，表面绿色，背面具锈黄色鳞状毛茸，边缘具锯齿，小叶柄极短，近无柄。花单性，和叶同时开放；雄花序常为三出的茅荑花序，生于当年生枝的基部，或二年生枝上的叶腋处，侧生而下垂，每1雄花生于3裂苞片内，花被3~6裂与苞片贴生，雄蕊3~10枚，雌花2~5朵排列成穗状花序，生于当年生枝顶上，花被4裂，和子房贴生，花柱2裂，有时分为3裂，子房下位，1室。果为核果状，倒卵形或近球形，具4棱，成熟时外果皮开裂略成4瓣；核圆卵形或广卵圆形。</p> <p>生态分布：产我国浙江,中部丘陵山地阔叶林中有分布，以赣西北一带较多。</p> <p>药用部分：种仁、外果皮、根皮果供药用。</p> <p>用途：种仁滋润补养，根皮及果皮治皮肤病。</p>
93	山樱花	山樱桃	蔷薇科	<p>植物形态：落叶小乔木，高达7米。树皮灰至暗灰褐色，具环纹，小枝灰白色，光滑无毛，皮孔呈细小横列。叶互生，倒卵形至倒卵状椭圆形，长5~10厘米，宽2.5~5厘米，顶端短骤尖，或渐尖，基部宽形或近圆形，有时略呈浅心形，初展时嫩叶呈棕绿色或红棕色成长后表面绿色，背面浅白绿色，两面均无毛，主脉和侧脉背面隆起，侧脉7~8对，边缘具稍不整齐尖锐锯齿，齿端具腺体；叶柄长1.5~2.5厘米，上面通常具2枚盘状腺体，并生或上下着生，无毛；托叶线状披针形，边缘具尖裂。花白色或淡红色，与叶同时开放或略先于叶开放，顶生伞房状或伞形花序，少有几朵簇生的。萼筒5裂，花瓣5片，雄蕊多数，子房上位，1室，光滑无毛，柱头头状。核果短椭圆形，或圆球形，熟时暗紫色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省，生于山坡林缘或疏林内，以及溪谷林中。</p> <p>药用部分：种子入药，夏采收。</p> <p>用途：透发麻疹。用量：3~5钱。</p>
94	山椒草	塌地草、卜罗草	荨麻科	<p>植物形态：多年生匍匐草本。茎细长，少分枝，长达30厘米，密被微细毛，带褐绿色。叶互生，具极短的柄，在茎上为二列平开，歪倒卵形，略带肉质，长5~10毫米（有达20毫米），宽4~8毫米，顶端钝圆，基部内侧楔形，外侧耳状圆形，缘有波状齿，表面暗绿色有伏贴的毛，背面脉上有短毛，基部有细小的托叶。花单性，异株，腋生聚伞花序，雄花序有梗，雌花序无梗，稍成球形，花被5片，宿存，雄蕊5枚；在雌花中有微小假雄蕊，雌蕊1个。瘦果椭圆形，表面有瘤状突起。</p>

			<p>生态分布：产我国长江以南各省，多生于山坡林边阴湿处或沟谷岩石湿处。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：用于关节扭伤，用量：1~5两。</p>
95	山鸡椒	毕澄茄，澄茄子， 呈茄子，山苍子， 木姜子。	樟科 <p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达5米。有的幼枝与叶背中肋有疏毛，全体光滑，枝条细瘦，呈黑褐色。叶互生，有香气，具细柄；叶片披针形，长6~12厘米，表面绿色，背面灰白绿色，基部楔形，先端渐尖、全缘。花单性异株，与叶同时开放，腋生伞形花序，有花4~6朵；花被6片、雄花有雄蕊9~12枚，分3~4轮排列，花药4室；雌花子房上位，1室，花柱短、柱头头状而扁宽。核果球形，黑色平滑，有芳香气味。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省，多生于山坡林边及灌木林中。</p> <p>药用部分：夏末秋初果实成熟时，采下，晾干。或用根皮及叶供药用。</p> <p>用途：性味辛、微苦，有香气，无毒。能温肾健胃，行气散结。治胃痛呕吐，肾与膀胱冷气及无名肿毒。用量：1钱5分~1两，叶1~2钱。</p>
96	山胡椒	榨子风，诈死枫， 白叶枫，老来红， 家藻柴，枯死柴， 野胡椒，大叶见风 消。白叶子数。	樟科 <p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达4米。树皮灰白色，小枝秃净，密被短毛，叶互生，叶柄长约5毫米；叶片长椭圆形至倒卵形，长4~7厘米，宽2.5~4厘米，全缘，基部稍圆至钝形，先端锐尖，表面深绿色，有光泽，背面灰绿色，幼嫩时被短毛，侧脉6~7对。花黄绿色，单性，异株，数朵丛生于头年生枝叶的叶腋；花被6裂，雄花有雄蕊9枚，药2室，雌花的雌蕊单1，子房椭圆形，上位，1室，周围具不发育的雄蕊痕迹。核果球形。</p> <p>生态分布：产我国中部各省，多生于松杉林，疏林边及灌木丛中；荒山草地中有时也生长。</p> <p>药用部分：多于9~10月采挖其根及叶（其它季节亦可采集），晾干后供药用。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。治风湿麻木，筋骨疼痛，跌打损伤，腰膝作痛，叶可祛风消肿毒，作刀伤药。用量：根5钱~1两。</p>
97	五加皮	鸡脚风，五加风， 五皮风，木骨，五 佳，五花，豹漆， 豹节，全盐文章 草。	五加科 <p>植物形态：落叶灌木，茎高可达3.5米，杆枝均有刺。叶互生，五出掌状复叶，有长柄、小叶倒卵形或倒卵状长椭圆形，长达2~6厘米，宽7~23毫米，先端锐尖，基部楔形，表面疏生刚毛，质薄，边缘有锯齿。花绿白色，小形，腋生，伞形花序，萼筒与子房贴着，5裂，花瓣5片，雄蕊5枚，子房下位，2室。果球形，黑色，浆果状。</p> <p>生态分布：产我国北部至南部，多生于山坡疏林及沟谷灌丛中。</p> <p>药用部分：根皮入药，秋冬采用。</p> <p>用途：性味辛，温。用作强壮药。治阳痿及筋骨疼痛，疝气腹痛，风湿筋骨痛，并有增加精力之效。用量：1钱5分~3钱。</p>
98	六月雪	白马骨，小黄金， 白毛骨，白麻骨， 千年矮，路边荆， 满天星，过路黄 荆。	茜草科 <p>植物形态：半常绿灌木，高可达1米，通常高约60厘米。枝粗壮，灰白色。叶对生，或由于小枝缩短而成丛生状，倒卵形，椭圆形或倒披针形，长1~4厘米，宽0.7~1.3厘米，基部渐狭成一短柄，先端短尖，托叶基部膜质而阔，顶端有锥尖状裂片数枚。花白色，丛生于枝梢，苞片斜方状椭圆形，膜质，萼5裂，花冠漏斗状，4~6裂雄蕊4~6枚，子房下位，2室。核果球形。</p> <p>生态分布：产我国中部，南部各省；多生于林边、灌丛中，荒山草坡、溪边。村落附近也有生长。</p> <p>药用部分：根、茎、叶均供药用，夏、秋、冬均可采用。</p> <p>用途：性味淡，平。能活血，凉血，疏肝泻湿，消肿止痛；止水痢。治急慢性肝炎，黄疸，肠炎腹泻，恶疮肿毒，淋巴结核。用量：5钱~1两。</p>
99	六月霜	千层楼，沙氏鹿茸 草，鹿茸草，白丝 草，千层矮，龙须 草，毛茵陈，土茵 陈，千年春，白头 婆婆。	玄参科 <p>植物形态：常绿多年生草本，高10~30厘米。全体密被白色茸毛，茎丛生，细硬，节间短。叶对生或3枚轮生，密集，狭披针形，长0.5~2厘米，宽0.1~0.2厘米，基部楔形，先端短尖，全缘，无柄。花淡红色，单生叶腋，苞片2枚，花萼4裂，钟状，花冠唇形，5裂，雄蕊4枚，2强，子房上位，2室。蒴果，长圆形，先端尖锐，具纵沟。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省，多生长于山坡林边、灌丛下及荒</p>

			<p>山草地。</p> <p>药用分布：全草入药，夏、秋、冬季均可采收。</p> <p>用途：性味微苦、淡平，无毒。能凉血，止血。用量：5钱~2两。</p>
100	天葵	紫背天葵，千年老鼠屎，天葵子，小乌头，夏无踪。	<p>毛茛科</p> <p>植物形态：多年生小草本，高可达30厘米。块根肉质，略呈纺垂形或椭圆形，外皮棕黑色，下部有细长枝根和须根；茎纤细，数枝自块根丛出，被白色细柔毛。叶有根生叶及茎生叶2种，均柔嫩；根生叶为三出复叶，具长柄，基部扩张似叶鞘，小叶柄长3~5毫米，有细柔毛，小叶片近圆形，基部广楔形，长1.5~2厘米，三深裂，每裂片先端又有2~3个圆齿状缺刻；表面绿色，背面带紫色；茎生叶与根生叶相似，惟形较小，互生，愈至上部的愈小，小叶长约1厘米，宽约1.5厘米，小叶柄短。花白色，微带淡红色，单花，顶生或腋生，萼片5，花瓣状，狭长卵圆形；花瓣5枚，倒长卵形，较萼片略短，下部连合成筒状，基部背面伸展呈短矩状，雄蕊8~14枚，通常10枚，分离；雌蕊3~4枚，偶为5枚，分离，骨突果3~4枚。生态分布：产我国长江流域或以南各省，常生长于山野石缝中隐蔽处，草地，田野路旁，村落城镇，庭院间也有生长。</p> <p>药用部分：块根入药，5~6月间挖取洗净，晒干除去须根。</p> <p>用途：性味苦、甘、寒，有小毒。能清热解毒，化结止痛，消瘰癧，治肺结核，淋巴结核，无名肿毒，癰疽，疮毒，蛇咬伤，小儿凉风。用量：1~3钱。</p>
101	天胡荽	小叶破铜钱，小金钱草，烂金钱，小叶片地香，破铜钱，鸡肠草，野园荑，细叶钱蒿。	<p>伞形科</p> <p>植物形态：多年生贴地的匍匐草本；茎节上生根。叶圆形或近肾形，直径6~15毫米，基部心脏形，5~7浅裂，裂片短，有2~3个钝齿，两面光滑无毛，或背面被毛，叶柄纤细，长1~3厘米。花白色，有淡红紫晕，腋生伞形花序，而与叶对生，每伞形花序具花10~15朵，萼，花瓣均5片，雄蕊5枚，子房下位，2室。双悬果略呈心脏形，分果每侧有一背棱、平滑，有时有红色小斑点。</p> <p>生态分布：产我国长江下游至南部各省，生于丘陵、平地、村落湿地，为庭园常见长片生长的小草。</p> <p>药用部分：全草入药，6~7月采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、微寒。全草有清热，散结，止咳，解毒，利小便，治砂淋，去目翳等作用。鲜草治齿缝出血，无名肿毒和肝硬变等症。和鸡蛋炒食，用退翳，并有止水蛭咬伤出血作用。用量：3~5钱。</p>
102	天师栗	猴板栗	<p>七叶树科</p> <p>植物形态：落叶乔木，高达25米，直茎1米。小枝褐色，有很多黄色点状椭圆形的披孔，被短柔毛。叶对生，掌状复叶，叶柄长6~15厘米，被短柔毛；小叶5~7枚，小叶柄长0.4~2厘米，也有短柔毛，小叶片倒卵状长椭圆形或卵状披针形，长10~20厘米，宽3~8.5厘米，先端突尖，基部宽楔形或近于圆形，边缘有细锯齿，表面仅于疏生有细柔毛，背面密生细柔毛，侧脉14~20对。花杂性，白色，顶生圆锥花序，尖塔形，长达35厘米，宽8厘米，花萼筒形，有不整齐的5浅裂，花瓣4枚，上2瓣较下2瓣窄长，花瓣的外面和边缘密生细柔毛，雄蕊6~8枚，花丝长短不等；两性花的子房上位，3室，卵形，密生细柔毛。蒴果卵形或倒卵形，顶端突起而尖，外表密生有黄褐色的斑点，成熟时3瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省，多生于海拔1000~1500米山林中。</p> <p>药用部分：种子入药，9~11月果实成熟时采摘。摘下后，整个晒干或剥皮晒干。</p> <p>用途：性味甘、温，无毒。理气宽中，杀虫。治胸膈胀痛，痞积，痢疾等症。用量：1~2钱。</p>
103	天名精	野烟兜，杜牛夕，臭花娘子，皱面草，野烟。	<p>菊科</p> <p>植物形态：多年生草本，全植物有苦味臭气。茎直立，上部多分枝，全体被细柔毛。叶互生，披针状椭圆形或长椭圆形，长5~15厘米，宽3~8厘米，基部楔形，先端尖或钝，全缘或有锯齿，表面绿色，背面有柔毛，下部叶有短柄，上部叶近无柄。花黄色，腋生头状花序，开花时下垂，总苞球形或近球形，花为位管状花。瘦果上部有粘液，易粘着人衣服上，借以传播果实。</p> <p>生态分布：产我国南北各省，多生于山坡疏林边，灌丛中，路边草丛中，</p>

				<p>村落附近也有生长。</p> <p>药用部分：叶、根、果实供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：性味微苦、温、有小毒，叶、根能下血、止血，利小便，去痹，除胸中结热，止烦渴，破血生肌，止疟杀虫，清热解毒。淤血，鼻衄，疔疮，痿痹，金疮内射，身痒瘾疹，恶虫蛇螫，牙痛，喉痹，止血，诸骨哽咽，风毒瘰癧。果实（北鹤虱）能杀五脏虫，止疟，治驱蛲虫，绦虫，蛔，去心痛，敷恶疮。用量：全草2~4钱，果实8分~1钱5分。</p>
104	天门冬	千条蜈蚣赶条蛇， 小青叶，狮子草， 天冬	百合科	<p>植物形态：多年蔓生草本。块茎呈纺垂形，丛生、肉质、茎披散或呈攀援状、多分枝，长可达2米，绿黄色，有纵行槽纹。小枝变态为叶状，枝常3~5个丛生，扁平而有棱，呈线形，略直或稍弯曲，先端锐尖，具一脉。叶退化为膜质的鳞片，生长于主茎上的鳞片叶常变为下弯的短刺。花白色或黄白色，下垂，1~3朵丛生，花被6片，排成2轮，长卵形，雄蕊6枚，子房上位，3室，浆果球形，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于山坡和沟谷林边灌丛中。</p> <p>药用部分：块根入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味甘、淡、寒。滋肺润燥，清热化痰，镇咳，止血，治肺病咳嗽、热病津耗、便秘，呕血等症。用量：1钱5分~3钱。</p>
105	天南星	天南心，独叶一枝 枪，虎掌草，南星， 蛇包谷	天南星科	<p>植物形态：多年生，只有一轮掌状复叶的草本，地下有球茎，高可达90厘米。叶为11~23小叶轮生于一直立圆柱形的总叶柄顶端，总叶柄基部有鞘片2，透明薄膜质，棕色并散生暗紫色斑纹，小叶长披针形，无柄，先端锐尖而延长呈细柔下垂线状，全缘，长约15厘米，宽约1厘米。花单性异株，为肉穗花序，佛焰苞淡紫或棕色，长7~14厘米，宽1.5~2厘米，具有明显的纵平行脉纹，下部苞筒具长柄，上方苞片稍扩张，顶端下垂，成长线状，长4~6厘米，花生于佛焰苞内的肉穗花轴上，雄花的花序上端，雌在下端。浆果成熟时鲜红色，复果似玉米状。</p> <p>生态分布：产我国南北各省，多生于丘陵山地阴湿的阔叶林下或沟谷林边湿地。</p> <p>药用部分：球茎入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、辛、温、有大毒，不可生用。为祛痰、镇痛、镇痉药。外用于金疮、折伤、瘀血、及虫蛇咬伤、疥癣等。用量：0.8~1.5钱。</p>
106	天蓝苜蓿	丫雀扭，三三光。	豆科	<p>植物形态：一年生或二年生草本，高达60厘米。分枝多，伏卧或斜上，披稀疏灰褐色绒毛。叶互生，3出复叶；小叶宽倒卵形或近圆形，长5~15毫米，宽4~10毫米，基部楔形，先端具突出短尖头，两面脉上被灰褐色细绒毛，侧脉略平行，直出叶缘，边缘上部具细齿，膜质，托叶大，卵形而顶端渐尖，全缘或疏锯齿、膜质。花黄色，蝶形，腋生，头状花序而排成总状；萼筒短，顶端具5裂，旗瓣倒卵楔形，顶端内凹，雄蕊10枚，两体；子房具短柄，花柱短，柱头弯斜成钩状。荚果弯，略成肾形，成熟后呈黑色，表面具显明不规则的纵纹，内藏种子1粒。</p> <p>生态分布：产我国南北各地，多生于郊野旷地上和路边，田埂草丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：治蜈蚣、黄蜂及毒蛇咬伤。用量：5钱。</p>
107	火炭母	黄鳝藤、晕药	蓼科	<p>植物形态：多年生蔓性草本，长约1.5米。茎圆柱形，略具棱沟，光滑或被疏毛或腺毛，斜卧地面或依附而生，下部质坚实，多分枝，匍地者节处生根，嫩枝紫红色。叶互生，叶柄有翅，叶线状长椭圆形，三角形至卵状三角形，长7~12厘米，全缘或具细圆齿牙，基部截形，浑圆，急尖或近心脏形，有时具2耳状裂片，枝上部叶心脏形，有短叶柄或无柄而抱茎，表面鲜绿或有紫黑色斑块，背面主脉有毛，托叶长而极斜截状，急尖。花白色、淡红或紫色，顶生头状花序，再组成圆锥或伞房花序，花序轴常被腺毛，无总苞，花被5裂；雄蕊8枚，子房上位，3室。小坚果三棱。</p> <p>生态分布：产我国南部两广；常生于向阳草坡，林边，河滩，村落附近也有生长。</p> <p>药用部分：全草及根入药，四季均可采收。</p>

			用途：性味甘、平，无毒。能清热利湿，凉血解毒。治头晕目眩，气虚耳聋，妇人白带；又为消毒药，治赤白痢和疮毒。外用于毒虫蛇咬伤；亦用为跌打刀伤要药。用量：全草1~2两。
108	元宝草	大叶对口莲, 穿心箭, 排草, 对经草, 对口莲, 刘寄奴, 铃香, 对月草, 对月莲, 合掌草。	金丝桃科 植物形态：多年生草本，高达80厘米。茎直立，有分枝。叶对生而两叶基部连成一片，形似“元宝”两叶合计长约10厘米左右，宽约2厘米，先端圆，全缘，表面绿色而带紫红色，背面灰绿色，密生圆形黑斑点。花黄色，顶生聚伞花序，长约7厘米，苞片1，萼5片，有黑色细点，花瓣5片，雄蕊多数，花丝合成3束，子房上位，3室。蒴果椭圆形。 生态分布：产我国长江流域或以南各省，多生于山坡草地，村落附近以及田园边也有生长。 药用部分：根，果实，全草入药，夏秋采收。 用途：性味苦，寒。能通经活络，止血生肌，止痛接骨，发乳。治月经不调，衄血，吐血，跌仆，挫痛，痛肿疗毒及蛇咬伤等症。孕妇禁用。 用量：全草3~5钱。
109	无患子	洗衫子树，肥皂树，肥珠子，月皂夹，无患树，木挽子，油患子，黄目树，目浪树。	无患子科 植物形态：落叶乔木，高达12米。树皮黄褐色，平滑；枝条淡黄褐色，有无数小皮孔，叶痕为丁字状倒心脏形，紫褐色。叶互生，偶数羽状复叶，全长可达45厘米，叶柄及叶轴圆而平滑，小叶5~8对，卵状披针形，长椭圆状披针形或长椭圆形，基部为偏斜楔形，先端长渐尖，全缘，长9~12厘米，宽3.5~5厘米，侧脉10~15对，在两面突出，细脉网状。花单性、淡黄色或淡紫色，顶生圆锥花序，萼片5枚，略为圆形，大小不等，花瓣5片，狭卵形，花盘缘边多为波状；雄花有雄蕊8枚，中有退化子房；两性花雄蕊小，子房卵形，上位，2~3室。核果扁球形，成熟后带黄绿色，内有坚核为紫黑色。 生态分布：产我国长江流域，现我国南部各省至海南岛均有栽植。 药用部分：果实、根，均入药秋季采果，根随时可采。 用途：根性味苦，凉。根能清解郁热，治感冒，白喉，扁桃腺炎，支气管炎，胃痛。果性味苦、微辛、寒，有小毒。能祛痰等，并能解河豚中毒及止疝气，风湿痛。花治眼痛。用量：果仁（无患子）多次蒸晒去毒1~3枚，根5钱~1两。
110	无花果	密果，奶浆果。	桑科 植物形态：落叶灌木，高可达5米。小枝粗壮，无毛。叶互生、厚而粗糙、有粗硬毛，3至5掌状裂，稀不分裂，基部似心脏形，有掌状叶脉，裂片通常倒卵形，先端钝，有不规则齿牙，表面深绿色，叶柄长2~5厘米，光滑或有长毛。花单性，为特殊的隐头花序，小花均隐藏于球形囊状总花托内，雌花花被4片，广线形，子房上位，1室，椭圆形、与花被片等长；雄花生于花托近口部苞片间，花被2~6片、线形、雄蕊1枚、丝状；球形花托单生于叶腋间，成熟时长5~8厘米，黑红色，光滑，厚肉质，成为倒卵形，肉质称“无花果”的假果。瘦果多数，细小，藏于无花果内。 生态分布：我国中部、南部广栽培。 药用部分：果实、叶、叶柄、乳液、入药，夏秋采收。 用途：果性味甘、平，无毒。治痔疮下血，下乳汁，疗喉痛，止泄痢。果实煅焦磨碎，可为咖啡代用品。叶煎汤熏洗有治痔疮作用。乳汁可疗痔疾。用量：果3~5钱，根5钱~1两。
111	毛茛	土细辛，鸭脚板，狗脚板，毛脚鸡，野芹菜，毛芹菜，鹅掌草，老虎脚板草	毛茛科 植物形态：多年生草本，高可达80厘米。根茎极短，须根发达；茎有棱，基部有毛或无毛。根生叶丛生，具长柄，柄长7~23厘米，有毛，叶片圆状肾形，3深裂，长约6厘米，宽约7厘米，裂片长圆状菱形，或斜卵形，中裂片再3浅裂，侧裂片比较宽大，2浅裂，裂片具尖齿牙，两面均密生白色长毛，下部茎生叶有柄，与根生叶相似，上部茎生叶无柄线形或线状披针形，有毛。花鲜黄色，顶生伞房花序，萼片，花瓣均5片，花瓣基部有蜜腺槽，雄蕊多数，分离，子房上位，各1室。瘦果倒卵形，稍歪。 生态分布：产我国南北各地，多生于溪边、田边湿地，村落、城镇附近旷地也常有生长。 药用部分：全草入药，夏秋采收。 用途：性味辛、温，有毒。能破冷气、截症。治恶疮痈肿，疼痛未溃。

				不可内服。
112	毛冬青	毛栋子，细叶冬青，茶叶冬青，喉毒药，高山东青。	冬青科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高约4米。小枝、叶柄和叶的主脉上均被有短柔毛，小枝有棱。叶互生，卵状长椭圆形，长2.5~5厘米，基部阔楔形，先端钝或渐尖，全缘或稍有锯齿。花淡紫色或白色，腋生伞形花序或丛生；萼片、花瓣、雄蕊均5~6枚，子房上位，多室。浆果球形，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国南部各省，多生于山坡阔叶树林中，或沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：根、叶入药，春、夏、秋均可采用。</p> <p>用途：性味苦，微寒。能凉血，止血，清热，解毒。治创伤出血、烫火伤及丹毒、疔疮喉毒、咽喉炎等。用量：5~7钱。</p>
113	毛大丁草	兔耳风，白头翁，扑地香，头顶一枝香，磨地香	菊科	<p>植物形态：多年生草本。地下有短而粗的根茎，全体密被白色绒毛，须根长而较粗，弯曲，有纤细的小根，干后表面有皱纹，褐色或灰色。叶基生，4~6片，叶柄短，叶片椭圆形或倒卵圆形，长5~12厘米，宽2~4厘米，先端钝圆，全缘，基部楔形，质较柔软，幼时表面被柔毛，老后脱落，鲜绿色，背面密被交错灰白色的绵毛。花白色，顶生头状花序单生于直立的花茎上，表面密被淡褐色绵毛，总苞片狭长披针形，上被淡褐色绵毛；舌状花在边缘，先端有3裂缺；管状花多数，在中央。果为瘦果，线状披针形，微扁，外有纵肋条，冠毛多数，丝状而细，淡红色，有光泽。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部，多生于荒山草地或山坡草丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，4~5月采挖。</p> <p>用途：性味辛、微苦、温，无毒。能疏风退热，止咳，解毒，消食滞，利水消炎。用量：3~5钱。</p>
114	毛叶石楠	糯米珠	蔷薇科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高达5米。树皮灰褐色，小枝细长，幼嫩时被灰白色柔毛，后变光滑，散生线状椭圆形皮孔。叶互生，倒卵形至长椭圆状倒卵形，长3~7.5厘米，宽1.8~3.5厘米，先端渐尖或短尖，有时为骤尖呈短尾状，基部楔形或狭楔形，表面绿色，幼时疏被白色柔毛，后渐脱落；背面淡绿色，密生白色长柔毛，后渐稀疏，但在沿主脉两侧较密，侧脉5~7对，叶缘具整齐尖细的锯齿，齿尖硬化，厚纸质，叶柄长1~3毫米，初时被灰色柔毛，后渐脱落，表面中央具沟。花白色，顶生伞房花序，花轴上被疣状小突起，花萼杯状，5浅裂；花瓣5片，雄蕊多数，子房半下位，2~4室，外被灰白色绒毛。果为小梨果，倒卵状椭圆形，熟时鲜红色，光滑无毛。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省，生于向阳山坡林缘或疏林下以及山麓路边灌丛中。</p> <p>药用部分：果、根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：用于恢复疲劳。</p>
115	云实	鸟不踏，红总管，百鸟不停，翻天云，刺皂角，云英，马豆，黄牛刺，牛王刺，鸟不落。	云石科，豆科。	<p>植物形态：蔓生有钩刺落叶灌木，长达3米左右。枝细长，蔓性，绿色，微有细毛。叶为2回羽复叶，长22~30厘米，有3~10对羽片，羽片有6~12对小叶，小叶长椭圆形，膜质，长10~25毫米，宽6~10毫米，先端钝，叶轴近方形，有沟刺，表面绿色，背面有白霜，托叶早落。花鲜黄色，顶生总状花序；花萼5片并向下折卷，花冠5瓣，其中有4瓣大，1瓣小；雄蕊10枚，离生，花丝中下部密被细毛，花药紫红色；雌蕊1枚，柱头赤色。荚果，长椭圆形，种子6~9粒，长椭圆形，棕色。</p> <p>生态分布：产我国南部及长江流域各省；丘陵盆地有分布。多生于河边，山坡，灌丛及路边。</p> <p>药用部分：根、茎或根内寄生虫入药，秋季采收。</p> <p>用途：果性味辛、温，有小毒。根性味苦、涩，温。根能发表散寒，活血通经，解毒杀虫。治筋骨疼痛及跌打损伤及毒蛇咬伤等。用量：果1~3钱，根3钱~1两。</p>
116	王瓜	苦瓜莲，南盖仔，老鸦瓜，土瓜，野苦瓜，公公须。	葫芦科	<p>植物形态：多年生草质藤本。根肥大，块状。茎细长，有卷须。叶互生，有柄，叶片掌状裂，长宽约6~10厘米。浅3~5裂，具锯齿缘，粗涩有毛茸，下部叶片有时分裂较深。花白色，腋生，单性异株，雄花少数，短总状</p>

			<p>花序，萼长筒状，5裂，花冠5裂，裂片边缘细呈丝状，雄蕊3枚连合，雌花萼与花冠均5裂，子房上位，1室。瓜果球形至长椭圆形，熟时带红色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省及至台湾等地，多生于溪边，沟谷灌丛和草丛中。</p> <p>药用部分：根入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。能利尿，泄热，解毒，通经，催乳等，治黄疸，经水不利，带下，二便不通，小偏如泔，痈肿，面疮及蛇伤等。用量：3钱~1两。</p>
117	王不留行	禁官花，金盞银台。	<p>石竹科</p> <p>植物形态：一年生草本。全体平滑无毛，茎直立，高可达50厘米，节处略膨大，上部分枝，带粉绿色。叶对生，卵状披针形至线状披针形，长1.5~7.5厘米，宽8~18毫米，全缘，基部抱茎，先端渐尖，两面粉绿色，花淡红色，顶生聚散花序，花梗细长，下有鳞片状小苞2枚，萼筒卵状圆筒形，先端5裂，花后萼筒中下部逐渐膨大，花瓣5枚，倒卵形，先端有不整齐的小齿牙，雄蕊10枚，子房上位，1室。蒴果卵圆形。种子球形黑色。</p> <p>生态分布：产我国北部及中南部各省。</p> <p>药用部分：苗及种子入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、苦、平。为催乳剂，适用于乳汁不通和乳少等症。外用可止血，镇痛，治诸疮痈肿。用量：1.5~5钱。</p>
118	瓦韦	剑丹	<p>水龙骨科</p> <p>植物形态：附生于岩石、树皮上的多年生常绿草本，高至20厘米。根茎稍粗壮，横走，密生黑褐色乃至暗褐的鳞片，下生须根，鳞片质厚，线状钻形，基部广卵形。叶片由茎根抽出，并列丛生，革质而厚，表面深绿色有</p> <p>小孔点散布，线状披针形，长10~15厘米，宽1~1.5厘米，基部渐狭，先端渐尖、全缘，具短柄，背面淡绿色，</p> <p>中肋显著隆起，支脉与细脉呈网孔状，但隐没于叶肉中。孢子囊群圆形而大，黄色，生于叶背面的上半部，列于中肋的两侧，形成二纵列的大园点。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于阔叶树林中的树皮、岩石上，山区瓦屋上常有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，全年均可采用。</p> <p>用途：性味苦，平。能利尿。治疗淋病，又为治痢药。用量：1钱5分~3钱。</p>
119	瓦松	鳞瓦松，流苏瓦松。	<p>景天科</p> <p>植物形态：多年生肉质草本，茎高15~35厘米。全体粉绿色，无毛，茎基部的叶密生似莲座状，叶片线形至倒披针形，肉质，长2~3厘米，绿色带紫或具白粉、边缘呈流苏状裂边和一针状尖头，茎上叶线形至倒卵形。花红色，顶生聚伞花序，花萼5片，卵状圆形，先端尖，成刺状，花瓣5片，披针形至长卵形，先端尖，雄蕊10枚，心皮5个，分离，子房上位，1室。果为聚生果，基部鳞片四方形，先端略凹陷，种子无翅。</p> <p>生态分布：产我国东北，北部、及东部各省；多生于岩石上及山区村落的瓦屋上。</p> <p>药用部分：全草入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味酸，平，有毒。有通经络，散风，清热，止血等功效。治口干，大便下血，血痢，疮口不敛等症。用量：5分~1钱。</p>
120	乌药	旁皮卵，彭皮卵，盐鱼子柴，青蛙树叶，百叶紫，天台乌药，香桂梓，香叶子树。	<p>樟科</p> <p>植物形态：常绿灌木或小乔叶，高可达5米，根木质，膨大粗壮，略呈念珠状，根皮淡紫红色，内部白色。树皮灰绿色。叶互生，三出脉，革质，椭圆形至卵形，基部圆形或锐形，先端长尖或为短尾状，全缘，长1.5~7.5厘米，宽1.4~4厘米，表面绿色有光泽，背面淡白色或蓝色，密被灰白色无毛，两面均有凹点密生，三主脉由基部发出，极为显著，叶柄长0.5~1</p>

				<p>厘米。花单性异株，黄绿色，腋生伞形花序，花被6片，雄花有雄蕊9枚，排成3轮；雌花有退化雄蕊多枚，子房上位，球形，1室。核果黑色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省至福建、台湾、广东等省，多生于常绿阔叶林，疏林、松杉，毛竹林中，以及林边灌丛中。</p> <p>药用部分：根入药，冬春采收。</p> <p>用途：性味辛、温。有温中顺气之效，治疗胃痛，哮喘，夜尿，中风，中气，霍乱及除孩儿腹虫。用量：1钱5分~3钱。</p>
121	乌蕨	土黄连, 小野鸡尾草, 中华金粉蕨, 日本乌蕨, 冷沟凤尾, 万能解毒药。	中国蕨科，华蕨科。	<p>植物形态：多年生常绿草本，高约达60厘米。根茎长而横走，密被暗褐色鳞片。叶远生，叶柄长15~30厘米，禾秆色或基部褐棕色，无毛，叶片卵圆状披针形或三角状披针形，长10~30厘米，宽6~15厘米，3~4回羽状分裂；羽片6~9对，互生，下部羽片披针状三角形，斜展；小羽片多数，最后裂片3裂，裂片长4~8毫米，宽1~2毫米，先端短尖。叶革质至亚革质，无毛，叶脉分离，但在孢子囊群着生的脉端相连。孢子囊群短线形，沿裂片两侧叶缘着生，子囊群盖为由多少变形的叶缘反卷而成，膜质而宽，可在裂片的中肋相遇，向内开口。孢子四面形，透明，一般有厚而具棱或具疣状突起的雕纹。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部和西南部各省；多生于山坡林下沟边，丛林边，阴湿岩石草丛中。</p> <p>药用部分：根茎和全草入药，全年均可采收。</p> <p>用途：性味苦，寒。解各种毒，称“万能解毒剂”。（常与乌韭混同，但认为乌蕨效果最佳。）用量：全草5钱~1.5两。</p>
122	乌韭	野鸡尾, 鸡尾草, 石发地拘枝。	林蕨科，陵齿蕨科。	<p>植物形态：多年生常绿草本。根茎坚硬而短，匍匐，密被褐色茸毛状裂片。叶柄疏生，相距约2~20毫米，坚硬，光亮，秆黄色，裸净，直立，长10~50厘米。叶根生，两面均无毛，3~4回羽状复叶，披针形或卵形，长10~50厘米，宽4~25厘米；下部羽片卵形至三角状披针形，广展，长3~15厘米，宽1.5~8厘米；小羽片椭圆形或披针形，末回羽片宽1~4毫米，基部楔尖，先端截头状，全缘或有齿缺，叶脉叉状分枝。孢子囊群圆形，生于裂片顶端，每1裂片有1~2枚；子囊群盖圆杯状，宽过于长，向外开裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域及南部各省，多生于林边或灌丛边，梯田边草丛中以及山区村落附近均极常见。</p> <p>药用部分：全草供药用，四季均可采集。</p> <p>用途：性味微苦，寒。滋阴退热，解毒止血。内服治肝炎，痢疾，尿淋，解毒等；外用治刀斧伤，蛇咬伤和疱毒，跌打损伤等。用根泡酒内服，叶捣碎外敷，可治乳疮。用量：1~2两。</p>
123	乌柏	木子树, 木梓树, 棋子树, 白木子树, 乌柏树, 乌树果, 乌油, 蜡子树, 柏子树。	大戟科	<p>植物形态：落叶乔木，高达15米。有乳液，树皮灰色，皮孔细点状，不显著。叶互生，棱形或斜方状卵形，全缘，先端长尖，基部广楔形或截形，长3~9厘米，宽2.5~7.5厘米，表面淡绿色，无毛。花单性同株，黄绿色，顶生穗状花序；雄花小，每7~8朵集生于小苞之腋部，苞片三角形；雌花较大，单生于花序之基部，无花瓣及花盘；雄花被杯状，上部3裂，雄蕊2~3枚；雌花苞片与雄花苞片相似，花萼3裂或较多，子房上位，3室。蒴果球形或椭圆形，熟时黑褐色，室背开裂为3瓣，每瓣内含1种子。种子着生于中轴，黑色，外被白色腊层。</p> <p>生态分布：产我国黄河流域下游、长江流域至海南岛，多生于山坡疏林中，村落保育林中有生长，此外田头、公路边广栽植。</p> <p>药用部分：根皮、叶、种子腊均入药，夏秋采用。</p> <p>用途：性味苦、微温，有毒。根皮通大小便，解蛇毒；种子腊能下泻；炒子作汤亦可涂一切肿毒疥疮。现用根皮及叶治疗血吸虫水肿。用量：根皮3~4钱。</p>
124	乌梅	白梅, 春梅, 梅花, 梅。	蔷薇科	<p>植物形态：落叶乔木，高可达10米。树皮灰色或棕灰色，多分枝，小枝细长，绿色，枝端刺状。叶互生，阔卵形或卵形，长10~4厘米，宽3~3.5厘米，边缘具细锐锯齿，基部阔楔形至圆形，先端狭，长尖，表面绿色，</p>

			<p>背面淡绿色，嫩时上下2面均有毛，老时仅叶背脉上有毛。花白色、红色、淡紫色，1~3朵，丛生叶腋，具短梗，先叶开放，有香味，萼与花瓣各5枚，单瓣或重瓣，雄蕊多树，子房上位，1室。核果球形，直径2~3厘米，绿色，熟时黄色，核有凹点。</p> <p>生态分布：原产我国西南部，现全国各省均栽培。</p> <p>药用部分：梅花及未熟果实，经熏制干燥后（乌梅）入药，4~5月采收。</p> <p>用途：性味微酸、涩。乌梅有敛肺涩肠，除烦解热，生津止渴，镇咳镇呕，驱虫止血等功用。主治久咳，泻痢，下血，蛔虫痛，反胃，噎膈，呕吐，烦渴等症。又可以为提取枸橼酸的原料。用量：8分~1.5钱。</p>
125	乌药梅	五爪龙、大叶五爪龙，猪血藤，五将草、四季草，过江龙，地老鼠，猪婆藤，铁散仙，见肿消。	<p>葡萄科</p> <p>植物形态：多年生蔓生草本。茎常绿色，有纵棱，具卷须，被微柔毛。叶互生，膜质，叉状5小叶，小叶倒卵形，至长椭圆形，长2~7厘米，先端尖或钝，基部钝，边缘粗锯齿，总叶柄长3~8厘米，中间小叶柄最长，两侧较短。花淡绿色，腋生聚伞花序，萼杯状、膜质，花冠4枚，雄蕊4枚，花盘与子房合生，子房上位，2室。浆果卵形，熟时紫黑色。</p> <p>生态分布：产我国山东、长江流域至广东、福建等省，多生于山坡疏林边，灌丛中，荒地及村落庭院中均常见有生长。</p> <p>药用部分：根及鲜叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味酸、苦，寒。能凉血，解毒，利小便，消疔肿。治痈肿疮疖，虫咬，风毒热，肿游丹，小便尿血、喉痹肿痛，项下热肿，跌打损伤，偏头风，痔疮。用量：叶2~3钱，根3钱~1两。孕妇忌用。</p>
126	乌饭树	沙沙面，零丁子，杨冻子树。	<p>乌饭树科，杜鹃科。</p> <p>植物形态：常绿灌木，高达3米，小枝有短柔毛。叶互生，卵形或卵状长椭圆形，长4~9厘米，革质而有光泽，叶脉在背面显著。花白色，腋生总状花序，花悬垂状，花梗有腺状小苞片2枚，萼钟状，5裂，花冠筒状，表面有毛，先端5浅裂，雄蕊10枚，药囊椭圆形，顶端有2个圆筒状管，孔裂，子房下位，多室。浆果球形，熟时紫黑色，有宿存花萼。</p> <p>生态分布：产我国长江流域中下游至南部各省，多生于山坡阔叶林边、松杉林、竹林中、荒山草地灌丛中常有生长。</p> <p>药用部分：根入药，全年均可采收。</p> <p>用途：能散瘀、消肿、止痛。治牙痛。</p>
127	化香树	杯树	<p>胡桃科</p> <p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达7米。树皮暗黑色，深裂，幼枝褐色，初时密生褐色细毛、后脱落。叶互生、奇数羽状复叶，长15~30厘米；小叶7~9枚，无柄，对生或近于对生、小叶卵状披针形至长椭圆状披针形，长4~15厘米，宽2~4厘米，基部偏斜，先端渐尖，边缘为重锯齿，背面脉腋有绒毛。花单性同株，黄绿色，直立、顶生柔荑花序；雄花序长3~10厘米，苞鳞披针形，长尖，反曲雄蕊通常8枚；雌花序球果状，多生于雄花序的上部，长约2厘米，直径1厘米，苞鳞广卵形，雌蕊扁，与2苞片合生，成2翅，子房下位，1室。果为扁平具2狭翅的小坚果，聚生成为椭圆形的球果状；暗褐色，长3~4厘米。</p> <p>生态分布：产我国河南至长江流域以南各省，多生于向阳山坡的阔叶林边、松杉林中，而以砍伐迹地为最多。药用部分：根皮、果穗及叶供药用。夏、秋季采收。</p> <p>用途：性味辛，温。顺气祛风，化痰消肿，燥湿杀虫。用量：果3~6钱。</p>
128	风箱树	水杨梅，假杨梅，水团花。	<p>茜草科</p> <p>植物形态：水生落叶灌木，高1~3米。分枝极多，幼枝略为近四方形。叶对生，很少有轮生，长椭圆形或椭圆状披针形，长7~17厘米，宽2.5~8厘米，基部浑圆或近心脏形，先端短尖，长尖或钝尖，全缘，表面无毛，背面被柔毛或茸毛，侧脉在背面凸起，叶柄长5~10毫米；托叶三角形，长约4毫米，先端尖，常排成总状花序，萼管4裂，花冠漏斗形，裂片4，雄蕊4枚，着生于冠喉部，子房下位，2室。小核果多数，聚生呈球形复果。雄蕊4枚，着生于冠喉部，子房下位，2室。小核果多数，聚生呈球形复果。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省，多生于溪边，沟边、田边、水塘边及荒坡潮湿处。</p> <p>药用部分：根、茎、叶入药，夏秋采收。</p>

			用途：性味苦、涩，平。能止泻，祛痰止咳，止血生肌。清热解毒，散瘀止痛，消肿拔毒。用量：根5钱~1.5两。
129	风船葛	天灯笼，包袱草，三角泡，倒地铃。	无患子科 植物形态：多年生、柔弱草质藤本，长达3米，茎有明显槽纹，稍被柔毛，卷须纤细。叶互生，无托叶，2回3小叶，长5~9厘米，小叶卵形至披针形，膜质，长1~5厘米，长尖，边缘有粗齿或分裂。花小，白色，单性，腋生聚伞花序，最下一对花梗发育成卷须，萼片4枚，花瓣4枚，其中2枚大的花瓣与萼片粘合，花盘偏于一侧，波状，雄蕊8枚，偏生，子房上位，3室。蒴果囊状，膨大如灯笼；种子球形，基部有假种皮。 生态分布：归化植物，我国南部至海南岛均有野生。 药用部分：全草入药，夏秋采用。 用途：性味苦、微辛，凉。能消肿止痛，凉血解毒。主治跌打损伤，疮疖痈肿，湿疹等症。用量：全草3~5钱，水煎服。外用鲜草捣烂敷患处。
130	凤尾草	鸡脚草，鸡爪莲，五指草，小凤尾，龙须草，巴墙草，井口边草。	凤尾蕨科 植物形态：多年生常绿草本，高30~70厘米。根状茎短，密被线状披针形黑褐色的鳞片。叶丛生，长15~25厘米，灰棕色或禾秆色，有毛，羽状复叶，叶卵圆形，稍呈革质，长20~45厘米，宽15~25厘米，两面均无毛，中轴具宽翅，羽片4对或更多，对生，长线形，上部的不分裂，长10~17厘米，宽3~7毫米，不生孢子部分的叶边缘为锯齿状，下部的羽片常再分裂，具长线形小羽片数片，叶脉明显，单1或分叉。孢子囊群线形，连续沿叶缘下面着生，子囊群盖狭，膜质。 生态分布：产我国北部、中部及南部。多生于丘陵山地普通有分布，多生于较阴湿地方的石隙，墙缝或水井边。 药用部分：全草入药，四季均可采收。 用途：性味淡、凉，无毒。治五淋，止小便痛、泻、痢疾，与甘草浸酒服，治肠痔泻。用量：3钱~2两。
131	凤丫蕨	大叶凤凰尾巴草，散血莲，蛇眼草，凤丫草。	裸子蕨科 植物形态：多年生常绿草本，高达1.2米。根茎长而横走，被有淡褐色鳞片。叶疏生。叶柄长50~60厘米，禾秆色，有时带赤褐色，除基部外无毛，腹面有沟，叶为一回羽状复叶，长50厘米，宽25~30厘米，羽片互生，2~5对，下部的羽片常再裂为2小叶至数小叶，小叶线装长椭圆形，长达20厘米，宽约2厘米，基部楔形，多少下延，具短柄，先端长渐尖。边缘有细锯齿，顶端羽片较大，与侧面羽片稍同形，叶薄革质，无毛，叶脉由中肋斜上，羽状分出，二叉分枝，在中肋两侧形成网眼，每条细脉到叶缘形成棒状增粗的水孔。苞子囊群长线形，沿侧脉着生，由中肋达边缘附近，无子囊群盖。 生态分布：产我国中部和南部，多生于沟谷丛林边或岩石边阴湿的草丛中。 药用部分：根茎及全草入药，全年可采收。 用途：性味苦，凉。去风湿，凉血散瘀。用量：根及全草5~7钱。孕妇忌用。
132	凤仙花	手指甲花，指甲花，急性子，金凤花，透骨草，小桃红。	凤仙花科 植物形态：一年生草本，高30~100厘米，茎圆形，直立，有分枝，肉质，多水分，茎节通常膨大。叶互生，披针形，长4~10厘米，宽1.5~3厘米，基部楔形，边缘有锯齿，叶柄上有腺体着生。花红色，淡红色或白色，单花顶生或腋生，花柄甚短，花萼3片，后面1片较大，呈花瓣状且伸延成一弯距，花瓣5片，单瓣或重瓣，雄蕊5枚；子房上位，5室。硕果，扁圆形，被柔毛，熟后弹裂而成5枚旋转的果瓣，种子多数。 生态分布：产我国南部。 药用部分：根、叶、花、种子（凤仙子，急性子）入药，夏秋季采用。 用途：子及全草性味微苦、温，有小毒。根能散血通经，软坚透骨。治鸡鱼骨哽，跌扑肿痛。花能活血消积，利小便，通经活血，解毒，生肌，下死胎积块、止泻、消痰、化食，治蛇伤，腰肋风湿。种子能下骨硬、取牙齿，治难产。用量：花1~2钱，种子1~1.5钱。孕妇忌用。
133	丹参	关公须，赤参，山参，红根，奔马草。	唇形科 植物形态：多年生草本。根细长，圆柱形，茎直立，呈四方形，每侧具浅沟一条，高40~60厘米，全株密被柔毛，近根处茎常呈浅紫红色。叶对

			<p>生，奇数羽状复叶、小叶3~7枚、卵圆形至椭圆状卵形，顶生小叶较侧生小叶为大，基部圆形，先端钝尖、表面深绿色，两面均有柔毛，花紫蓝色，顶生和腋生轮状总状花序，萼唇形，5裂，花冠筒状，唇形，上唇呈弓状，下唇短圆形，凹凸不平，花冠喉部着生杠杆状雄蕊2枚、子房上位，4室。小坚果椭圆形，黑色。</p> <p>生态分布：产我国北部至长江流域各省，多生于山坡林边或疏林下。</p> <p>药用部分：根入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、微寒。去瘀生血，消肿止痛，排脓生肌。治月经不调，心腹疼痛，关节疼，疮痍疥癣等症。用量：1钱5分~3钱。</p>
134	月季花	月月红，月月花。	<p>蔷薇科</p> <p>植物形态：常绿或半常绿有刺灌木，枝圆柱形，具疏生钩状的皮刺，有时近于无刺。叶互生，羽状复叶，小叶3~5片，很少有7片，广卵形，椭圆形以至卵状椭圆形，先端锐或渐尖，基部圆钝或阔楔，长2~6厘米，宽1~3.5厘米，表面深绿色，有光泽，背面淡绿色，两面无毛，叶缘具锐锯齿；叶柄基部有耳状托叶；叶轴及托叶边缘具有腺毛，无绒毛。花红色或玫瑰色，茎约5~6厘米，单生或常数朵丛生于枝顶，萼筒椭圆形，表面光滑，淡绿色，内面密布白绒毛；萼片5枚，向下反卷，全缘，有锯齿或羽裂，花瓣5枚，倒卵形，雄蕊多数，着生于萼筒花托边缘的花盘上；雌蕊多数分离，包藏于壶状萼筒的内部，花托外面光滑，成熟后长1.2~2厘米，内有多数具有白色长毛的瘦果。</p> <p>生态分布：产我国中南部，全国均有栽植。</p> <p>药用部分：花蕾、花朵或根供药用、夏秋季采收。</p> <p>用途：花性味甘、温，无毒。能活血，消肿。治月经不调及血瘀肿痛。</p> <p>用量：花1~2钱。</p>
135	木莲	木莲果	<p>木兰科</p> <p>植物形态：常绿乔木，高6~13米，树皮灰白色，平滑，小枝灰褐色无毛，具有显著的环状托叶痕以及圆形小皮孔。叶互生，革质。在枝上部排列较密；叶片长椭圆形或长椭圆状披针形，长10~24厘米，宽2.5~5厘米，顶端渐尖，基部楔形，全缘，表面深绿色，有光泽，背面淡黄绿色，有时被有白粉，两面均光滑无毛，主脉在背面显著隆起；叶柄圆柱形，长1.5~2.5厘米，基部稍膨大。花白色稍带紫红色，有芳香，单生于枝顶，大形；花被6~9片，呈阔卵形，肉质，较叶而多汁，外面包有绿色的苞片；雄蕊多数，密叠于花托的下部；雌蕊心皮多数，聚生于花托顶部。果为木质骨突果，近球形，长约4厘米，熟时带木质，呈紫红色。种子椭圆形，呈红色，有白色的丝状柄。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省。</p> <p>药用部分：果、树皮、根皮入药，树皮、根皮全年可采，果实8月（处暑前后）成熟未裂前摘取。</p> <p>用途：治便秘及老人干咳。用量：树皮、根皮及果实5钱2两。</p>
136	木通	羊开口，野木瓜，五叶木通，牛卵子。	<p>木通科</p> <p>植物形态：落叶或半常绿缠绕性木质藤本，长3~15米。光滑无毛，幼枝有条纹。叶互生，掌状复叶；小叶5枚，革质，倒卵形或椭圆形。长3~6厘米，基部椭圆或阔楔形，先端钝圆而微凹，有短细尖。花暗紫色，单性，同株，腋生总状花序，花被3片，雄蕊6枚，心皮3枚，分离，子房上位，1室。浆果椭圆形，成熟时沿腹部裂开，缝线内有白瓢，种子多数、黑色。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部，多生于林边，灌丛中或村落附近灌丛中。</p> <p>药用部分：根、茎、果入药，秋冬采收</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。能解热利尿，镇痛排脓，通经除湿。治水肿，脚气，金疮，痈肿，小便不通，月经不调。用量：茎、果3~5钱。</p>
137	木瓜	铁脚犁，木桃，木李，海棠。	<p>蔷薇科</p> <p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高达10米左右。小枝无刺，幼嫩时被毛。叶互生、椭圆状卵形或长椭圆形，或倒卵形，长6~8厘米，宽3~5厘米，先端尖锐，边缘细锐锯齿，齿端有腺体，表面光滑无毛，幼时密被淡棕色绒毛，背面被毛或后变秃净，老叶带革质，叶柄两侧和托叶的边缘均</p>

				<p>有腺体，托叶披针形，膜质，早落。花淡红色，单生于枝端，与新叶同发或先叶开放，萼5裂，向外反卷，花瓣5片，雄蕊多数，子房下位，5室，梨果长椭圆形或卵圆形，木质，有芳香。</p> <p>生态分布：产我国长江流域及山东。</p> <p>药用部分：果实供药用，秋季采收。</p> <p>用途：性味酸、涩、温，无毒。能和脾燥湿，舒肝止痛，消暑消毒，浸酒可治风湿关节痛，又治肺炎，支气管炎，瘰癧、肺病及咳嗽等，长期服用对肺结核有良效。用量：1钱5分~3钱。</p>
138	贴梗海棠	木瓜	蔷薇科	<p>植物形态：落叶灌木，高2~3米或更高。树皮青灰色，平滑；枝向外开展，棕褐色，无毛，具显明皮孔，枝上具棘刺，刺长5~15毫米。叶互生，卵状长椭圆形至倒卵状卵圆形，长2.5~8厘米，宽1.2~3厘米，基部楔形，宽楔形至近圆形，顶端短尖或圆钝形，表面绿色，背面淡绿色，两面均无毛。花绯红色，2~5朵，丛生叶腋，与叶同时开放或略先于叶开放，萼片，花瓣均5枚，雄蕊多数，子房下位，5室。浆果卵形或球形。</p> <p>生态分布：原产我国西南部，各地均栽培。</p> <p>药用部分：干燥成熟果实入药，立秋后摘取。</p> <p>用途：同木瓜。</p>
139	木蓝	蓝靛，大青叶，马蓝，野槐树，槐蓝。	豆科	<p>植物形态：直立灌木，高可达2.5米，小枝着生银白色薄毛。叶互生、奇数羽状复叶，长2.5~5厘米，小叶7~15片，对生，倒卵状椭圆形，先端尖，基部楔形，全缘，长约15毫米，背面有毛，叶柄长1.2~2.4厘米。花蝶形，红黄色，腋生总状花序，较叶为短，近于无梗，萼筒银白色，上部5裂，期瓣倒卵形，雄蕊10枚，两体，子房1室，无柄。荚果直而细，长约2~2.5厘米，内含种子至12颗。</p> <p>生态分布：我国南部各省多栽培。</p> <p>药用部分：8月采叶制成青黛（蓝靛）供药用。</p> <p>用途：性味咸，寒。有泻肝散郁火，凉血解毒等功能。</p>
140	假木蓝(马棘)	一味药，野篮子，山绿豆，山皂角，狼牙草。	豆科	<p>植物形态：落叶小灌木。全株被有丁字着生的白色柔毛，高60~90厘米，深紫色；新枝绿色带紫色，多分枝。叶互生，奇数羽状复叶，长约50厘米，基部关节膨大，具小叶9~11片，小叶具短柄，顶端小叶柄较长；小叶片倒卵形或长椭圆形，长1~1.5厘米，基部阔楔形，先端有微凹，全缘，表面暗绿色，背面淡绿色，两面被平贴的丁字软毛，花红紫色或白色，蝶形，腋生总状花序，长4~5厘米，苞片脱落；萼管钟状，具5齿裂；旗瓣倒卵圆形，雄蕊10枚，两体，子房上位，1室，扁长形，无毛。荚果圆柱形，黄褐色。</p> <p>生态分布：产我国山西至中部、南部及西南各省，多生于山坡灌丛、竹林及疏林中。</p> <p>药用部分：全株入药，9~10月采收。</p> <p>用途：性味苦、涩、温，无毒。治痒子，小儿食积饱胀，凉寒咳嗽，食停及痔疮。用量：5钱~1两，水煎或炖肉服。</p>
141	和琼木兰	无	豆科	<p>植物形态：落叶小灌木，高约30~50厘米，茎直立无毛或幼时有短毛。叶互生，奇数羽状复叶，小叶7~15枚，长6~10厘米；小叶通常对生，有时为互生，小叶片卵状披针形至卵状椭圆形，两侧不对称，长15~20毫米，宽9~16毫米，有短柔毛或无毛。花紫色，蝶形，腋生总状花序，花序长达13厘米，萼5裂，旗瓣阔椭圆形，雄蕊10枚，两体，子房无柄。荚果线状圆筒形。种子5~8个。</p> <p>生态分布：产我国长江中下游各省；多生于沟谷灌丛边，山坡丛林边及路边。</p> <p>药用部分：根、茎入药，夏秋采收。</p> <p>用途：能解毒、消炎，消肿。治咽喉肿痛、发热、咳嗽、下痢等症，用途同马棘。</p>
142	木槿	木槿花，篱沿树，藩篱树，清明篱	锦葵科	<p>植物形态：落叶灌木，茎高3~6米。树皮灰褐色，富纤维，无毛，嫩枝上有绒毛。叶互生，棱状卵形或卵形，长4~7厘米，宽2.5~5厘米，具有深</p>

			<p>浅不同的3裂或不裂，基部楔形，边缘具圆钝或尖钝的钝齿，有明显的主脉三条，两面均有星状毛疏生，后变光滑，叶柄长1~2厘米，光滑被有毛或星状毛。花淡红色、白色或淡紫色，单生于茎端或叶腋，下有短花梗，萼5裂，有星状毛或细短软毛，外有线形小苞6~7个，长约为花萼之半；花冠5片；雄蕊多数，花丝连合成筒状，子房上位，5室。蒴果长椭圆形，全体被有绒毛。</p> <p>生态分布：产我国云南、广东，现国内广栽植。</p> <p>药用部分：花及根皮入药，6~7月可采收。</p> <p>用途：花性味甘、平，除湿热，利肠胃。治湿热带下，肠风下血，痢疾，用量：7钱~1两。</p>
143	木鳖	土木鳖，木别子。	<p>葫芦科</p> <p>植物形态：多年生蔓性草本。卷须不分枝，茎、叶具有毛茸。叶互生，心脏形，长与宽几相等，约8~9厘米，边缘波形，3~5浅裂或深裂，各裂片呈卵形，基部两则各有突起蜜腺一个，先端尖，全缘，少数有波状齿牙缘。花淡黄白色，单性，腋生，径约9厘米，雄花有长梗，长9~10厘米，基部弯，梗上巨大苞1枚，抱拥花部，萼5裂，花瓣5片，雄蕊5枚，两对合生，1枚单生；雌花花梗较短，子房下位，1室。瓜果长椭圆形，红色，长约9~15厘米，表面有二疣状突起，成熟时裂开，种子扁平，表面粗糙，呈灰白色。</p> <p>生态分布：产我国南部；</p> <p>药用部分：种子药用，秋季采收。</p> <p>用途：性味甘、温，有毒。种子治恶疮，有止痛，消肿解毒生肌作用，治小儿疳积，肠炎，化脓性炎症，乳腺炎，痔疮，淋巴结核，黧痣。用量：1~3分。外敷酌量。</p>
144	木防己	防己，钻骨龙，土木香，青藤，巡骨风，青藤根，青藤。	<p>防己科</p> <p>植物形态：缠绕性落叶木质藤本，长可达3米，小枝有细毛与柔毛。叶互生，通常卵形或卵状长圆形，长5至9厘米。基部圆形，楔形或心脏形，先端尖，全缘或有3裂，中裂片较长，两面都有柔毛。花单性异株，淡黄色，腋生聚散伞花序，有时伸长为顶生穗状花序，萼片、花瓣均6片，雄蕊6枚，心皮6枚，分离，子房上位，1室。核果近球形，有白粉。</p> <p>生态分布：产我国东北，北部，中部及南部，多生于丘陵、平地疏林边，灌丛中以及村落附近。</p> <p>药用部分：根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦，寒。能祛风，除湿热，通络舒筋，解毒止痛。用量：3~7钱。</p>
145	木芙蓉	芙蓉，胡索花，芙蓉树，转观音，地芙蓉。	<p>锦葵科</p> <p>植物形态：落叶大灌木，高达3.5米。生长在寒地者逐年枯萎，由宿根发芽、高1.5米。叶互生，阔卵形或近圆状卵形，长12~24厘米，3~5裂片，裂片三角形，先端尖或渐尖、边缘有钝锯齿，表面稍有毛，背面有短柔毛，或为黄褐色绒毛，叶柄为长圆筒状，长10~13.2厘米，有短柔毛。花初开时白色，后变为深红色，花径10厘米，小苞十枚；萼短，5裂；花瓣5片，或为重瓣；雄蕊多数，连合；雌蕊一枚；柱头五裂，子房上位，5室。蒴果球形，5瓣裂。</p> <p>生态分布：叶、花入药，叶夏秋采，花秋季采。</p> <p>用途：性味微辛，平。有清肺，凉血，散热，解毒，消肿，排脓之效。治一切大小痈疽，肿毒，用量：叶5钱~1两，花2~4钱，根1~2两。</p>
146	木蜡树	野漆，臭毛漆树。	<p>漆树科</p> <p>植物形态：落叶小乔木，高达9米。树皮初呈暗赤色，平滑有光泽，后呈纵裂，新枝粗大，具椭圆形叶痕。叶互生，奇数羽状复叶，总叶柄圆筒形，基部稍膨大，平滑，长5~10厘米；叶轴长6.5~20厘米，平滑无毛或软毛；小叶柄3.3~5.5厘米，疏生软毛或平滑，小叶9~15枚，对生，小叶片披针形长椭圆形或广披针形，长6~12厘米，宽约3.3厘米，左右不对称，上部长而锐利，顶端与基部钝形或锐形，表面绿色有光泽，背面灰绿或灰白，无毛，全缘，质较厚，有16~24侧脉及数条中间脉，脉纹在叶背面显明。花黄色，叶生圆锥花丛，雄花萼片5裂，花瓣5片，雄蕊5枚，中央有退化子房；两性花的花瓣与雄花相同，子房上位，1室。核果为扁平肾脏形，中果皮有蜡质，内果皮坚硬，成熟时淡黄色。</p>

				<p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于向阳山坡阔叶林中或松杉林中。</p> <p>药用部分：树皮、根皮入药，秋季采。</p> <p>用途：治刀伤，头部痈毒溃烂。</p>
147	水芹	野芹菜，芹菜。	伞形科	<p>植物形态：浅水生，多年生草本，高20~80厘米，有成丛的须根，茎直立，基部匍匐，圆柱形，中空，具纵向纹，光滑无毛，节上常生根。根生叶丛生，1~2回羽状分裂，最后裂片卵形至菱状披针形，长约2~5厘米，宽1~2厘米，边缘有锯齿或圆齿，叶柄长10厘米，有叶鞘；茎上叶互生，裂片与根生叶的裂片相似但较小，上部叶无柄。花白色，为顶生伞形花序，花柄长0.2~0.4厘米，萼片、花瓣均5枚，雄蕊5枚，子房下位，2室。双悬果近于四角状椭圆形或筒状长圆形。</p> <p>生态分布：产我国南部。</p> <p>药用部分：根及全草，秋冬采收。</p> <p>用途：性味苦，凉。能止痒养阴，保血肺，益气，令人肥健嗜食，去伏热，和齿，利大小肠，解毒，退热，利小便。治女子赤沃，崩中带下，黄病，小儿吐泻，小便出血。用量：全草5钱~1两。</p>
148	水苏	野紫苏，山升麻， 乌雷公，水鸡苏， 朋头草。	唇形科	<p>植物形态：多年生草本，高30~80厘米。根淡黄色，茎直立，通常不分枝，方形，被有白色刺毛，粗糙。叶对生，长椭圆状披针形至披针形，长3~5厘米，宽1~1.6厘米，基部心脏形，先端钝尖，边缘有圆锯齿，表面绿色，背面密被灰白色茸毛，叶脉在背面突起，纲状，近无柄或有短柄。花淡红色，唇形，轮生，排列成顶生的穗状花序，花萼5裂，花冠下唇向下，雄蕊4枚，2裂，子房上位，2裂，4室。果为4枚小坚果。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于丘陵、平地田边湿地和水沟边。</p> <p>药用部分：全草入药，夏季采收。</p> <p>用途：性味酸、涩、微温，有小毒。能下气，解热，止血，辟口臭，辟恶气，降胃间酸水，祛风散寒。治吐血衄血，肺痿，血痢，崩中带下，脚肿，头风目眩，产后中风，恶血不止，暑月目昏，蛇蛰伤。用量：全草3~5钱。</p>
149	水蓼	辣蓼，班蕉草，辣 尿草。	蓼科	<p>植物形态：一年生草本。茎直立或下部伏地，高约60~90厘米左右，稍粗壮，分枝稀疏，茎节膨大，茎呈淡红色，全株散布腺点及毛茸。叶互生，有短柄，叶身广披针形，基部楔形，先端渐尖，外面被粗毛，表面深绿色，有八字状的黑斑，托叶稍薄膜质，口缘生长刺毛。花淡红色，顶生穗状花序，花梗细长，作下垂状，萼5深裂，散布绿色的腺点，上部呈红色，花被5片，雄蕊7~8枚，子房上位，1室，花柱3个。瘦果有三棱，外包宿存萼。</p> <p>生态分布：产我国南北各地，多生于湿地，浅水沟，田边及路边。</p> <p>药用部分：全草入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能温中，明目，解毒，利尿，治头面浮肿、肠痈、霍乱、小儿头疮。用量：3钱~5钱。</p>
150	水龙	过塘蛇	柳叶菜科	<p>植物形态：浮水或匍匐状草本，其浮水茎每节上常有圆柱状，白色的囊状浮器，全体无毛。叶倒卵形至长椭圆状倒卵形，长1.5~5厘米，先端浑圆或钝。花白色，腋生，单花，萼片、花瓣均5枚，雄蕊10枚，子房下位，5室。蒴果线状圆柱形，长2~3厘米。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部各省，常生于水田，浅水池或水沟中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、淡、平，无毒。能清热利尿，解毒。治蛇伤，疮毒，癫狗咬伤，利小便。倒汁饮。</p>
151	水龙骨	青石莲，青龙骨， 绿脚代骨丹，铜 兰，石蚕，光石蚕。	水龙骨科	<p>植物形态：岩石上或树皮上附生常绿草本，高达40厘米。根茎裸露，粗长横走，肉质，碧绿色并被有灰白粉，除先端幼嫩部分外，很少鳞片。叶远生、直立，叶柄长5~15厘米，叶片长椭圆形，长10~25厘米，宽4~8</p>

				<p>厘米，1回羽状深裂，羽片20对以上，平展，线状长椭圆形，至线状披针形，长2~3.5厘米，宽1~1.5厘米，全缘，具细缘毛；下部羽片多少反折，叶纸质，两面密被白色柔毛，细叶脉沿叶轴及羽轴有一行网眼，沿羽轴两侧的网眼有内藏细脉1条。孢子囊群圆形，稍大，着生于叶背面内藏细脉的顶端，无子囊盖；孢子两面形，透明，平滑。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省，多生于沟谷林下岩石上、树皮上；山区瓦屋上也常有成片生长。</p> <p>药用部分：根茎入药，全年可采。</p> <p>用途：性味甘、苦，凉。民间治五淋白浊，小儿急惊风，风眼红肿疼痛和手指疮毒等症。用量：5钱~1两。</p>
152	水苦蔓	水仙桃草，鸭儿草，水葛苣，虫虫草，仙桃草。	玄参科	<p>植物形态：二年生草本；全体无毛，高约25至50厘米，具须根，茎直立，淡绿色，多汁，中空，有时基部倾斜，叶对生，无柄，长椭圆状披针形至长椭圆形，长4~7厘米，宽7~15毫米，基部耳状微抱茎，先端钝或锐尖，全缘或略具波状齿，表面绿色，背面较淡。花白色，腋生总状花序，长5~15厘米；花萼4裂，花冠白色或具淡紫条纹，4裂片，雄蕊2枚，着生于冠管上，开花后伸出花冠之外；雌蕊单1，子房上位，2室。蒴果近圆形，先端微凹，果常因害虫寄生使之膨大成较大的肉质桃形果，内含多数细小种子，长圆形，扁平。</p> <p>生态分布：产我国南北各地，多生于沟边、田边或山坡湿地。</p> <p>药用部分：全草及果实有虫者入药，立夏前后数天内采收。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。治跌打损伤，瘀伤咳血，咳嗽虚弱及疝气。</p> <p>用量：3~5钱。</p>
153	水牛膝	莲子草，水金铃，满天星，节节花，耐惊花，白花仔，蜚蜞菊。	苋科	<p>植物形态：一年生草本，高约40厘米。多分枝，全体有茸毛，茎上部直立，下部呈蔓生状，常匍匐地面，绿色带红紫色，被细毛，在茎或枝的最上1、2节间的两侧密生2列长茸毛，甚明显，节与叶腋间亦生长茸毛，节间的基部略膨大，如牛膝状。叶对生，无柄，叶片披针形或线状披针形，长4~5厘米，基部渐狭，基端扩展与相对之叶相连接，抱生节上，先端短尖，全缘，中部呈皱波状，表面绿色，背面淡绿色，基部带紫色，两面都有细毛疏生。花白色，腋生头状花序，每朵花有苞片5枚，干膜质，有光亮，花被5片，干膜质，雄蕊6枚，花丝基部合生成杯状，其中3枚有花药，三枚无花药，二者相间排列，雌蕊1枚，子房上位，1室。胞果倒卵形，稍扁平。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省，多生于水塘，水田，湿地。</p> <p>药用部分：全草入药，一般在夏秋采全草。鲜或晒干入药。</p> <p>用途：性味微苦、寒，无毒。清火退热，治牙痛，利水，疗肠风下血，</p> <p>用量：5~8钱。</p>
154	水亚木	白花莲，土常山，绿竹杆，圆锥绣球。	八仙花科、虎耳草科。	<p>植物形态：落叶灌木，高达4米。树皮灰褐色，小枝赤褐色，皮孔明显，疏生白色短柔毛。叶对生，偶有3片轮生，在营养枝上则叶大而厚，多为3片轮生，椭圆形或卵形，长5~12厘米，宽2~4.5厘米，基部圆或楔形，顶端渐尖或聚尖，表面深绿色，疏生短柔毛或近无毛，背面淡绿色，散生短硬毛，尤以脉上为多，边缘具锯齿，侧脉6~8对，呈弧形而斜上，厚纸质；叶柄长1~1.5厘米，花白色后变紫色，顶生圆锥花序，长15~25厘米，不孕花茎1~5厘米，萼片3~5片，全缘，白色，后变紫色。孕性花萼筒杯状，顶端5齿裂，花瓣5片，长椭圆形，雄蕊通常10枚；雌蕊花柱2，子房半下位，2室。蒴果卵圆形，顶端2歧。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省，多生于沟谷阔叶树林边，山沟丛林中或灌丛中。</p> <p>药用分布：根或叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：民间应用同散花八仙。根又作接骨药。</p>
155	水金凤	大风仙，野凤仙。	凤仙花科	<p>植物形态：一年生草本。柔弱多汁，高约50厘米，全体无毛；茎直立，有分枝。叶互生，有柄，叶片长椭圆形，基部楔形，顶端短尖或锐尖，边缘具粗锯齿，质薄而软。花黄色，生于枝梢叶腋，聚伞花序状，花梗瘦细下垂，萼片，花瓣均5片，萼具膨大向后突出，先端弯向下方，左右</p>

				<p>各有1大型花瓣，雄蕊5枚，子房上位，5室。蒴果狭长，两端尖，光滑无毛。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部，多生于丘陵地区的沟谷，湿地或溪流岩石边。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘，温。能理气和血，舒筋活络。治妇女气血不和，经行腹痛。</p>
156	水团花	满山香，水杨梅，球花水杨梅，假杨梅，穿鱼柳。	茜草科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达5米，枝柔弱，有皮孔。叶对生，纸质，倒披针形或长椭圆形，长4~12厘米，宽1.5~3厘米，基部楔形或钝，先端长尖而钝；托叶2裂，早落。花白色，头状花序单生叶腋，萼、花冠均5裂，花冠漏斗状，雄蕊5枚，子房下位，2室。蒴果楔形，2瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国东南部，多生于山谷丛林中，或溪边灌林中。</p> <p>药用部分：根、叶、花、果入药。根全年可采，花、果于夏秋将开放时采集，叶可于夏、秋季鲜用。</p> <p>用途：性味苦、涩，凉。能清热解毒，散瘀止痛。治感冒发热，上呼吸道感染，腮腺炎，痢疾，急性胃肠炎，跌打损伤，骨折。用量：根5钱~1两，花、果3~5钱。</p>
157	水蜈蚣	金扭子草，十字草，雷公草，钢拳头，土柴胡，水牛草，三人扛株	莎草科	<p>植物形态：多年生草本，地下茎横走，蔓延繁殖，须根多，根茎紫褐色；地上茎三棱形，直立，丛生，高达10~25厘米。叶互生，线形，长3~13厘米，基部叶鞘呈淡黄色，先端渐尖。花绿色，头状花序球形，单生，长4~8毫米，稠密，苞片叶状，常为3枚总苞。坚果褐色，扁平，稍倒卵形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地，多生于溪边、水沟边，田园边以及山坡阴湿处。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采用。</p> <p>用途：性味辛，温。去风湿，解热，利尿，活血通经，截疟，杀虫，败毒。孕妇忌服。用量：5钱~1两。</p>
158	水杨梅	小益母，草水杨梅。	蔷薇科	<p>植物形态：多年生草本。全株被散生短粗毛；茎直立，高可达1米。根生叶丛生羽状分裂，两侧裂片细小，1~2对，卵形或菱状，有锐锯齿，顶端裂片，广卵圆形，常又3裂，长7.5~9.5厘米，宽7~9.5厘米，先端钝或圆，基部心形或广楔形，边缘具钝状齿牙；茎叶广卵形或卵形，有时3裂，基部楔形，先端渐尖或钝，边缘有浅缺刻；托叶边缘有粗锯齿，花黄色，顶生或腋生伞房花序，萼5裂，花瓣5枚，广椭圆形或近圆形，雄蕊多数，雌蕊心皮多数，分离。瘦果密被刚毛及钩刺状花柱。</p> <p>生态分布：产我国中部，多生于阴凉湿润的山坡林下、溪边、路边或河边草丛中。</p> <p>药用部分：全草或根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛，温，无毒。能温中行气，止痛。治虚癆咳嗽，肺痿声嘶，疔疮肿毒。用量：5钱~1两。</p>
159	水车前	龙舌草，水白菜。	水鳖科	<p>植物形态：沉水一年生草本，茎极短，根丛生，纤维状。叶丛生，具长柄，带紫褐绿色，卵状椭圆形或广披针形，大小变化甚大，沉水的叶常狭，浮水的叶呈卵形至椭圆形，长约5~18厘米，宽3~12厘米，基部圆形，心形，钝形至锐形，与叶柄相连，先端圆，钝或尖；丛脉7~9条，全缘而微波曲。花白色、淡紫色或蓝白色，单生于由叶脉抽出的花茎顶端，佛焰苞管状，2裂，有波状翅5~6条；萼3片，花瓣3片，雄蕊6枚，雌蕊3枚，子房下位，1室。蒴果6裂，包于佛焰苞内。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于水田，水沟及浅水泽中。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏采收。</p> <p>用途：能消炎，除湿，化痰解热，利尿。治痈疽，烫伤，灼伤，水肿，哮喘，，肺结核，热咳等症。</p>

160	车前	蛤蟆衣，车轮草，尿不通，蛤蟆草子，车轮菜子。	车前科 植物形态：多年生草本，茎短，高约18厘米。叶丛生，几乎贴近地表，有长柄，叶椭圆或卵圆形，全缘，有纵脉数条。花淡紫色，顶生穗状花序，花萼4片，花冠高脚碟状，较萼长，先端4裂，雄蕊4枚，子房上位，2室。蒴果卵形或纺锤形，含4~8种子。 生态分布：产我国南北各省，多生于村落附近，田园边、路边均极常见。 药用部分：种子及全草入药，夏秋采收。 用途：性味甘、淡，寒。能清热利湿，止泄通淋。鲜用或晒干备用。用量：全草1~3钱，种子3~4钱。
161	牛蒡	大力子，牛菜，恶实。	菊科 植物形态：二年生大形草本，茎高1~2米。直立，带紫色，有微毛，多分歧。根生叶丛生，阔心脏卵形，长40~50厘米，先端钝，全缘，或具细牙齿，表面有短毛，背面密被灰白色锦毛，叶柄长，具沟；茎生叶互生，有柄，广卵形。花红紫色，顶生头状花序，花序多略呈伞房状，总苞球形，苞片多列，向四方开散，成有刺钩的球形，花全部管状，花冠先端5浅裂，聚药雄蕊5枚，子房下位，1室，上部有刺毛，瘦果长圆形或倒卵形，稍弯曲，略呈三棱形，并有不明显的棱片线，表面灰褐色，上具斑点，冠毛淡黄棕色，多数，短而刚硬，具细齿。 生态分布：产我国东北、北部、中部，至长江流域各省。多生于沟谷林边，或荒山草地中。 药用部分：果实、根供药用，在大暑至处暑时采收。 用途：果性味苦、涩、温，无毒。根性味苦、寒，无毒。果为发散风热药，能疏散风热，宣肺透疹，解毒。治外感表症，麻疹未透，风疹，咽喉肿痛，痈肿等症；亦可作缓下药，用于便秘。根除供食用外，可治脚气、中风疥癣、寒热、面肿等。用量：果1~3钱。
162	牛繁缕	鹅儿肠	石竹科 植物形态：一年生、二年生或多年生草本。茎中空，有节，下部僵伏，上部斜上，长约50厘米，圆柱形，紫色，茎中有维管束1条、梢部有少量腺毛。叶对生，全缘，卵形或广卵形，基部心形，先端尖；下部叶少，有长叶柄，上部叶无柄或抱茎，表面绿色，背面灰白色，无毛，羽状网脉，脉在表面凹陷。花白色，顶生两歧聚伞花序，花萼与花梗有腺毛，萼片，花瓣均5片，花瓣较萼片长或短，每瓣深2裂、雄蕊10枚，雌蕊心皮5枚，子房上位，1室。蒴果卵形，较宿萼长、上部分裂，各裂片先端2尖裂。 生态分布：产我国南北各地，多生于沟谷湿地以及村落、城镇庭园边。 药用部分：茎、叶入药，夏秋采收。 用途：性味酸、平。驱风祛寒，解热毒攻心，消小儿积食，止大肠出血。新鲜苗捣汁催乳、净血剂，又可用为盲肠周围炎症的消炎剂。用量：1. 5~3钱。
163	牛毛毡	油麻毡	莎草科 植物形态：多年生小草本，植物体纤细，常成片丛生于水田中，高4~6厘米。茎无节，呈绿色圆筒状。花细小，淡褐色，聚成椭圆形小穗，单生于茎顶。果为细小坚果。 生态分布：产我国南北各省，生于水田，浅沼，湿地。 药用部分：全草入药，四季均可采收。 用途：性味辛、温，无毒。能发散风寒，除胸腹烦闷。治感冒咳嗽和痰多气喘。用量：3. 5钱~1两。
164	牛耳枫	岭南虎皮楠、老虎耳。	虎皮南科 植物形态：常绿灌木，高可达3米。叶互生，革质，长椭圆形，长10~15厘米，两端钝，边缘背卷，表面绿色，背面粉绿色，干后变褐色，叶柄长短不一，最长可达6厘米，愈往上则叶柄愈短。花黄绿色，单性异株，腋生总状花序，苞片早落，花被萼状，无花瓣，雄蕊5~12枚，子房上位，

			<p>2室。蒴果扁球形。</p> <p>生态分布：产我国南部，多生于山坡丛林中。</p> <p>药用部分：根、叶入药，全年可采用。</p> <p>用途：性味苦、涩，凉。能清热解毒、活血散瘀。主治感冒发热、扁桃体炎、脾脏肿大，毒蛇咬伤，骨折等症。用量：于根3~5钱，鲜根5钱~1两，水煎服。</p>
165	中华胡枝子	高脚硬梗太阳草， 台湾胡枝子。	豆科 <p>植物形态：直立小灌木，有时稍平卧，高1米左右。茎上部分枝，茎枝贴生白色绒毛，幼时尤密。叶互生，3出复叶，总叶柄长1~2厘米，在枝上部的叶柄长不满1厘米，和小叶柄均被白色绢毛；托叶钻形，外披绢毛，宿存，小叶片椭圆形，长椭圆形或倒卵形，长1~3厘米，宽0.4~1.2厘米，先端钝，截形或微凹，具针头，表面被短细毛或近于无毛，背面密被白色绢状绒毛，中脉于背面隆起，侧脉平行，全缘，小叶柄极短。花黄白色，蝶形，具紫纹，腋生总状花序，总花轴极短，长仅1厘米左右，和花梗均被绢毛，花萼深5裂，旗瓣倒卵形，顶端微凹，雄蕊10枚，2体，花柱细长而弯曲，柱头小。荚果卵圆形或广椭圆形，扁平，略超出宿存萼外，顶端具刺芒状尖头，外被白色短细毛。</p> <p>生态分布：产我国广东，福建，台湾，浙江等省，多生于向阳山坡疏林下或林缘草丛中和裸岩附近。</p> <p>药用部分：根部入药，夏秋采收。</p> <p>用途：治关节痛。</p>
166	艾	陈艾,大艾,艾蒿， 艾叶。	菊科 <p>植物形态：多年生草本，高可达1米。全体有芳香味，被灰色柔毛，茎部无毛，茎多呈圆形，分枝有浅纵沟，叶互生，卵圆形，羽裂，长5~14厘米，表面浓绿色，密生短毛，背面密布长的灰白色绒毛，裂片先端尖，有不规则的锯齿或小裂片；下部的叶具叶柄；上部的叶近于无柄，裂片狭窄如线形，叶柄上有类似托叶的小裂片。花淡黄色，头状花序，排成狭长的穗状花序，聚合成为顶生的圆锥花序，苞片3~4层，花全为管状，雌花长约1.5毫米;两性花长约2.5毫米。瘦果小，无冠毛。</p> <p>生态分布：产长江流域至南部各省；多生于田边、路边、荒地、荒野，也有栽培者。</p> <p>药用部分：叶或带叶的嫩枝入药，夏秋采收，以5月上旬采者为佳。</p> <p>用途：性味苦、辛，温。能燥湿除寒，温经止血。治子宫出血，便血，吐血，衄血，腹痛吐泻，月经不调，妊娠、产后腹痛急经痛等症。用量：1.5~3钱，作煎剂。</p>
167	半夏	半月莲，三步跳， 土半夏，三叶半夏，扣子莲。	天南星科 <p>植物形态：多年生有毒草本，柔嫩，平滑无毛，高约30厘米左右，地下块茎球形或扁球形，内面白色，直径约1.5厘米，具须根。基生1叶，叶片单一或三裂成三小叶片，小叶片椭圆形或披针形，先端尖，中间的小叶较大，长5~9厘米，宽3~4厘米；叶柄长10~16厘米，在叶片基部或叶柄下部内侧常有径约5毫米左右的株芽幼叶为单叶，卵形，叶片基部耳状，生长二、三年后方有三裂的叶出生。花白色，单性，肉穗花序生于长30厘米左右的花茎顶端，佛焰苞长7~8厘米，下端一小段呈细管状，上部椭圆形，片状，阔约10余毫米，绿色或带淡紫色，雄蕊在肉穗花序的上部，雌花在其下部，二者相隔约5毫米左右；花序轴顶端延伸成一条细鞭，长约10厘米，伸出佛焰苞之外。浆果椭圆形，顶端尖。</p> <p>生态分布：产我国南北各地，多生于山坡湿地、林边、溪谷草丛中，村落庭园中也有生长。</p> <p>药用部分：块茎药用，秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、温，有毒。内服必须注意用量。具镇呕、镇咳、祛痰、镇静作用，对妊娠呕吐及恶阻有特效，并用于胃炎，胃溃疡的呕吐。用量：炮制后内服量1钱~5分~3钱。</p>
168	半边旗	单边锯，雷公翼， 凤凰尾巴草。	凤尾蕨科 <p>植物形态：多年生常绿草本，高可达80厘米。根茎被黑褐色线状披针形的鳞片，茎直立或斜上。叶近生或疏生，叶柄长20~40厘米，强壮，直立或斜上，无毛，有光泽，禾秆色或赤棕色，基部黑褐色，具有棕色钻形的鳞片；叶卵状披针形，长15~45厘米，宽10~24厘米，先端渐尖，一回</p>

			<p>羽状分裂，顶部为羽状深裂；羽片2~6对，长5~10厘米，远离，斜上，下部羽片具短柄，近对生，只一边为羽状分裂，故称“半边旗”；羽片下侧有线状长圆形的裂片，长2~5厘米，上侧裂片不发达或无裂片，先端尾状，上部羽片渐小；不生孢子的羽片其裂片有细锯齿，叶亚革质或纸质，两面平滑无毛，叶脉单一或二叉分枝。孢子囊群线形，沿裂片边缘连续着生，自裂片基部直达顶端，子囊群盖由多少变形的叶缘反卷而成，狭窄，膜质。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省，多生于常绿阔叶林边，或沟谷岩石边草丛中。</p> <p>药用部分：根、茎、叶、全草入药，全年可采。</p> <p>用途：性味辛、涩，温。能清热解毒，疏风散寒，消肿，止血，生肌，解蛇毒。用量：5钱~1两。</p>
169	半边莲	急解索，瓜子草，爬地蜈蚣，鱼尾花蛇舌子，片花连，净毒草，白水草，耙齿草	<p>半边莲科，桔梗科。</p> <p>植物形态：湿地多年生蔓性小草本。全株光滑无毛，茎匍匐地面，绿色，圆形，有分枝，高8~12厘米，质柔软。叶互生，卵状披针形至线状披针形，长1.2~2.5厘米，叶缘微有浅波状，基部楔形，几无柄，先端尖，背面主脉隆起，侧脉不甚明显。花淡红紫色，单生于叶腋，萼2唇形，5裂，花冠2唇形，上唇2裂，且分裂至基部，下唇3裂，均裂向一边，故名“半边莲”；雄蕊5枚，与花萼裂片对生，花药连合成筒状，子房下位，2室。蒴果2瓣裂。</p> <p>生态分布：产长江流域及南部各省；多生于田埂草地、沟边、溪边湿地。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛，平。能消瘀排脓，清热解毒。治蛇虫咬伤，痈疽疮肿，哮喘，疟疾等，并有利尿清水的功能。用量：5钱~1两。</p>
170	兰香草	兰花草，酒药草，杀虫药，蕘，山荆芥，七层楼。	<p>马鞭草科</p> <p>植物形态：落叶小灌木或多年生草本，茎高20~60厘米。茎直立，圆柱形略带紫红色，密被白色细柔毛。叶对生，卵形或卵圆状披针形，长2~5.5厘米，宽1.5~2厘米，先端钝圆，基部阔楔形或浑圆形，边缘粗锯齿，表面被灰白色短柔毛，背面更密，叶柄常0.5~2厘米，密被白色短柔毛，上部叶柄逐渐变短。花蓝紫色或白色，顶生聚伞形花序，萼5裂，花冠5裂，雄蕊4枚，子房上位，4室。小坚果4颗，萼宿存。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡林边灌丛及荒山草地中。</p> <p>药用部分：全草或根入药，夏、秋季采。</p> <p>用途：性味辛，温。能疏风，止咳，祛湿，行气。治上呼吸道感染，风湿痹痛，瘀血腹痛，毒蛇咬伤。用量：5钱~1两。</p>
171	石韦	灰央，牛舌，石剑，飞刀剑，剑丹，小石韦。	<p>水龙骨科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达30厘米。根茎纤细，木质，水平横走，被有茶褐色披针形鳞片，叶远生于根茎上，叶柄有关节，长2~10厘米，被星状毛，叶片披针形至卵圆状椭圆形，长8~20厘米，宽2~5厘米，基部渐狭，先端渐尖，全缘，革质，中脉及侧脉明显，叶表深绿色，疏被星状毛或无毛，背面锈色，满生着孢子囊群，中杂有星状鳞毛。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部、西南各省；多生于岩石、树皮上以及山区村落屋顶、颓墙上。</p> <p>药用部分：全草入药，四季均可采用。</p> <p>用途：性味甘、苦，微寒。能利尿，通淋，清湿热，治淋痛，癃闭。用量：1钱5分~3钱。</p>
172	石蒜	老鸦蒜，秃蒜，月月红，野蒜，一支箭，赤色箭，乌蒜，寒心花。	<p>石蒜科</p> <p>植物形态：多年生常绿小草本。须根丛生，地下鳞茎肥厚，外被紫色的薄膜。冬、春季有叶，夏秋季开花时无叶；叶丛生于鳞茎上，长14~30厘米，宽6~8毫米，叶片肉质，线形或带形，全缘，具平行脉，青绿色，被白粉。花鲜红色，偶有白色或白边者，花茎在叶枯后伸长，顶生伞形花序，有花4~5朵，苞片膜质，花被基部结合，上部6裂，向后反卷，喉部有鳞片；雄蕊6枚，子房下位，3室。蒴果椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至西南各省；多生于阴湿的山坡及河岸草丛中或丛林下。</p> <p>药用部分：秋后采其根头（鳞茎），鲜用或晒干入药。</p> <p>用途：性味甘、辛、温，有毒。能催吐祛痰，消肿止痛，治痈疖疮毒。</p>

			用量：外用适量，不可内服。
173	石耳	石壁花，灵芝，地耳，石木耳。	石耳科 植物形态：扁平叶状体，呈不规则的圆形，直径达10厘米许。表面褐色，背面被黑毛，自背面的中央伸出短柄，着生于岩石上，子器极稀少。 生态分布：产我国中部及南部各省；生于悬崖及岩壁上。 药用部分：全草入药，四季可采。 用途：性味甘、平，无毒。能清热解毒，利小便。治吐血红崩，热结小便痛，白浊，白带，痢疾，毒蛇咬伤，火烫伤和刀伤等。用量：3~5钱。
174	石斛	石扁角，石黄豆，石斗，铁皮石斛，铁皮斛，枫斗，吊兰，小金钗，黄草，黑节草，铁皮。	兰科 植物形态：多年生常绿草本。附生于树皮或悬崖上，茎直立，丛生，圆柱形，有节，长达30厘米，深褐绿色。叶鞘灰色，干燥时呈黑色。茎的上部渐细尖，富含黏液，干后易折断，折断面呈深绿色，有黏液汁渗出，味淡，咀嚼后有粘着感。叶互生，狭长椭圆形至广线形，革质而润滑，叶鞘膜质。花黄绿色，顶生总状花序，常有花3~5朵，萼片3枚，中萼片披针形，侧萼片与中萼片相似，但基部斜生于蕊柱基部成为囊状，花瓣3片，唇瓣生于蕊柱足的前端，基部紫色，蕊柱先端有药，药二室，每室有花粉块4个，紧密并立。蒴果倒卵形，有三钝棱，内含多数黄色椭圆形种子。 生态分布：产我国北部、长江流域、西南部及福建等地；多生于山林岩石及树皮上。 药用部分：茎入药，全年可采。 用途：性味甘，寒。为强壮剂。治阳痿，盗汗及消耗性诸症。并有清凉滋养生津之效。用量：3~5钱。
175	石松	伸筋草，青龙草，金毛狮子草。。	石松科 植物形态：常绿多年生草本。茎匍匐而纤细，长达40厘米，具直立或斜上的分枝。叶多列，螺旋状排列，叶线状钻形或略呈镰形；长4~6毫米，先端延长为白毛状芒，全缘，有时下部具有小牙齿。孢子囊穗圆柱状，长4~5厘米，有柄，常2~5着生于分枝顶端，孢子叶卵状三角形，有小柄，先端为长尾状长舌，边缘膜质，有不整齐齿牙。孢子囊肾形，淡黄褐色，横裂，孢子四面体球形，有密网纹及小突起。 生态分布：产我国南北各地；多生于疏林边及荒山草地中。 药用部分：全草入药。6~10月采收。 用途：性味苦，温。能祛风，活血，舒筋，散寒止痛。治风湿日久，气力衰弱，腿膝痛，腰痛，皮肤麻木不仁。用量：2钱~1两。
176	石楠	扇骨木，凿树	蔷薇科 植物形态：常绿灌木或小乔木，高至12米。树皮灰黑色，小枝通常无毛。叶互生，厚革质，长椭圆形至椭圆状长椭圆形，长8~20厘米，宽3~7厘米，基部阔楔形或近圆形，先端突尖或渐尖，边缘有细锐锯齿，表面深绿色，幼时中肋上有褐色细毛，背面黄绿色，带有白粉，叶柄粗大，长2~3厘米，幼时有褐色细绒毛。花白色，伞房状圆锥花序，花萼5裂，花瓣5瓣，雄蕊20枚，子房下位，被灰白色细毛，花柱2枚。梨果，椭圆形或近球形，红色，顶端有宿存萼片。 生态分布：产我国长江流域至南部各省，多生于常绿阔叶林中，村落及城市庭园中也常有栽植。 药用部分：根、叶入药，全年可采用。 用途：性味辛、苦、平，有小毒。叶为强壮剂，利尿剂，有镇痛解热作用。治头风，疗脚痛，养肾气，利筋骨，治月经不调等症。又可防治棉蚜虫，对马铃薯病孢子发芽有抑制作用。用量：叶2~3钱。
177	石榴	安石榴	安石榴科 植物形态：落叶灌木或小乔木，高达5米。枝常具刺针，小枝四棱形，木材黄色。叶略对生或丛生，长椭圆形或长倒卵形，全缘，光滑，先端尖或钝，长4~6厘米。花红色，1~5朵顶生小枝端，或成腋生，萼钟状，上端有5~8裂片，花瓣5~7片，略邹折，或有重瓣，雄蕊多数，子房下位，3~7室。果为浆果状，中具薄隔膜，内含多数带透明肉质外种皮的种子。 生态分布：我国各地均有栽培。 药用部分：果皮、花及根入药，秋季采收。 用途：性味酸、涩，温。果皮为收敛止泻药，久痢，下血，遗精，崩漏，虫积腹痛。用量：果8分~1钱5分。

178	石斑木	凿角，春花，铁里木。	蔷薇科	<p>植物形态：常绿灌木，高可达3米。树皮暗紫褐色或暗灰色，小枝紫棕色，光滑无毛。叶互生，革质，长椭圆或倒卵至倒卵状披针形，长约3.5~8厘米，宽1.5~3.5厘米，先端钝或短渐尖，基部楔形并下延于叶柄，表面暗绿色，背面淡绿色或苍白色，两面无毛，主脉于下面隆起，边缘向下卷，具疏锯齿。花白色带红晕，顶生总状花序或短圆锥花序，花萼5裂，花冠5瓣，雄蕊15枚左右，子房下位，2室。果为梨果状，球形，熟时蓝黑色。</p> <p>生态分布：产我国长江下游至南部各省；多生于阔叶林或疏林中。</p> <p>药用部分：根入药，全年可采。</p> <p>用途：治足踝关节陈伤作痛，跌打损伤。</p>
179	石吊兰	石三七，石豇豆。	苦苣苔科	<p>植物形态：常绿小灌木，附生岩石或树皮上，高达25厘米。匍匐茎灰色，光滑无毛，皮微有皱纹，老枝黄棕色，分枝稀疏。叶厚革质，三叶轮生，长3~5厘米，宽9~11毫米，基部钝，先端有7~9个细齿，下部全缘或微波状，表面深绿色，有光泽，背面淡黄绿色，主脉明显下凹而在背面凸出，侧脉不明显；叶柄紫红绿色，无毛，长约4毫米。花淡红色，腋生或顶生，聚伞花序；萼深5裂，花冠筒状，唇形，5裂，发育雄蕊2，退化雄蕊2，花盘环状。子房上位，2室。蒴果线形，2瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部和西南各省；多生于树枝上，岩石、悬崖上。</p> <p>药用部分：全草入药，全年均可采用。</p> <p>用途：性味苦、涩，温。为通经药。治妇女血气痛，孕妇忌服。云南、贵州称黑乌骨，用于通肢节，治跌打损伤。用量：3钱~5钱。</p>
180	石龙芮	鸡脚爬草，野芹菜。	毛茛科	<p>植物形态：一年生或二年生草本，高达50厘米。须根白色，茎直立，粗大，光滑无毛。根出叶近肾形至圆形，长3~4厘米，宽4~7厘米，基部心形至截形，先端3裂、侧裂片更分成2~3裂，顶生叶片楔形，小裂片又具2~3圆钝齿，叶柄长5.5~9厘米；基生叶叶柄较短，梗上近无柄，3深裂至全裂，裂片线状披针形，边缘疏生缺刻状钝齿牙，近着花的叶为狭长椭圆形，边缘常呈波状，花黄色着生于茎稍分枝上，对叶单生，花梗被短绒毛，花茎约7~8毫米，萼片椭圆形，略向外卷，花瓣与萼片几同长，倒卵状椭圆形，基部具1小鳞片，雄蕊多数，花丝短，药长椭圆形，雌蕊心皮多数，集成椭圆形，花柱短。瘦果倒卵形，多数密集成短圆柱状，长约1厘米左右，无毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于路边潮湿地区、水边，或水田中。</p> <p>药用部分：全草、根、叶及种子入药，纯夏季采用。</p> <p>用途：性味苦，平。能补阴，润燥，逐诸风，利关节。治风寒湿痹，心腹邪气，腰部酸痛，脚跗浮肿。补阴治失精，与枸杞子、复盆子同功。叶治猝然吐泻与香薷同功，又能下瘀血，消结核，疗痈肿瘰癧，解蛇毒。</p> <p>用量：全草1钱~3钱。</p>
181	石龙胆	龙胆草，紫花地丁，六月绿花草。	龙胆科	<p>植物形态：二年生小草本，高达10厘米左右。丛生地面，茎和枝都为紫红色。叶对生，圆形至卵形，长约1厘米，宽约5毫米，无柄，全绿，顶端尖，叶两面都有白色的细绒毛。花兰紫色，顶生，萼管状，5裂，具白色柔毛，花冠钟状、5裂，每裂片又裂为2片；雄蕊5枚，着生在花冠上；子房上位，2心皮，1室，侧膜胎座。蒴果二瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡草地及河边沙滩地草丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏季采用。</p> <p>用途：性味苦，寒。能清热，消肿，解毒。治痈疽发背，疗肿瘰癧，无名肿毒及恶疮。用量：1~3钱。</p>
182	石菖蒲	石香蒲，水剑草，水菖蒲，鲜菖蒲，九节菖蒲，山菖蒲，剑菖，溪菖。	天南星科	<p>植物形态：多年生常绿丛生草本，高可达60厘米。全体有香气，地下根茎平卧。叶侧扁二列式互生，狭线状，网纹细而平行，无中脉。花黄绿色，肉穗花序生于叶丛中央，长4~10厘米，有叶状的佛焰苞，花被6片，雄蕊6枚，雌蕊多为1枚，子房上位，4~5室，呈六角形。浆果倒卵形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；生于溪流上源的砾石上，以及水沟湿地。</p>

			<p>药用部分：早春冬末采根茎，去叶，洗去砂土，晒干，供药用。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能健胃，驱风，镇静，驱虫；外用治牙痛，齿龈出血，用根磨细粉涂擦。煎汤作水浴可治皮肤病，或熏洗痔疮有效。</p> <p>用量：根茎8分~2钱。</p>
183	石芥苎	土荆芥，北风头上一枝风，霍乱草，痲子草，大叶香藿，野荆芥，野香藿，野苏叶，野藿香。	<p>唇形科</p> <p>植物形态：一年生草本，高达50厘米。茎直立，具四棱，稍有柔毛，全体有薄荷芳香气味。叶对生，椭圆形至卵状椭圆形，长4~7厘米，基部阔楔形，先端锐形，边缘有线锯齿，背面有细斑点，两面有细毛。花淡紫色，唇形，为顶生或腋生的轮生总状花序，萼钟形，5裂，2唇形，花冠小，上唇凹入，2裂，下唇3裂，雄蕊2枚，退化雄蕊2枚；子房上位，4裂。小坚果4枚，生于钟状萼管内。</p> <p>生态分布：产我国长江流域及南部各省；多生于山坡草地、路边河畔以及村落附近矿地上。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采用。</p> <p>用途：性味辛，温。能祛风除湿，止血。用量：1~5钱。</p>
184	白术	于术，冬术。	<p>菊科</p> <p>植物形态：多年生草，地下根茎肥大。茎直立，高可达80厘米，下部木质化。叶互生，革质，茎下部叶有长柄，3深裂，中部裂片最大；上部叶椭圆形至卵状披针形，长8~12厘米，宽2~4.5厘米，基部渐狭，下延成叶柄，叶缘具有刺状齿。管状花紫红色，顶生头状花序，花冠5裂，聚约雄蕊5枚；子房下位，1室，密被淡褐色绒毛，上端具羽状毛。瘦果扁椭圆形，顶端有宿存冠毛。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡林边及灌丛中。</p> <p>药用部分：根茎入药，秋冬采收。</p> <p>用途：性味苦、甘，温。能补脾健胃，和中化湿，利水止汗，安胎。用量：1钱5分~3钱。</p>
185	白果	银杏，公孙树，飞蛾叶，佛指甲，鸭脚板，灵眼。	<p>银杏科</p> <p>植物形态：落叶大乔木，高达30米。树皮淡灰色，老时黄褐色，枝分长枝、短枝两种。叶丛生于短枝顶端或互生于长枝上，宽5~10厘米，顶端2浅裂，边缘通常呈波状或不规则的浅裂，少有全缘者，叶脉略为放射叉状，叶柄与叶片等长或更长。花淡绿色，单性异株，雄花茅荑花序，雄蕊多数，雌花单生于短枝顶端，每枝2~3朵，花柄长。种子黄白色，微具白粉，倒卵形至椭圆形，内种皮坚硬，种仁肉质白色。</p> <p>生态分布：特产我国，为著名的孑遗植物，全国各地均有栽培：</p> <p>药用部分：将鲜种子放甑内蒸，晒干或烘干，去外壳，取种仁入药。农历10月采收，</p> <p>用途：种子性味甘、苦、平，有小毒。内服不能多用，能润肺，止咳平喘。治女子白带，男子白浊，外用阴虱作痒。用量：1钱5分~3钱。</p>
186	白鲜	白鲜皮、白羊鲜	<p>芸香科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达1米，全体有香气，下部类似灌木状。叶互生，奇数羽状复叶，长22厘米，小叶通常9片，有时可至13片，卵圆至椭圆形，先端短尖，边缘有细锯齿，基部略带楔状或左右稍不相称，无小叶柄，小叶表面密布油腺点，背面油点较稀，羽状脉突起，沿脉有细柔毛，尤以背面较多，老时脱落，叶轴两则有狭翼。花淡红或白色，顶生总状花序，萼片，花瓣均5片，雄蕊10枚，着生于环状花盘的基部；子房具短柄，上位，5室。蒴果，熟时5裂。</p> <p>生态分布：产我国东北及长江下游各省；多生于阔叶林边和沟谷湿地。</p> <p>药用部分：根皮或根供药用，春秋季采集。</p> <p>用途：性味苦，寒。白鲜皮为驱风祛暑剂，清湿热、利尿、通关节的作用，主治风痹，湿疮，疥癣，黄疸等。并能作通经药用。用量：根皮1钱5分~3钱。</p>
187	白栎	栗子树，白紫蒲树。	<p>壳斗科</p> <p>植物形态：落叶乔木，高可达25米。树皮灰白色，纵裂成阔条状，小枝有沟槽，密生柔毛。叶互生，革质或坚纸质，叶片倒卵状椭圆形，长7~14厘米，顶端钝，基部楔形，边缘有6~12对波状钝圆齿，上面疏生星状毛或近于无毛，下面密生灰色星状绒毛，侧脉9~12对，直达边缘；叶柄长3</p>

			<p>~5毫米，少数达10毫米。花黄绿色，单性同株；雄花排列成茅荑花序，下垂，生于上年生枝条上；花被6深裂，雄蕊6枚，偶为8枚；雌花单生或2~3朵聚生于新梢叶腋内，子房下位，3室。总苞浅杯状，鳞片卵状披针形，呈复瓦状排列，紧贴，每1总苞通常内含坚果1个，坚果圆锥形或长卵形，果实有时幼时被虫害而长成苞片状球形的虫瘿，供药用。</p> <p>生态分布：产长江流域至南部各省；多生于阔叶林边，山坡灌丛中，尤以砍伐迹地为最多。</p> <p>药用部分：白栎蓓（即果实的虫瘿）入药，秋季采收。</p> <p>用途：治小儿疳积，大人疝气及小儿尿如米泔，火眼赤痛。用量：5~7钱。</p>
188	白芨	地螺丝，羊角七，千年棕，君球子，一兜棕，白鸡儿，鞞口药，利知子。	<p>兰科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达70厘米。地下球茎扁卵形，有时为不规则的圆筒形，白色或淡黄色，富胶质，根上密生小毛茸。叶互生，5~6枚，长披针形至长椭圆状披针形，长20~40厘米，宽2.5~5厘米，下部有管状叶鞘，互相重叠包茎，先端长尖，全缘，平行叶脉，叶面多纵行皱纹。花红紫色或黄白色，总状花序，生于花茎顶端，花被6片，2轮，内轮花被唇瓣抱蕊柱生长，花粉块8枚，子房下位，1室。蒴果圆柱形，两端稍尖，有6棱脊。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部及西南各省；多生于山坡草地、疏林或灌丛边。</p> <p>药用部分：根茎入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味苦，平。能止血补肺，生肌止痛，润筋行气，治痈肿恶疮败疽，胃中邪气，血痢，跌打骨折，手足皴裂，矽肺，喉部出血，外伤，鼻出血。用量：1钱5分~3钱。</p>
189	白苏	荏，野紫苏，野苏。	<p>唇形科</p> <p>植物形态：一年生直立草本。全体具有芳香气味，高达1.5米，有分枝。茎绿色具4棱，基部木质，光滑，上部密生长白毛。叶对生，叶柄长1~5.5厘米；叶片卵圆形或圆形，长3~13厘米，宽2~10厘米，基部圆形，先端急尖或渐尖，或呈尾状，边缘有粗锯齿，背面有腺点，两面均具毛茸，沿脉较密。花白色，每两朵生于枝顶或叶脉，集成总状花序，苞片无柄；萼钟状。2唇，花冠筒状，2唇，上唇微凹，下唇3裂；雄蕊4枚，2强，子房上位，4裂，小坚果4枚，倒卵圆形，黄褐色，有网状纹。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于山坡、路边、河边、灌丛边，村落、城镇附近均常见。</p> <p>药用部分：全草供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛，温。为芳香健胃药，有祛痰、利尿之效。用量：1钱5分~3钱。</p>
190	白芷	杭白芷	<p>伞形科</p> <p>植物形态：多年生草本，高1~2米。根垂直粗大，直径约2~3厘米，圆柱形，中空，呈紫红色；近花序处的枝有短柔毛。叶互生，根生叶和茎下部的叶大，有长叶柄，叶柄基部扩大呈鞘状，抱茎，叶为2~3回羽状分裂，小叶卵形至长卵形，长2~6厘米，宽1~3厘米，基部下延成小柄，先端锐尖，边缘有锐重锯齿；茎上部的叶较小，叶柄全部扩大成卵状的叶鞘，叶脉上有短柔毛。花白色，顶生或腋生复伞形花序，总苞缺或1~2片，膨大成鞘状苞片，小总苞多数，花萼缺少，花瓣5片，向内弯曲，雄蕊5枚，子房下位，2室。双悬果呈扁平椭圆形，分果具5棱，侧棱呈翅状，每棱槽间油管1个，复合面有油管2个。</p> <p>生态分布：产我国北部及长江流域各省。</p> <p>药用部分：根供药用，夏秋采挖。</p> <p>用途：性味辛，温。有散风、燥湿、活血、排脓、消肿、止痛的功效，治头痛眩晕，鼻渊，痈疽肿痛，痔漏，血崩带下。用量：1钱5分~3钱。</p>
191	白茅	白茅根，芭茅根，女茅，丝茅草，甜根草，茅根，丝毛根。	<p>禾本科</p> <p>植物形态：多年生直立草本。高达60厘米，根茎瘦长，白色蔓延地下。叶二列式互生，线形，长10~30厘米，宽2~4毫米，叶与秆均粗糙，有纤毛。花紫绿色，顶生穗状圆锥形花序，长3~5毫米，宽约9毫米，密被银白色长柔毛；雄蕊1~2枚；子房下位，1室。颖果小，长椭圆形，密被丝状柔毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；常生于山坡及荒芜地区，尤以耕种后的沙</p>

			<p>地或山坡最为普遍。</p> <p>药用部分：根茎入药，3~4月或7~8月采挖。</p> <p>用途：性味甘、寒，无毒。能清瘀热，利小便，解酒毒，治吐血衄血，热淋尿血，瀉逆喘急，黄疸，水肿。孕妇忌用。用量：5钱~1两。</p>
192	白菰	痢痢茶，白根，山地瓜。	<p>植物形态：落叶藤本。根呈卵形块状，茎多分枝，小叶平滑无毛，散生点状皮孔。叶互生，羽状复叶，3~5小叶，小叶一部分为羽状分裂，裂片卵形，基部楔形，总叶轴有翅，先端渐尖，边缘粗锯齿。花淡黄色，聚伞花序与叶对生，生于细长而常作缠绕状的花梗上，花小，萼片，花瓣、雄蕊各5枚，子房上位，2室，具花盘。浆果球形，白色或紫蓝色。</p> <p>生态分布：产我国南北各声；多生于山坡林边，灌丛中，荒山草地亦有分布。</p> <p>药用部分：根、果实入药，春秋冬采收。</p> <p>用途：性味苦，平。能泻火，散结，解毒，止痛，生肌。治痈肿，瘰癧，痔漏，烫火伤。用量：根1钱~2钱。</p>
193	白薇	白前，白马薇。	<p>植物形态：多年生直立草本，高达60厘米，全体密被白绵毛。叶对生，具短柄，叶片椭圆形，基部楔形，先端渐尖，全缘。花紫褐色，花萼与花冠均5深裂；副冠5个，椭圆形，基部渐狭，雄蕊5个，药着生柱头周围，子房上位，外面有细绒毛，由二分离心皮组成，花柱2枚，分离，顶端合生成5角扁盘状柱头。骨突果成熟时开裂，撒出多数种子，种子具白色长绒毛。</p> <p>生态分布：产我国东北，北部，长江流域各省至福建；多生于疏林下，灌丛边和草丛湿地。</p> <p>药用部分：全草及根茎入药，春秋季采收。</p> <p>用途：性味苦，寒。能生津益气，退热止咳。治浮肿，淋症，腹痛，感冒。用量：根茎1~3钱。</p>
194	白英	毛葫芦，毛老英，毛风藤，毛菟菜，毛桃仁，白毛藤，毛骨藤，毛骨风，毛老人。	<p>植物形态：多年生蔓性草本。茎长达5米，粗可至3厘米，灰褐色至灰黄色，有纵的棱线和圆形的皮孔，幼枝青绿色，有毛茸。叶互生，卵形，长约3~8厘米，宽约2~4厘米，基部心脏形，锐尖头或尖头，上部全缘或波状，下部通常有2对钝裂片，形成耳状，少数全缘，两面都有毛茸，表面青绿色，背面淡绿色，具叶柄，长约1~3厘米，密生短毛。花白色，复聚伞花序，萼5浅裂，花冠5深裂，雄蕊5枚，子房上位，2室。浆果球形，熟时红色，有宿存萼片。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于疏林边、灌丛中，村落附近也常有生长。</p> <p>药用部分：全草供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、苦、微寒，有小毒。除湿祛风，凉血解毒，治白带，疮毒，瘰癧等病。用量：5钱~1两。</p>
195	柳叶白前	水杨柳，水柳子，江杨柳，草白前。	<p>植物形态：水生多年生常绿草本。高达60厘米，长成片生长于溪边。根茎细长，匍匐状，根细、簇生于根茎的节上。茎直立，单一或有分枝，圆柱形而具细棱，表面灰绿色，下部稍微木质化。叶对生，有短柄，着生在茎的中部以上，叶片披针形，基部渐狭，先端尖，全缘，长3~8厘米，宽8毫米，中脉明显，表面无毛，深绿色。背面无毛或近似无毛，淡绿色。腋生聚伞花序，花小，萼及花冠5深裂，雄蕊5枚，着生于花冠基部，包围雌蕊，合生成蕊柱，花药二室各有1花粉块，雌蕊由2个离生心皮合成，延长成二花柱，顶端联合成盘状柱头。骨突果长角状，种子黄棕色，顶端有白色绢丝毛。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至西南和南部各省；多生于溪畔流水岩石上、冲积土上。</p> <p>药用部分：根及全草入药，8月间采集。</p> <p>用途：性味辛、苦、微、寒。能清肺热，降肺气，化痰止咳，为镇咳祛痰药。治感冒之咳嗽喘息，慢性支气管炎等症。用量：根茎1钱5分~3钱。</p>
196	芫花叶白前	白前	<p>植物形态：多年生草本。有匍匐根茎，粗约1毫米，节上丛生多数须根，茎直立，高达40厘米，有少数分枝，幼枝具棕色毛茸，老枝毛茸较稀少。</p>

			<p>叶对生，椭圆形或长椭圆形，基部楔形，先端钝圆或锐尖，全缘，长2.5~5厘米，宽0.8~1.5厘米，近于无柄。花黄白色，腋生聚伞花序，花轴上有黄色毛茸，花较柳叶白前的花为大，萼几乎全5裂，花冠5深裂，具有肉质瘤状的黄绿色副花冠5片，上部围绕于蕊柱顶端，下部与花丝基部相连，雄蕊5枚，着生于花冠基部与雌蕊联合成蕊柱，雌蕊1枚，由2各离生心皮组成，子房上位。果为骨突果。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部及西南各省；多生于波阳湖滨和湖州沙地上。</p> <p>药用部分：根茎及根入药，8月间采集。</p> <p>用途：同柳叶白前。</p>
197	白背叶	白面风，白冒顶，白林树，白鹤树，橡皮柴，白朴木，谷皮柴，天青地白紫，猫屎段，山桐，白桃叶。	<p>大戟科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高可达3米，树皮褐色，枝暗紫色，幼枝密被灰白色星状绒毛。叶互生，广卵圆形，长8.5~13厘米，宽5.5~12厘米，顶端常作2~3浅裂，叶片三角形，先端渐尖，中央裂片最大，如为全缘则顶端长尖或骤尖，表面绿色，疏被星状绒毛，基部与叶柄交接处，具扁压状圆形环状腺体1对，背面密被灰白色星状绒毛。花单性，异株，雄花雄蕊多数（约50枚左右）；雌花花萼3~5片，花柱3枚（偶为4枚），子房上位，3室，密被软刺，上被灰白色星状绒毛。蒴果近圆球形，表面具长软刺，胞背开裂。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部各省；多生于向阳山坡林缘或疏林内，和低丘陵地区灌丛中。</p> <p>药用部分：根、皮、茎、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、涩，平。治腰部扭伤痛疼及妇女产后腰痛腹胀，慢性肝炎，脱肛，白带，扁桃体炎，刀伤出血。用量：根5钱~1两。</p>
198	白接骨	橡皮草，阿西达。	<p>爵床科</p> <p>植物形态：多年生草本，高可达70厘米。基部略匍匐状，地下茎方形，白色，质脆，富有白色粘液；地上茎方形，分枝，秃净。叶对生，卵形，披针形至椭圆形，长8~10厘米，宽2~4.5厘米，基部楔形至近圆形，常下延至叶柄，先端渐尖至尾状渐尖，边缘具极不明显的锯齿，表面深绿色，背面淡绿色，两面秃净，叶柄长3~5毫米。花淡紫色，顶生穗状花序，花偏于一侧，萼钟状，5裂，花冠漏斗状，5裂，雄蕊4枚，子房上位，2室，蒴果长椭圆形，2瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省。</p> <p>药用部分：叶、根茎入药，夏秋采集。</p> <p>用途：止血。</p>
199	白乳木	银栗子，白木。	<p>大戟科</p> <p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达8米。树皮淡褐色，平滑，枝细长，灰褐色，光滑无毛，有乳汁，具特殊臭味。叶互生，卵状椭圆形，长椭圆形或倒卵状椭圆形，长7~12厘米，宽3~7厘米，基部宽楔至近圆形，或偶为平截，有时带浅心形，表面深绿色，常略带紫红晕，背面淡绿色，均光滑无毛；侧脉5~7对，不达叶缘而斜上，相互连结成网状，叶脉于下面隆起，在叶片基部或边缘近侧脉末梢处，具压扁腺体2枚，全缘，但常带浅波状，叶柄长1~2厘米，光滑无毛。花单性，黄色，生于新枝顶端，与枝端叶片对生，排列为穗状花序，雄花位于上部，萼杯状，顶端3浅裂；雄蕊3枚，雌花生于花序基部，子房上位，3室。蒴果3棱形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡阔叶林内和溪谷两旁稍阴湿的丛林内。</p> <p>药用部分：根、皮、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：治劳伤腰部酸痛，中漆毒。用量：根5~8钱。</p>
200	白珠树	满山香、搜山虎。	<p>杜鹃花科、石南科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高可达3米，枝细长，带红色或红绿色。叶互生，革质，卵状长方形或阔卵形，长7~9厘米，阔2.5~3.5厘米，先端尖，长尾状，边缘具钝齿，略向外卷，基部心脏形或圆形，表面深绿色，无毛，背面青白色，被细柔毛，叶柄长约5毫米，短而粗，无毛。花青白色，腋生总状花序或圆锥花序，花萼5片，花冠壶形，5裂，雄蕊10枚，子房上位，5室，花盘分裂成10裂片。蒴果球形，花柱宿存，宿存花萼变为肉质包于果外，使果实成浆果状，种子细小，多数。</p>

				<p>生态分布：产长江以南至西南部各省；多生于林边及荒山草地中。</p> <p>药用部分：根入药，多于9~10月采挖其根，鲜用或晒干后药用。</p> <p>用途：性味辛，温。能活血祛瘀，续筋接骨。治风湿筋骨痛及折损劳伤、腰痛。用量：5~8钱。</p>
201	白花地丁	浦氏堇菜，铧头草	堇菜科	<p>植物形态：多年生草本，高6~10厘米。主根粗圆，侧根纤细，白色；地下茎短，无地上茎。叶丛生于地下茎上，叶柄细长，微紫红色，具短毛，有翼状叶鞘，叶长椭圆状披针形，基部楔形或有时戟形，先端钝圆，边缘有钝锯齿，表面青绿色，背面淡绿或有微紫色，长3~5厘米，宽1.5~2厘米。花白色，有紫色条纹，单生于花茎顶端，花茎数个；萼5片；花冠5瓣，两侧对称，下面1瓣较大，具距，雄蕊5枚，绕子房排成一圈，花药连合，其中2枚雄蕊基部有细长的距伸入花瓣距筒内；雄蕊3心皮，子房上位，1室。蒴果3瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部；多生于山坡林边，灌丛边，溪边，田边及旷野湿地。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、辛，寒。能除风火，散瘀血，通经，消肿，解毒。治红肿疮毒，疔疮及淋浊等症。用量：5钱~1两。</p>
202	白花前胡	前胡，鸡脚前胡，山独活，岩风，官前胡。	伞形科	<p>植物形态：多年生草本，茎高达60厘米。粗大，呈圆形，上部呈叉状分枝。根生叶和茎下部叶具叶柄，基部宽展呈广卵状长圆形的叶；叶片膜质，圆形至广卵形，三出二回或三回羽状分裂，第一回裂片有叶柄，卵圆形，第二回裂片有短柄，或近于无柄，卵行，最后裂片呈棱状倒卵形。花白色，顶生复伞形花序，萼5片，花瓣5，雄蕊5枚；子房下位，2室。双悬果卵圆形，背棱和中棱呈线状，侧棱具窄翅。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部各省；多生于沟谷林边湿地或灌丛下。</p> <p>药用部分：根入药，春初或秋季采收。</p> <p>用途：性味苦，微寒。根有解热，镇咳，祛痰的功效，通常治疗风热咳嗽，涕唾稠粘，痰稠喘满及呕逆等症。用量：1钱5分~3钱。</p>
203	白花败酱	苦莽公，苦斋，败酱草，胭脂麻。	败酱科	<p>植物形态：一年生草本，高达1米，茎直立，全株初具倒生白色粗毛，后渐光滑，仅留少数于节处，上部少分枝。叶对生，几无柄，叶片狭椭圆形，长3~10厘米，宽1.5~5厘米，两面均具粗毛，先端长尖或尖，边缘具粗锯齿，基部窄狭，下延并抱茎。花白色，腋生，聚伞花序，总苞片长线形，对生，萼片细小，5裂，花冠盆形，5裂，雄蕊4枚，子房下位，3室，仅1室发育，蒴果倒卵形，具短毛，背面有由不发育的两个子房形成的膜质圆翼，长约5毫米，有明显的脉纹，种子1枚。</p> <p>生态分布：全草入药，5~6月采收。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。能散瘀消肿，活血排脓。治肠痈有脓，血气心腹痛，目赤障膜胬肉及敷疮疖疥癣。用量：1钱~3钱。</p>
204	败酱	宏苦菜，苦斋，黄花龙牙。	败酱科	<p>植物形态：多年生草本，根茎粗壮，横卧斜生，茎直立，高可达1米。根生叶为丛生状，卵形或卵状披针形，连叶柄长可达15厘米。先端尖，琴状羽裂，边缘有粗齿，叶柄长；茎生叶对生，羽状分裂，裂片5~11片，顶端裂片较大，披针形，先端尖，边缘具不整齐的大锯齿，无毛或被白刚毛，叶柄短。花黄色，顶生伞房状聚伞花序，萼细小，花冠管状，5裂，雄蕊4枚，子房下位，3室，不发育的子房室稍大而成狭翅，其他2室隆起而略呈棒状。蒴果长椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡林边，溪谷丛林边草丛中。</p> <p>药用部分：全草或根供药用，全草春夏采收；夏秋采根入药。</p> <p>用途：性味苦，平。有解热、排脓利尿破瘀之功。治痈肿，肠炎，下痢，慢性结肠及盲肠炎，腹膜炎等症，又能排泄粘液或脓液，并治吐血，衄血，子宫颈炎，结膜充血等症。</p>
205	白花蛇舌草	南地株，尖刀草，白花十字草，一节一枝花，水边仙桃	茜草科	<p>植物形态：一年生草本，高20~30厘米，全体无毛。叶对生，无柄，线形，全缘，长1~3厘米，宽1~3毫米，托叶齿裂，长1~2毫米。花白色，单生或成对着生于叶脉，无柄或具短柄，萼球形4裂，花冠4裂，雄蕊4枚，子房</p>

		，蛇针草,蛇舌草， 甲猛草。		<p>下位，2室。蒴果扁球形。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生长于路旁草地，荒山草地，畦畔或庭园间。</p> <p>药用部分：全草药用，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、淡，凉。能清热解毒，活血利尿。治盲肠炎，又可治一切肠病及癌症。用量：1~2两。</p>
206	白花曼陀罗	曼陀螺花，风家 儿，山茄子，洋金 花，曼陀螺。	茄科	<p>植物形态：一年生直立、粗状草本，高达1.5米。茎圆柱形，表面光滑，灰白色，上部灰绿色，二叉状分枝，幼枝略带紫色。叶互生，上部常呈对生状，卵形至广卵形，长9~18厘米，先端渐尖，基部不等边，表面乳绿色，背面淡绿色，两面均秃净，边缘微波状，或作不规则的浅裂。花白色，单生在枝叉间或叶腋间，花萼圆筒状，长4~6厘米，宽约2厘米，开放时呈喇叭状，5裂，雄蕊5枚，子房上位，2室，表面生短刺。蒴果扁圆形，有粗短刺。</p> <p>生态分布：花、叶、种子入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、温，有大毒。叶和种子为麻醉性镇咳、镇痛剂。干叶掺烟叶中吸之，可治喘咳；其浸剂，对痉挛性咳嗽，喘息，慢性支气管炎咳嗽有效。花瓣有镇静、镇痛作用，可治神经痛。用时宜慎凡体虚弱者忌用。亦有用其根治狂犬咬伤。用量：花3~5分。</p>
207	四叶律	锯子草，四叶草。	茜草科	<p>植物形态：多年生草本。茎纤细，四棱形，秃净，下部匍匐地面，上部直立。叶为四叶轮生，叶片椭圆形或倒卵状椭圆形，长0.3~1.5厘米，宽0.3~0.7厘米，基部狭楔形，下延至叶柄基部，成为无柄状，先端圆而突尖，全缘，表面疏生短毛，背面平滑。花淡黄绿色，腋生聚伞花序，萼与花冠均4裂，雄蕊4枚，子房下位，2室。果为不开裂的干果，扁而呈双头状。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于沟谷草丛湿地或溪边草丛中。村落、城镇庭园中均有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏采收。</p> <p>用途：性味甘，平。清热解毒，消肿止痛，通利小便，治癌症，赤白痢。用量：3钱~1两。</p>
208	四季菜	野茺萎，大力王， 白花蒿。	菊科	<p>植物形态：多年生草本，高可达1米。全体无毛，茎绿色，具棱槽。叶互生，卵形，羽状分裂，具有齿缺的裂片，表面绿色，背面淡绿色，长1~7厘米、宽1~5厘米。花白色，头状花序多数，聚集成疏散的圆锥状花丛，总苞球形至卵圆形，光滑无毛，花托隆起，球形，着生雌性花和管状花各10枚左右。瘦果圆柱。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于山坡林边或灌丛边及路边，村落附近常生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘，寒。铜鼓县民间全草用作发散药，浙江民间全草用以治黄疸病。用量：3~8钱。</p>
209	四棱草	箭羽舒筋草,筋骨 草,假马鞭草,箭 羽草。	马鞭草科	<p>植物形态：多年生草本，高可达1米。茎直立，暗绿色，四棱形，棱边具膜质翅，节处较细，多分枝，无毛。叶片卵形或卵状披针形，长1~2.5厘米，先端尖，基部宽楔形或圆形，两面均有毛；下部的叶多为3裂，上部节上的叶渐小或无叶，叶柄长2~12毫米，有毛。花淡紫色，单生于叶腋，萼钟形，5裂，花冠唇形，淡紫色，上唇2裂，下唇3裂，雄蕊4枚，长伸于花冠管外，子房上位，4深裂。小坚果4枚。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋季均可采取。</p> <p>用途：性味微苦、酸、温，无毒。能除风湿，行血活血，治风湿筋骨疼痛，腰痛，跌损肿痛和四肢麻木。</p>
210	玉米	包谷，包米。	禾本科	<p>植物形态：高大一年生草本，高2~4米。通常分枝，茎下部各节常具有支柱根，秆略呈扁圆柱形，节间较长，节稍膨大而明显。叶为2列式互生，叶鞘具横脉；叶片宽大，线状披针形，边缘呈波状皱折，中脉粗壮。花</p>

				<p>单性同株，雄花为顶生圆锥状穗状花序，小花有两颖，外稃于内稃长于颖；雌花为肉穗花序，单生于叶腋，雌花成8~13（或30）行排列在海绵状的穗轴上，两颖相等，第一小花不育；雌蕊具极长而细弱下垂的花柱，俗称“玉米须”。颖果长圆柱形，成熟后超出颖片和稃片之上，黄色或红色。</p> <p>生态分布：我国普遍栽植。</p> <p>药用部分：果实、根、叶、花柱（俗称玉米须）入药，夏秋采用。</p> <p>用途：性味甘，平。玉米须能清血热，利小便。治黄疸，风热，山疹，吐血及红崩等症。用量：玉米须5~8钱作煎剂。体虚及小便多者忌用。</p>
211	玉竹	肉竹，百解药、黄鸡脚。	百合科	<p>植物形态：多年生草本。根茎横生，圆柱状，多节，淡黄色，质软，有粘液；茎直立，高约50厘米。叶互生，无柄，长椭圆形，长10厘米，宽约4厘米，基部楔形，先端尖，全缘。花绿白色，腋生1~2花，花梗长约10毫米，花被6片，雄蕊6枚，子房上位，3室。浆果球形，熟时暗紫色。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于阔叶林下以及沟谷丛林下。</p> <p>药用部分：根茎入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味甘，平。作补药。治体虚弱及多汗、多尿、遗精等。用量：3~5钱。</p>
212	玉簪	化骨莲，白玉簪。	百合科	<p>植物形态：多年生常绿草本。根茎粗壮，多丛生，高约70厘米。叶丛生根茎上，有光泽，卵圆形或卵状心脏形，长16~30厘米，宽10~20厘米，基部心脏形，先端尖，叶脉明显，侧脉8~10对；叶柄长20~30厘米。花白色，顶生总状花序，生于花茎上，叶状苞片1~2枚，长卵形，卵状披针形，长3~8厘米；花被6片，漏斗状；雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果。圆柱形。</p> <p>生态分布：产我国各地。</p> <p>药用部分：全草入药，全年可采。</p> <p>用途：性味甘、辛、寒，有小毒。解一切毒，拔牙，下骨哽，消痈肿，治吐血，解斑蝥毒。用量：根茎5钱~1两。</p>
213	玉叶金花	白纸扇，凉茶藤，白头公。	茜草科	<p>植物形态：半落叶藤状小灌木；长达2米，小枝被柔毛。叶对生，膜质或薄纸质，卵状长椭圆形或卵状披针形，长5~8厘米，宽2~3.5厘米，基部短尖，先端渐尖，表面光滑或被疏毛，背面被柔毛；托叶2深裂，裂片线状。花黄色，顶生，无柄、稠密的伞房花序，花管状，萼5裂，常一枚萼片扩大呈叶状，白色，故名“玉叶金花”，花冠漏斗状，5裂，雄蕊5枚，子房下位，2室。浆果球形。</p> <p>生态分布：产我国东部，南部至西南部；多生于山坡林边或灌丛中，村落附近丛林中也有生长，尤以赣南为常见。</p> <p>药用部分：茎、叶入药，全年可采收。</p> <p>用途：性味甘、淡，凉。能清热解表，消暑。主治流感、感冒、中暑；支气管炎、扁桃体炎、咽喉炎；肾炎水肿、肠炎泻肚；毒蛇咬伤。用量：5钱~1两，水煎服。常用作凉茶配料。</p>
214	母草	四方草，铺地草，小叶蛇针草。	玄参科	<p>植物形态：一年生草本，披散，多枝，高达20厘米，秃净或稍被疏毛。叶互生，卵形，长8~15毫米，基部阔楔尖或浑圆，先端钝或短尖，有极疏的锯齿。花紫色，单生叶腋，呈具叶的总状花序，萼5裂，绿色或淡绿色，花冠管状，略唇形，5裂，雄蕊4枚，子房上位，2室。蒴果长椭圆形或卵形，藏于宿萼内。</p> <p>生态分布：产我国南部；生于沟边湿地或水田中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味微苦、淡、凉。能清热利湿。主治细菌性痢疾，肠炎、腹泻、消化不良；毒蛇咬伤。用量：干草1~2两。鲜草4~6两，水煎服。鲜草捣烂敷毒蛇咬伤。</p>
215	冬葵	苘菜，冬芥菜，滑滑菜，奇菜。	锦葵科	<p>植物形态：多年生草本，高0.5~1米，全株有粗毛，茎圆柱形，直立。叶互生，近圆形，5~7掌状浅裂，长5~7厘米，基部心脏形，裂片先端圆钝，边缘有锯齿，两面疏被短毛，脉5~7条，叶柄长，有茸毛。花淡红色，或白色而有紫晕，丛生于叶腋，小苞片3枚，花萼5裂，花瓣5片，雄蕊多数，</p>

				<p>花丝合生，雌蕊心皮多数，分离。蒴果着生于宿存萼筒内。</p> <p>生态分布：根、子、叶、花入药，夏秋采用。</p> <p>用途：性味甘，寒。根治恶疮，淋症，小儿吞钱不出，疳疮消渴，漏胎下血，乳痈，蛇虫螫伤。子治五脏六腑寒热，妇人乳内闭肿痛，痈疽，丹石毒，妊娠下血，生产困闷，血痢疟热。用量：种子2~5钱。</p>
216	冬青	红冬青，满口红，大叶冬青，冻青树。	冬青科	<p>植物形态：常绿乔木，高达12米；树皮灰色或淡灰色，无毛；小枝具棱线。叶互生，通常狭长椭圆形或卵状长椭圆形至长椭圆形，长6~10厘米，宽2~3.5厘米，革质，基部楔形，很少圆形，先端渐尖，表面深绿色而有光泽，背面淡绿色，两面均无毛，边缘有浅圆锯齿疏生，中脉在背面隆起，侧脉8~9对，叶柄长5~15毫米。花单性异株，淡红紫色，腋生聚伞形花序，雄花序由10~30朵花组成，雌花序由3~7朵组成；花萼、花冠、雄蕊均为4枚，瓣片向外反卷、基部稍结合，子房上位，多室。核果椭圆形或近球形，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生长于常绿阔叶树林中或山坡疏林中，村落附近保育林中极为常见。</p> <p>药用部分：种子、叶、及树皮入药，叶、皮全年均可采收，种子秋冬采收。</p> <p>用途：种子性位甘，凉。能补虚祛风。用量：1钱5分~3钱。</p>
217	冬瓜	东冬，枕瓜。	葫芦科	<p>植物形态：一年生大型蔓性草本，长约6米。全体有褐色针毛，茎长粗大，近于方形；节上有分枝的卷须。叶互生，阔卵形至肾状卵圆形，长9~12厘米，5~7浅裂，边缘有锯齿，基部心脏形，先端尖，两面均有毛；叶柄长约15厘米，也有毛。花单性同株，黄色；雄花单生，具长花梗，花萼5片，叶状，反卷，花冠深5裂；雄蕊3枚，花药分离，药室弯曲成“S”形，雌花具短花梗，花萼及花冠形态与雄花相同，雌蕊1枚，子房下位，1室。果为大型瓜果，长椭圆形，果实幼时表面具针毛，老时渐次脱落，常分泌白色蜡质粉末。</p> <p>生态分布：我国各地广栽植，为常见的瓜疏。</p> <p>药用部分：果实（冬瓜），果皮（冬瓜皮），种子（冬瓜子）入药，夏秋采用。</p> <p>用途：种子性味甘，微寒。能清热消炎。治肺热，肺痈初起，肠痈未成脓。冬瓜皮性味淡，凉。能利水消肿。用量：种子2~4钱，冬瓜皮4钱~1两。</p>
218	瓜蒌	括楼，瓜蒌仁，天花粉。	葫芦科	<p>植物形态：多年生草质藤本。具白色块根，内含淀粉，故又有称为“天花粉”；茎分枝，壮健，表面有纵浅沟，光滑无毛，基部粗糙，长可达10米。叶互生，膜质，幼时近心脏形或近圆形，长8~20厘米，阔几等于长，通常5~7掌状浅裂，有时也有成深裂者，裂片椭圆形以至椭圆状披针形，先端锐形，边缘有疏齿或浅裂，表面深绿色，背面淡黄绿色，幼时两面具疏柔毛，老时下面粗糙而呈点状；叶柄长4~10厘米，通常弯曲或酌作转状，卷须4深裂，先端螺旋形。花单性异株，白色，雄花总状花序，萼长管状5裂，花冠深5裂，楔形复裂成丝状；雄蕊3枚，雌花花柱周围有退化的雄蕊，围成筒状，子房下位，1室。瓜果卵圆形以至广椭圆形，熟时呈黄褐色，光滑无毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡、林边、灌丛中，山坡草地偶见有生长。</p> <p>药用部分：瓜蒌皮、瓜蒌仁、瓜蒌根即天花粉入药，夏秋采用。</p> <p>用途：性味甘、寒。果实有润肺止咳作用，并能消渴，利尿，通乳，消肿痛，瓜蒌仁能宽胸散结，润燥滑肠。根作蛇药并止渴。用量：根3钱~4钱。瓜蒌仁2~6钱，果壳2~4钱。</p>
219	瓜子金	金钥匙，小英雄，散血丹，散血草，肥儿郎，远志草，小远子。	远志科	<p>植物形态：多年生常绿草本，高可达23厘米。茎基部木质，多分枝，匍匐，斜升或近于直立。叶互生，椭圆形至卵形或广披针形，长1~2.5厘米，宽3~12毫米，全缘，基部圆形或楔形，先端短尖，有短柄，柄及叶脉上都有细柔毛，花瓣白色，腋生总状花序，长1~3厘米，萼5片，两侧2片卵</p>

			<p>形，花瓣状，花后增大，果时常长达10毫米，其余3片披针形，花瓣3片下部愈合呈鞘状，子房上位，倒卵形而扁，2室。蒴果广卵圆形而扁，先端微凹，边缘有膜质宽翅。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于疏林下、山坡、路旁、荒野和田埂上。</p> <p>药用部分：根或全草供药用，春季采收。</p> <p>用途：根性味甘、苦，寒。为强心、祛痰剂，并有安神之效。全草能疏风透表，祛痰止咳，消炎散毒。用于治支气管炎及心悸失眠，记忆力减退等症，麻疹不透，毒蛇咬伤，跌打损伤。用量：全草3钱~7钱，根1~3钱。</p>
220	瓜馥木	钻山风，铁牛钻石，香藤，毛瓜馥木。	<p>番荔枝科</p> <p>植物形态：常绿缠绕性木质藤本，长可达8米；小枝被黄褐色柔毛。叶革质，倒卵状椭圆形或长圆形，长6~12.5厘米，宽2~4.8厘米，基部楔形，先端圆或微凹，稀为急尖，表面无毛，背面中脉上北疏毛，侧脉16~20对；叶柄长约1厘米。花1~3朵集成密伞花序，萼3片，基部合生，花瓣6片，排成2轮，雄蕊多数，心皮多数，分离。果为浆果状，长10~20个聚生成球形的聚合果酱，径达7厘米，果皮被黄棕色绒毛，味甜可食，果皮稍带辛辣味。</p> <p>生态分布：产我国南部及西南部各省；多生于沟谷常绿叶树林边或溪边丛林中，井冈山，九连山一带极为常见。</p> <p>药用部分：根入药，全年可采收，以秋冬季最适宜。</p> <p>用途：根供治坐骨神经痛和关节炎用。</p>
221	龙葵	天茄子，天泡草，野辣椒树子，野辣椒，飞天龙，苦葵。]	<p>茄科</p> <p>植物形态：一年生草本，高30~69厘米。茎直立或下部偃伏，有棱角，疏生细柔毛。叶互生，卵形，长5~9厘米，宽3~4.5厘米，但差异很大，基部阔楔形，基脚下延至叶柄，先端尖或长尖，边缘有波状疏齿，表面深绿色，背面淡黄色，两面沿主脉及侧脉有稀毛；叶柄长1.5~4厘米，无毛或疏生细毛。花白色，成侧生伞形总状花序，花柄下垂， 萼圆筒形，5裂，花冠状圆筒形，5裂；雄蕊5枚，着生花冠筒上；子房上位，2室。浆果球形，熟时紫黑色。</p> <p>生态分布：产我国南北各省，多生于田边、落边、沟边、荒地及庭园湿地。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、平，有小毒。散血消肿、清热解毒。又治痢疾，扁桃腺炎，疔疮等。用量：3钱~1两。茎、叶捣烂，每斤加水1斤，浸泡5~6小时，过滤，滤液每斤加水2~3斤喷酒，对棉蚜、红蜘蛛防治效果达60%。</p>
222	龙牙草	金鸡抱蛋，老金丹，脱力草，路边黄，仙鹤草，瓜香草，黄龙尾，毛鸡脚，鸡毛草，子不离草，子母草，毛脚茵。	<p>蔷薇科</p> <p>植物形态：多年生草本。根入土甚深，基部木质，上部分枝，高达90厘米，枝具条纹或有棱角，棕绿色至红棕色；全株具白色长毛。叶互生，奇数羽状复叶，具斜卵形叶状托叶2片，抱茎，长7~18厘米；小叶大小不等，大的为长椭圆状披针形，长4~5厘米，宽约2厘米，边缘具齿牙或深裂，基部楔形或圆形，先端尖。花黄色，顶生总状花序，花萼下部呈筒状，上部5裂，萼筒上部具钩刺；花瓣5片，花盘着生萼筒口边，雄蕊10枚，着生于萼筒口；雌蕊1枚，子房半下位，2室。瘦果，花柱及萼均宿存，具钩刺。</p> <p>生态分布：产我国南北各地，多生于山坡林边、疏林下以及沟谷湿地，路边草丛中。</p> <p>药用部分：全草、根入药，7~8月采收。</p> <p>用途：性味苦、涩，温。有止血，强心，强壮，止痢及消炎作用。治脱力劳乏，妇人月经不调，红崩白带，胃寒腹痛，赤白痢疾，吐血，咯血，肠风、尿血、子宫出血，十二指肠出血等症，全草提取仙鹤草素为止血药。用量：3~5钱。</p>
223	龙胆草	胆草，龙须草，小叶合掌消，龙胆。	<p>龙胆科</p> <p>植物形态：多年生草本，根稍肥厚，茎直立，高30~80厘米。叶对生，披针形，至三角状卵形，长2.5~8厘米，宽6~25厘米，基部圆形，先端渐尖，无柄，3主脉，边缘反卷。花蓝色，单生，顶生聚伞花序，萼、花冠、雄蕊均为5数、雌蕊1枚，子房上位，1室。蒴果卵圆形，有柄。</p>

			<p>生态分布：产我国北部至长江流域各省；多生于向阳山坡的荒山草地上。</p> <p>药用部分：根（龙胆）入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、寒。能泻肝胆实火，清下焦湿热，并有驱风功效。治寒热惊痫，协痛目赤，咽痛，口苦及痢肿，囊肿，阴痒等。用量：1~3钱。</p>
224	龙须藤	玉桂菊花心，钩藤，穿心菊，过江龙，九龙藤，血龙，羊蹄藤，燕子尾，乌藤，罗亚多藤，乌郎藤。	<p>云石科、苏木科、豆科。</p> <p>植物形态：落叶木质藤本，长可达10米，嫩枝叶背和花序疏被锈色短柔毛。叶互生，卵形或心形，有5~7条纵脉，基部心形，基凹入度不到5毫米，长2.5~11.5厘米，宽2~9厘米，顶部2裂，裂片为全叶的三分之一，或竟至不裂，少有裂至全叶二分之一，裂片钝；卷须不分枝，和叶对生。花白色，总状花序和叶对生，长4~20厘米，花蕾被白色短柔毛，萼、花瓣均5裂，能育雄蕊3个，不育雌蕊2个，子房有柄，有毛沿腹缝绒毛较密，其余部分较稀。荚果扁，多毛，长约7.5厘米，宽7.5厘米，有3~5颗种子。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于沟谷林边或灌丛中，尤以南部为多。</p> <p>药用部分：根、茎药用，全年可采。</p> <p>用途：性味苦、涩，微凉。活血、祛风、补脾、健胃。治风湿关节炎，跌打瘀积，小儿疳积，胃痛。用量：5钱~1两。</p>
225	东风菜	土苍术，钻山沟，白云草。	<p>菊科</p> <p>植物形态：多年生草本，高1~1.5米，茎、叶均极粗糙，茎直立，圆形，基部较光滑，上部有毛，嫩枝的顶端毛较密或无毛，茎中部有时略带红色。叶互生，基叶心脏形，长8~16厘米，宽5~14厘米，表面绿色，背面灰白色，边缘有粗锯齿或重锯齿，两面有短毛，柄长3~12厘米；叶片上常生有无性繁殖芽，实为一种虫瘿；茎上部叶较小，卵状三角形或卵状披针形，基部心脏形或截形、楔形，先端尖，两面有毛，柄较短。花白色，有舌状和管状花，顶生总状的多数头状花序；总苞半圆形，白色。瘦果长椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国中部各省；多生于山坡林边及溪谷灌丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、寒，无毒。能疏风，祛湿，行气，健脾，消食。治风毒壅热，头痛，目眩，肝热眼赤，骨节疼痛，寒痧腹痛。用量：根5钱~1两。</p>
226	刘寄奴	六月雪，奇蒿，六月霜。	<p>菊科</p> <p>植物形态：多年生半常绿草本，高60~120厘米，直立。叶互生，下部叶密被白色柔毛，开花时凋落，中部叶卵状披针形，长7~10厘米，宽3~4厘米，基部渐窄，先端渐尖，叶柄短，边缘具锐尖齿，表面绿色，背面色较淡或呈灰白色，有细毛；上部叶渐小，披针形。花白色，头状花序钟形，花托平坦，着生约十朵雌花及两性的管状花。瘦果圆柱形。</p> <p>生态分布：产我国中部，南部至西南各省；多生于山坡林边、疏林中，灌丛边或山坡路边。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、温。能破血通经，除症消肿，心腹结痛，月经不调，金疮出血。铜鼓常用的三味药（刘寄奴、盐肤木、贼骨头）之一。全草煎水治高烧和便秘。用量：1钱5分~3钱。</p>
227	玄参	水萝卜，八稜麻，黑参，元参，野脂麻。	<p>玄参科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达1.2米，根圆柱形，长5~12厘米，下部常分叉，外皮灰黄褐色。茎直立，四棱形，光滑或有腺状柔毛。叶对生，卵形或卵状椭圆形，长7~20厘米，宽3.5~12厘米，基部圆形或近截形，先端渐尖，边缘具钝锯齿，背面有稀疏散生的细毛。花暗紫色，顶生圆锥状聚伞花序，花梗有明显的腺毛，萼5裂，花冠壶状，5裂，雄蕊4枚，2强，退化雄蕊1枚，子房上位，2室。蒴果卵圆形，萼宿存。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至陕西，福建等省；多生于沟谷丛林边或溪边湿地。</p> <p>药用部分：根入药，秋采收。</p> <p>用途：性味苦、咸，微寒。为解热消炎药。可治烦渴热病，瘰癧及咽喉肿痛，便秘诸症。用量：1~5钱。</p>
228	仙茅	千年棕，独脚丝茅，茅参，独茅，笔筒消，山棕，地棕。	<p>仙茅科，石蒜科。</p> <p>植物形态：多年生草本。根茎圆柱形，灰褐色，常延长，无地上茎。叶丛生，3~6枚，长15~30厘米，宽3~20毫米，先端尖，基部有长柄，全缘，两面常有散生软毛；脉平行，3~7条，显明。花黄色，杂性，花茎极短，隐藏于叶鞘内；下部的为两性花，其他为雄花；花被6片，雄蕊6枚，花</p>

				<p>丝短；子房下位，3室。浆果，有长喙。</p> <p>生态分布：产我国南部，西藏及长江南部各省；多生于荒山草地及山坡杂草丛中。</p> <p>药用部分：夏秋季采根晒干药用。</p> <p>用途：性味甘、辛，温。有小毒。根为强壮药，浸酒服。治神经衰落，阳痿，遗精，步行无力，老人失溺等。用量：1~5钱。</p>
229	仙人掌	火焰，玉芙蓉，霸王树。	仙人掌科	<p>植物形态：常绿灌木。茎下部稍木质，近圆柱形，长达20厘米，光亮，散缀五点排列的小瘤体，每一小瘤上丛生黄褐色，长约1.2~2.2厘米的利刺和无数短刺毛。叶小，圆形而尖，青或紫色，生于每一小瘤体的刺束之下，早凋。花黄色，径7厘米，单生或数朵聚生于顶节的边缘；萼片、花瓣多数，雄蕊多数，数轮排列；子房下位，1室，柱头6裂。浆果紫红色，长5~7厘米，无刺。</p> <p>:药用部分：根及全株入药。全年可采。</p> <p>用途：性味甘，平。为健胃，滋养，强壮剂。有补脾，镇咳，安神。治心胃气痛及消蛇伤浮肿等功用。用量：5钱~1两。</p>
230	仙人球	仙人拳。	仙人掌科	<p>植物形态：多年生常绿肉质草本。茎节球形或椭圆形，绿色，有纵棱12~14条，棱上有丛生的针刺，通常每丛10枚，叶通常细小，生于刺丛内，早凋；花大形，红色，着生于纵棱刺丛中。</p> <p>生态分布：我国有栽培。</p> <p>药用部分：全草入药，全年可采用。</p> <p>用途：性味甘，平。能消肿止痛。行气活血，祛湿退热，生肌。</p> <p>用量：5钱~1两。</p>
231	叶下珠	叶下珍珠，珍珠草，叶后珠，日开夜合，夜合草。	大戟科	<p>植物形态：一年生小草本，高可达40厘米。茎直立，分歧，通常赤红色。叶小形，2列式互生，极似羽状复叶；叶片长椭圆形，长5~18毫米，宽2~6毫米，基部圆形，先端尖或钝，叶背灰白色，叶柄短或近于无柄。花单性，细小，赤褐色，雄花2~3朵，腋生，萼片6枚，雄蕊3枚，花丝愈合，雌花单生，雌蕊由3心皮合成，子房上位，3室。蒴果扁球形，表面有细鳞状凸生物，红棕色，无柄。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡灌丛草地或田野上，村落园庭中也有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味淡、凉。治暑热腹泻，红白痢疾，肝炎，黄疸，病后眼胀痛或目起云雾等症。用量：5钱~1两。</p>
232	长春花	雁来红，日日新。	夹竹桃科	<p>植物形态：常绿多年生草本或亚灌木，高达60厘米，茎直立有分枝，秃净或稍被毛。叶对生，长椭圆形，长2.5~5厘米，宽2~3厘米，基部渐狭而成短柄，全缘，两面光滑无毛。花紫红色或粉红色，单生或成对生于叶腋，萼小，5裂，花冠高脚碟状，5裂，雄蕊5枚，子房上位，2分离心皮，各1室。骨突果2枚，圆柱形。</p> <p>生态分布：我国南部栽培，在海南岛已归化为野生植物。</p> <p>药用部分：全草入药，全年可采。</p> <p>用途：性味微苦、凉。镇静安神，平肝降压。主治高血压和癌症。用量：2~3钱。</p>
233	长叶紫珠	黄紫珠，劳米氏紫珠，野枇杷根。	马鞭草科	<p>植物形态：落叶灌木，高可达3米；小枝及嫩幼部分密被褐色柔毛。叶对生，长圆形至长椭圆状披针形，长12~22厘米，宽4~7厘米，基部钝楔形，先端锐尖，上半部边缘有锯齿，下半部近全缘，表面稍平滑，脉上常有毛，背面密被黄褐色茸毛，侧脉10~14对，叶柄粗，长1~2厘米密被茸毛。花紫红色，腋生聚伞花序，萼锥状4裂，花冠筒状，4裂，雄蕊4枚；子房上位，4室。核果球形，淡紫色藏于宿萼内。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于山坡、林边灌丛中或疏林中。</p> <p>药用部分：根入药，春冬季采。</p> <p>用途：治疗慢性风湿关节炎及肌肉风湿症。</p>
234	长叶冻绿	土黄柏，癩痢根，黎辣根，黄药，琉	鼠李科	<p>植物形态：落叶灌木，高1.5~3米。小枝与叶幼时有锈色细毛，逐渐光滑，茎褐色。叶互生，椭圆状倒卵形或披针状长卵圆形，长4~8厘米，宽1.4~3.5</p>

		璃根，茜木叶，黎罗根，黎头根。		<p>厘米，基部楔形，先端尖，边缘有细锯齿，叶面深绿色，背面淡绿色，叶脉有赤褐色短毛，背面主脉及侧脉突出明显；叶柄长0.4~1厘米，密被细短毛。花黄绿色，腋生聚伞花序，花萼、花瓣、雄蕊均为5枚，子房上位，2~4室，与花盘离生。核果近球形，初绿色，熟时变黑色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部和西南各省；多生于山坡疏林或林边灌丛中。</p> <p>药用部分：全株入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、温，有毒。能祛风杀虫，去痹湿。用量：1~3钱，内服大量不超过5钱。</p>
235	冻绿	红冻	鼠李科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高达4米；小枝灰色，无毛，通常不具棘刺。叶互生，椭圆形或长椭圆形，长5~18厘米，宽2.5~7厘米，基部楔形，先端渐尖或短尖，边缘有细锯齿，干时黄绿色，无毛或背面沿叶脉有带黄色细毛，叶柄长5~12毫米。花黄绿色，单生而集生于新枝基部；萼片、花瓣、雄蕊均4枚，子房上位，近球形，柱头2~3裂。核果浆果状，黑色，倒卵状球形。</p> <p>生态分布：产我国河南至长江流域各省；多生于河畔灌木丛中及山坡疏林中。</p> <p>药用部分：果实、根皮或树皮供药用，夏秋可采收。</p> <p>用途：果实和皮供药用，为缓下利尿剂，民间用根皮及树皮治发疹及跌打损伤。根及皮中含多量绿膏色素是唯一的天然绿色染料。用量：根皮或树皮3~7钱。</p>
236	丝瓜	木瓜，布瓜，天络，蜜瓜。	葫芦科	<p>植物形态：一年生攀援性草质藤本，长可达10米。茎有纵棱及细柔毛，节上有分枝的卷须。叶互生，圆心脏形，长12~30厘米，叶缘5~7裂或小裂，先端尖锐，表面深绿色，两面均光滑无毛，有长柄。花黄色，淡黄至白色，单性，雄花先开，雄花序总状，多生于主蔓上；雌花后开，单生，多生于枝蔓上，均生于叶腋，花萼、花冠、雄蕊均5枚，雌蕊1枚，子房下位，1室，侧膜胎座。瓜果长筒形。</p> <p>生态分布：产我国南部，全国各地均有栽植。</p> <p>药用部分：根及瓜络入药，夏末秋初采收。</p> <p>用途：性味甘、寒，无毒。能通经，清热，止血，通乳，消肿。治肺热，食积，黄疸，肠风下血及痔漏等症。用量：瓜络2~4钱，作煎剂或酒剂。</p>
237	丝棉木	桃叶卫矛，杜仲。	卫矛科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高约6米。树皮灰色或灰褐色，小枝细长，灰绿色，略呈4棱，皮部有白色棉胶，似杜仲胶状，幼枝疏生柔毛。叶对生，椭圆状卵形至卵形，偶有倒卵形，长4~10厘米，宽2~6厘米，顶端渐尖，边缘具细锯齿，基部楔形或近圆形，两面绿色，无毛，叶柄长1~3厘米。花黄绿色，腋生聚伞花序，花萼、花瓣、雄蕊均4枚，子房与花盘连合，上位，4室。蒴果四棱，成熟时4瓣裂，露出有桔红色假种皮的种子。</p> <p>生态分布：产我国东北，北部至中部各省；多生于山坡林缘，山麓，溪边，路边。</p> <p>药用部分：根、树皮入药，夏秋冬季均可采用。</p> <p>用途：治膝关节酸疼。种子可榨油供照明用。</p>
238	决明	假花生，假绿豆，草决明。	云实科，豆科。	<p>植物形态：直立、粗壮，一年生亚灌木状草本，高1米内外，有恶臭气味。叶互生，偶数羽状复叶，总轴在小叶间有腺体似线形，托叶线状锥尖，早落；小叶6枚，膜质，倒卵形或长椭圆状倒卵形，长3~6厘米，先端钝而有小锐尖，表面近秃净，背面被柔毛。花假蝶形，鲜黄色，腋生成对，生于最上部的聚生；萼和花瓣均5枚，雄蕊10枚。荚果近四棱形，细长而弯。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于村落，城镇附近荒地上。</p> <p>药用部分：10~11月采种子入药。</p> <p>用途：性味咸、平，无毒。清肝益肾，祛风明目，润肠通便。用量：1钱5分~3钱。</p>
239	冰糖草	野甘草，土甘草。	玄参科	<p>植物形态：多年生草本或亚灌木，高达80厘米。叶对生或轮生，披针形至椭圆形或倒卵形，长5~20毫米，基部渐尖而成短柄，先端短尖，边缘</p>

				<p>有锯齿。花白色，单生或成对生于叶腋，萼4~5裂，花冠轮状，4裂，雄蕊4枚，子房上位，2室。朔果卵形至球形。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于城镇及村落附近湿地。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、凉。能清热利湿。主治感冒发热，肠炎腹泻，脚气水肿，皮肤湿疹，小便不利。用量：5钱~1两。</p>
240	朴树	小叶牛筋树。	榆科	<p>植物形态：落叶乔木，高达20米。树皮呈灰褐色，粗糙而不开裂；嫩枝略带淡红色，密生短毛，皮孔明显。叶互生，阔卵形至卵状椭圆形，长4~10厘米，宽2~5厘米，基部圆形或阔楔形，偏斜，先端急尖，边缘中部以上具粗圆锯齿，嫩叶两面有毛，后即脱落，表面深绿色，背面淡绿色，脉上疏生细毛，基部三出脉，侧脉疏生，不达边缘向上弯；叶柄长5~8毫米，被柔毛。花黄绿色，杂性同株，生于当年新枝的叶腋，雄花2~3朵聚生于枝的基部，花被4片，雄蕊4枚，雌花1~2朵生于新枝上部，花被4片，雌蕊1枚，花柱2裂，子房上位，1室。核果球形，熟时红褐色。</p> <p>生态分布：产我国长江中下游各省至两广、福建等地；多生于村落郊野、路旁、溪边、河岸等处。</p> <p>药用部分：根皮入药，秋冬采收。</p> <p>用途：治腰疼，漆疮。</p>
241	灯心草	龙须草，灯心蒿，水灯心，碧玉草，虎须草。	灯心草科	<p>植物形态：多年生草本。根茎横生，节间短；茎丛生，绿色，圆柱状，高30~90厘米，直径2~4毫米，有细纵条纹。无叶，茎部有淡黄色或暗褐色叶鞘数枚。花绿色，花多数密聚成头状花序或为具不等分枝的聚伞花序，生于近顶端的茎侧边，花被6片，雄蕊3枚，很少6枚，子房上位，3室。蒴果椭圆形，3瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于溪边，沟边湿地。</p> <p>药用分布：根、全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、淡、微寒。为利尿药，有清凉镇静之功。能利尿通淋，治喉头炎，咳嗽等症。灯芯草切碎，煎汤代茶常服治失眠心烦。用量：连皮全草5钱~1两，髓部3~8分。</p>
242	竹叶草	水竹叶	鸭跖草科	<p>植物形态：浅水生多年生草本。须根发达；茎丛生，横卧，肉质，节处生不定根，节间微带紫色，分枝多。叶互生，线状披针形，长3~10厘米，宽1厘米许，基部有叶鞘抱茎，表面深绿色，背面两侧具有紫色斑点，全缘。花蓝紫色，顶生或腋生聚伞花序，花被6片，排成2轮，内轮花冠状，雄蕊6枚，其中2枚发育，子房上位，3室。果为蒴果。</p> <p>生态分布：产我国长江流域或至南部各省；多生于沟谷浅水中或田边水沟中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、淡、平，无毒。能清肺热，行血，消肿毒。治咳嗽吐血。用量：1~5钱。</p>
243	竹叶椒	山胡椒，花椒，万花针，野花椒，木本飞天蜈蚣，竹叶总管，臭胡椒，四两麻，麻总管，三叶花椒，川花椒。	芸香科	<p>植物形态：常绿灌木，高可达4米。枝光滑，刺对生扁长而知，基部扁阔，长0.5~1.5厘米。叶互生，奇数羽状复叶，略为革质并有透明油腺点；小叶3~5枚，广披针形或狭长椭圆形，长3~10厘米，宽1.5~2.5厘米，两端尖，全缘或有微细锯齿，顶端小叶较大，两面无毛，基部下延成狭翅。花单性，黄绿色，腋生聚伞状圆锥花序，花被、雄蕊6~8枚，分离心皮2~4枚，子房上位，各1室。果球形红色，表面具疣点。种子黑色，有光泽。</p> <p>生态分布：产我国中部、东南部及西南各省；多生于山坡林边灌丛中，荒山、村落附近也常有生长。</p> <p>药用部分：根、树皮、叶、果实及种子入药；根、树皮、叶全年可采，果实及种子宜秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能祛风，行气，清热，利湿，止泻，杀虫。治胃痛，关节炎，毒蛇咬伤，并有麻醉作用。用量：根1~3钱。</p>
244	竹节人参	峨三七，竹节三七，罗汉三七，竹节参，土参。	五加科	<p>植物形态：多年生草本。茎直立，单生，连花序高50~80厘米，根茎横走地下，肉质肥厚，灰黄白色，有节，形似竹鞭。叶为掌状复叶，3~5片轮生于茎端，小叶常5片，有短柄，小叶片卵形，倒卵形或披针形，中间小</p>

				<p>叶较大，长10~30厘米，宽2~7厘米，先端长锐尖，边缘有不整齐的齿。花淡黄色，顶生伞形花序。萼5片，花瓣5片，雄蕊5枚，与花瓣等长，子房下位，2室。浆果，扁球形，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国中部至长江中游和西南各省；多生于深山林阴下或沟谷中。</p> <p>药用部分：秋季采根茎入药。</p> <p>性味微苦、温，无毒。作解热，健胃和祛痰药。治慢性消化不良，习惯性便秘等。亦作强壮滋补药，并有止血疗伤作用。用量：2~3钱。</p>
245	伏地堇	黄花草，黄瓜菜，野薄荷，细通草，牙瓜藤，毛毛香，天井草，匍伏堇，地丁香。	堇菜科	<p>植物形态：一年生草本，全株被白色柔毛。茎匍匐地面，随处生根，从生基部，卵圆形或卵状椭圆形，长2~6厘米，宽1.5~3厘米，基部渐狭，延成为翅，先端圆钝或尖，边缘具锯齿；叶柄长1.5~5厘米，托叶离生，狭长披针形，边缘有锯齿。花白色，腋生，有长5~9厘米的花茎，且花茎中部有苞片2枚；萼片、花瓣、雄蕊均5枚，花瓣下面一枚最大，基部有距；子房上位，1室。蒴果，长椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部，多生于坡地、耕地、溪边、疏林下及路边半阴湿处。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味酸、寒，无毒。消肿退热，生肌接骨，排脓解毒。治瘰癧，疗毒，对口疮，目生翳，脐风等，用量：3~5钱。</p>
246	地锦	乳汁草，散血草，血剑草，地蓬草，野马苋，小马苋，红乳草，红线草，铺地草，千叶草，仙桃草，奶浆草。	大戟科	<p>植物形态：一年生平贴地面的匍匐草本。茎纤细，多叉状分枝，蔓延扩展；枝柔细，绿色带紫红色，疏被细柔毛，折之有白色乳汁。叶通常对生，间或有互生，长椭圆形，长0.4~0.6厘米，宽0.2~0.3厘米，基部偏斜，先端圆钝，边缘有细锯齿，叶柄短。花单性，淡紫红色，腋生的鸟巢花序（杯状聚伞花序），总苞内有数朵由一雄蕊形成的雄花及1朵由1雌蕊形成的雌花，子房上位，3室。蒴果扁卵形，3裂。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。多生于路边、湿地、城镇，村落庭院湿地常见有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋季收。</p> <p>用途：性味微苦，平。能通流血脉，散气止血，下乳汁，利小便。治痢疾、湿疹、疖疮、乙型脑炎、尿血等。用量：3钱~1两。</p>
247	地榆	小土参，野升麻，红地榆，岩地芩，血箭草。	蔷薇科	<p>植物形态：多年生草本，高1~2米。宿根长大，肥厚。茎直立，表面绿色或带紫绿色，具纵细棱及浅沟。叶互生，奇数羽状复叶，根生叶斜上，通常较茎生叶为大，小叶5~19片，长椭圆形以至线状长椭圆形，长2~7厘米，宽0.5~1.5厘米，基部近于截形或稍成心脏形，先端钝，边缘有尖圆锯齿，表面暗绿色，背面淡绿色；根生叶有长柄，茎生叶近于无柄，基部两侧膨大苞茎，两侧有托叶各1片环抱半圆形，边缘有锯齿。花暗紫红色，顶生倒卵圆形或圆柱形穗状花序，花梗很长，由花序顶端向下开放，苞片2枚，花萼4裂，花瓣状，无花冠，雄蕊4枚，子房上位。瘦果，卵状四角形。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于荒山草地、田边及村落附近。</p> <p>药用部分：根药用，7~8月采收。</p> <p>用途：性味苦、微寒，无毒。能凉血、止血。治吐血，衄血，肠风下血，热痢，痔瘕，血崩等症。用量：1钱5分~5钱。</p>
248	地肤	扫帚菜	藜科	<p>植物形态：一年生草本，高达1.5厘米。向上呈扫帚状多分枝，具细条纹，绿色或淡紫色，秋季常变为红色，被短毛，下部光滑。叶互生，线状披针形，长3~6厘米，扁平，基部渐狭成柄状，具3纵脉，先端渐尖，常具纤毛，全缘而具毛。花杂性，黄绿色，丛生于叶腋，排列成穗状花序，花被5裂，内曲，背部近端有绿色隆脊及横生的龙骨状突起，在花开后发育成为翅，排成星状而包被着果实，雄蕊5枚，子房上位，1室。胞果扁球形。</p> <p>生态分布：产我国黄河流域各省。</p> <p>药用部分：果实、全草供药用，9~10月采收。</p> <p>用途：性味甘、苦、寒。为收敛性利尿药，并有消炎之功。治膀胱炎，</p>

				尿道炎，淋病，小便不利，脚气，水肿，颜面及皮肤丹毒，湿疹，瘙痒等症。用量：果实1~5钱。
249	地念	白骨草，地茄子，地兰子，山地茄，盘地蜈蚣，地落苏，菠萝草，铺地锦。	野牡丹科	植物形态：多年生披散或匍匐状亚灌木状草本，枝秃净或被疏生粗毛。叶对生，卵形，倒卵形或椭圆形，长1.2~3厘米，宽8~20毫米，基部浑圆，先端短尖，3~5主脉，除表面边缘和背脉上薄被疏生粗毛外，余均秃净，叶柄长2~4毫米，被粗毛。花紫红色，1~3朵生于枝梢，萼、花瓣均5数，雄蕊10枚，子房下位，5室。浆果球形，熟时紫色，被粗毛。 生态分布：产我国东南部；多生于荒山草地，林边或灌丛边湿地。 药用部分：根及全草入药，夏秋采收。 用途：性味酸、甘，平。能止血，活血，解毒，健脾，除湿热。治菌痢，腰腿痛，风寒湿痹。用量：5钱~1两。
250	地黄	天黄，人黄，野地黄。	玄参科	植物形态：多年生草本，高20~30厘米。全体密被灰白色长柔毛及腺毛，根茎肉质肥厚，鲜时黄色，粗细长短不一，茎单一或由基部分生数枝。叶通常丛生于茎的基部，倒卵形以至长椭圆形，先端钝，边缘具不整齐钝齿，长2~7厘米，宽1~3厘米，表面有皱纹，基部渐狭成长叶柄，腺毛于边缘脉上分布较密。花紫红色，顶生总状花序，密布腺毛，花柄基部有线形苞片1片，萼钟状，5裂，花冠筒状略为唇形而微弯，5裂，雄蕊4枚，子房上位，2室。蒴果卵圆形，上有宿存花柱，外有宿萼。 生态分布：产我国东北、内蒙、华北至长江下游等地。 药用部分：根茎供药用，在8~9月采收。 用途：生地黄性味甘、寒，无毒。熟地黄（经炮炙）性味甘，微温。熟地能补血强壮；生地为清热凉血剂。用量：生地2~4钱。
251	地胆草	豆仔根，毛刷子，铁灯柱，地胆头，磨地胆。	菊科	植物形态：一年生贴地草本，连花茎高可达60厘米，多少粗糙，有时全体被白色粗毛，毛紧贴，茎2歧分枝，枝少而硬。叶多根生而贴地，匙形或长椭圆状披针形，长5~10厘米或更长，基部渐狭，先端钝或短尖，边缘稍具钝锯齿，茎生叶少，极小。花淡紫色，顶生头状花序，约有小花4朵，成束，为3枚叶状苞片所包围，头状花序在一束花内多个。瘦果有棱，具4~6枚长而硬的刺毛。 生态分布：产我国南部各省；多生于山坡草地、河岸、路边。 药用部分：7~9月采全草或根入药。 用途：性味辛、苦、寒。能清热，解毒，止咳，利尿。治感冒，菌痢，喉炎，蛇咬伤等，孕妇慎用。用量：5钱~1两。
252	地耳草	田基黄，小叶对口莲，金钥匙，小王不留行，观音莲，女儿红，小元宝等。	金丝桃科	植物形态：一年生草本，高可达40厘米。红色或红绿色，有须状根。茎直立或倾斜，4棱，近地节上着生不定根。叶对生，卵形，长椭圆形，长0.3~1厘米，宽0.2~0.4厘米，基部3脉，稍抱茎，先端钝，全缘，表面有黑色斑点。花黄色，顶生聚伞花序，萼、花瓣均5枚，雄蕊多数，束生，子房上位，1室。蒴果，长圆形，萼宿存。 生态分布：产我国南部；多生于山坡、草地、田边，村落附近。 药用部分：全草入药，夏秋采收。 用途：性味苦、甘、平。能清内热，利肝胆，破瘀，解毒，消炎，杀虫。用量：5钱~1两。
253	地瓜儿苗	泽兰，地笋，甘露子。	唇形科	植物形态：多年生草本，高达1.2米。地下茎匍匐，膨大，纺锤状，肉质肥厚，断面乳白色，节间短，微下陷，近地面茎通常匍匐，节上生不定根，茎上部直立，方形，4棱，中空，棱上及节上有细粗毛，通常绿色，微带紫红色，茎下部木质化，紫红色至紫绿色。叶对生，广披针形，长3~15厘米，宽1.5~4厘米，基部楔形，先端锐或渐尖，边缘具锐齿或杂有粗锯齿，表面深绿色，两面被茸毛，密集于主脉，有腺点。花白色，轮生于叶腋，萼钟状，5裂，花冠唇形，上唇3浅裂，下唇2裂，下唇较上唇长，雄蕊2枚，退化雄蕊2枚，子房上位，4裂。瘦果4个，秃净，扁平。 生态分布：产我国南北各省；多生于山谷林下阴湿处及山野或溪边湿地。 药用部分：全草入药，秋季采收。 用途：性味苦，微温。能活血，调经。用量：1钱5分~5钱。
254	百合	喇叭筒，百公花，	百合科	植物形态：多年生草本，高0.7~1.5米。鳞茎淡白色，有扩展的鳞片，直

		百花，山大蒜，滤野百合。		<p>径5~7.5厘米，茎直立，平滑，多少带紫色。叶散生，多数披针形至椭圆状披针形，长7~10厘米，宽1.3~2厘米，基部渐狭，先端尖，全缘。花白色，外带紫晕，1~4朵生于茎端，花被喇叭状，6裂，裂片长15~20厘米，基部有蜜腺槽，雄蕊6枚，花药紫色，花丝纤弱，花柱极长，柱头3裂。蒴果，3室，种子多数。</p> <p>生态分布：产我国中部各省。</p> <p>药用部分：鳞茎入药，秋季采集。</p> <p>用途：性味苦，微寒，无毒。为滋养强壮性镇咳祛痰药，对肺结核、慢性、干性支气管炎有滋养、缓和止咳之功，并有清凉退热作用。用量：2~4钱。</p>
255	百部	婆妇草	百合科	<p>植物形态：多年生蔓性草本，具丛生的纺垂形块根。茎绿色，表面具纵纹，长可达90厘米，节间约10厘米左右，全体平滑。叶4片轮生，间或2片对生，卵形至广披针形，长5~7厘米，宽2~2.5厘米，基部圆形或楔形，先端尖或渐尖，全缘，微带波状，弧形脉5~9条；叶柄长约2厘米，基部稍阔，表面下陷。花淡绿色，着生于叶片中肋中部，花被4片成轮，每片有弧形脉5条；雄蕊4枚，子房上位，1室。蒴果，扁卵形，紫褐色。</p> <p>生态分布：产我国北部，中部，东南部各省。多生于山坡林边，灌丛中及山坡草地。</p> <p>药用部分：块根入药。秋季采集。</p> <p>用途：性味甘、苦，微温，有小毒。能润肺，下气，镇咳，杀虫，去头虱。用量：1~3钱。</p>
256	百两金	野猴枣，珍珠伞，凉伞树，逃山虎，珍珠凉伞，土丹皮，开喉箭，八爪金龙。	紫金牛科	<p>植物形态：常绿小灌木，高可达50厘米。茎分枝稀少，表面光滑无毛，灰褐色，有细纵纹。叶互生，披针形或广披针形，长9~20厘米，宽1.5~5厘米，基部阔楔形，先端渐尖，边缘近于全缘或作微波状或稍背卷，薄革质，表面深绿色，背面淡绿色，平滑无毛，叶脉在背面突起，具叶柄，长8~15毫米。花紫红色，腋生，伞房花序，萼5裂，花冠钟状，5深裂，雄蕊5枚。雌蕊1枚，子房上位，1室。核果球形，熟时红色，光滑，有赤褐色斑点，具宿萼及花柱基部。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省。多生于常绿阔叶林下以及杉木林下。</p> <p>药用部分：秋季采其根入药。</p> <p>用途：性味苦、平，作祛痰药，并治咽喉肿痛。浸酒治跌打损伤。孕妇慎用。用量：3~5钱。</p>
257	百蕊草	青龙草。	檀香科	<p>植物形态：多年生半寄生草本。根白色，发育不完全，有小瘤。茎直立，纤细，通常数支丛生，高达60厘米。叶互生，线形，肉质，全缘，长0.5~2.5厘米，宽约1毫米。花绿色，单生于叶腋，下面有2个叶状线形苞片；花被4~5片，雄蕊4~5枚，子房下位，1室。核果球形。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部各省；多生于荒山草地及路边草地中。</p> <p>药用部分：全草及茎、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、涩，温。补虚，益肾，解毒，调血气。茎、叶煎服，治头疮及颈淋巴腺炎等。用量：全草5~6钱。</p>
258	红花	红兰花，黄兰，红花尾子。	菊科	<p>植物形态：一年生或二年生草本，高达90厘米。全株净秃，茎直立，绿白色，表面具细浅槽。叶互生，卵形或阔卵状披针形，长4~9厘米，宽1~3.5厘米，基部渐狭，先端尖，几无柄，抱茎，边缘具不规则浅裂，裂片先端成尖刺状；茎上部叶边缘较整齐，两面平滑无毛，深绿色，背面主脉隆起。花红色，顶生头状花序，大形，总苞卵圆半球形，上部边缘具不等长锐刺，花托扁平，着生多数管状花。瘦果白色，扁平，圆，有四钝棱。</p> <p>生态分布：产我国西北。</p> <p>药用部分：干燥的花冠供药用，5~6月采收。</p> <p>用途：性味微甘、温，无毒。为行血通经药，能破瘀生肌，活血止痛，消肿通经。主治闭经，难产，产后恶露不停，跌打损伤；又为麻疹，猩红热等病的催促剂。用量1~2钱。</p>
259	红薯	红苕，番薯。	旋花科	<p>植物形态：多年生草质藤本，有乳汁。地下部有膨大的块根，根皮有黄、</p>

			<p>白、红三种色，内面为白色或橙黄色。茎细长，匍匐地面而生不定根。叶互生，全缘或分裂，通常为心脏形，叶脉或脉腋带紫色。花红紫色，腋生聚伞花序，有时单生；花萼深5裂，花冠钟状或漏斗状，雄蕊5枚，子房上位，2~4室。朔果球形或卵形。</p> <p>生态分布：我国各地广栽培。</p> <p>药用部分：藤（茎），叶供药用，秋季采收。</p> <p>用途：性味甘、微凉，无毒。能通乳汁，溃痈疮，排脓。治大便带血及红崩、腹泻等症。用量：5~8钱。</p>
260	红楠	白漆柴，乌樟，钩樟。	<p>樟科</p> <p>植物形态：常绿乔木，高达16米。树皮灰白色，渐变为棕灰色；侧枝粗壮，小枝无毛。叶互生，革质，倒卵形至倒卵状长椭圆形或椭圆形，长6~10厘米，宽2~4厘米，基部楔形，先端尾尖，全缘，表面深绿色有光泽，背面粉绿色，两面均无毛，侧脉羽状，主脉在下面明显隆起，叶柄长1~2厘米，常呈红色。花黄绿色，腋生圆锥花序，花被6深裂，发育雄蕊9枚，药4室，子房上位，1室。浆果球形，熟时兰黑色，基部具宿存而向外反折的花被。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至广东；多生于山坡常绿阔叶林中，尤以湿润的山谷生长最盛，为常绿阔叶林的组成分子。</p> <p>药用部分：根皮及树皮入药，全年可采。</p> <p>用途：治伤筋、转筋、足肿等症。</p>
261	红茴香	八角茴，土八角。	<p>八角茴香科、木兰科。</p> <p>植物形态：常绿小乔木，高达12米。叶互生，革质，椭圆状披针形或长披针形，长15~18厘米，宽2.5~5.5厘米，基部渐狭，先端锐状或锐尖，全缘，表面深绿色，背面浅绿色，叶柄长2厘米，无托叶。花红色，单生叶腋，萼3片，花瓣18片，愈往内面花瓣愈小，雄蕊多数，排成一轮，心皮10~13个排成一轮，子房上位，1室。骨突果10~13枚，聚生成星状。</p> <p>生态分布：产我国陕西、河南至长江中游各省；多生于常绿阔叶树林中。</p> <p>药用部分：果实入药，夏秋采收，不经炮制，可直接入药。</p> <p>用途：果实性味温、甘，无毒。能镇呕，行气止痛；治胃寒作吐，膀胱疝气及胸前胀痛等症。用量：2~3钱，作煎剂。阴虚内热者禁用。</p>
262	批针叶茴香	无	<p>八角茴香科、木兰科。</p> <p>植物形态：常绿小乔木，高达12米。叶互生，革质，椭圆状披针形或长披针形，长15~18厘米，宽2.5~5.5厘米，基部渐狭，先端锐状或锐尖，全缘，表面深绿色，背面浅绿色，叶柄长2厘米，无托叶。花红色，单生叶腋，萼3片，花瓣18片，愈往内面花瓣愈小，雄蕊多数，排成一轮，心皮10~13个排成一轮，子房上位，1室。骨突果10~13枚，聚生成星状。</p> <p>生态分布：产我国陕西、河南至长江中游各省；多生于常绿阔叶树林中。</p> <p>药用部分：果实、根皮入药，秋冬采收。</p> <p>用途：性味辛、温，果实有大毒。能舒筋活血、驱风散结。治跌打损伤，风湿骨痛，痈肿疔毒。果实用量：2~4分，外用不拘。</p>
263	红豆杉	海罗杉，美丽红豆杉。	<p>红豆杉科，紫杉科。</p> <p>植物形态：常绿乔木，高可达25米。树皮灰赤褐色，具不规则纵裂；枝条上升开展，小枝黄绿色，光滑无毛。叶互生，排成假二列状，线形，作镰形弯曲，长2~4厘米，宽3~4.5毫米，先端渐尖或急尖，叶缘扁平或微向外卷，表面浓绿色，背面灰绿色，中脉上面稍隆起。花单性，异株，腋生；雄花圆形，具鳞状苞片，雄蕊4~8枚，药3~8室；雄花单生，基部为相互对生的鳞片包围，胚珠1枚，直立。种子呈卵圆形，略扁，顶端具2棱线，假种皮大部分包围种子，仅露出顶端，成熟时鲜红色，多肉肉质，味带甜，有粘性。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于山谷溪边杂木林中阴湿地，或向北山坡常绿阔叶林内。</p> <p>药用部分：种子入药，秋冬季采收。</p> <p>用途：治积食，驱蛔虫。</p>
264	红车轴草	红三叶草，三叶草，红花苜蓿。	<p>豆科</p> <p>植物形态：多年生草本。植株有毛或无毛，根深达2米以上，茎高30~60厘米，疏而分枝。叶互生，3小叶，边缘有毛茸，叶柄长，小叶有“V”形白斑条，小叶片卵形或长椭圆形，先端钝或凹，有细锯齿，长3~5厘米，</p>

				<p>托叶卵形，先端甚尖。花蝶形，淡红或淡紫色，腋生球形的总状花序，萼筒状，5裂，雄蕊10枚，两体，雌蕊1枚。荚果小，多数含1粒种子。</p> <p>生态分布：我国有栽培。</p> <p>药用部分：花序及带花枝叶供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：为镇痉、止咳、止喘药。全草败坏后制取坏翘摇素，可作抗凝血剂，制成软膏可作局部治疗溃疡用。</p>
265	红葡萄藤	爬墙虎， 趴山虎， 长春藤。	葡萄科	<p>植物形态：落叶大藤本。有多数短小而分枝的卷须，卷须末端有圆形吸盘，吸着于墙壁，岩石或树皮上，借以攀缘。叶互生，有时也有对生者，卵形，常3裂或为3小叶，长10~20厘米，矿8~17厘米，基部心脏形，有细长叶柄，先端短尖或2~3裂，边缘有粗锯齿；在幼苗或嫩枝上的叶较小而分成3小叶，每小叶均具有小叶柄，中间小叶为倒卵形，两侧小叶斜卵形，也有一部分叶片不分裂；表面深绿色，无毛，有光泽，背面脉上有短柔毛，至秋季叶变为红色，而逐渐凋落。花黄绿色，聚伞花序通常成对着生于二叶间的短枝上，花梗短而无毛，萼、花冠及雄蕊均5枚，子房基部有六浅裂的花盘。子房上位，2室。浆果球形，熟时兰黑色，具白霜。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多附生于山林岩石上，树皮上。</p> <p>药用部分：根及茎药用，秋季采收。</p> <p>用途：有破瘀血之效，并治疔毒及创伤。</p>
266	过路黄	雪上一枝花，黄花 过路黄，铜钱子带 草，路边黄，过路 蜈蚣，地蜈蚣。	报春花科， 樱草 科。	<p>植物形态：一年生蔓生匍匐草本。常成片生长，茎纤细，长达50厘米，全体密生黄褐色柔毛。叶对生，阔卵形至浑圆形，长1~3厘米，宽至2.5厘米，基部截形或浅心形，先端钝，全缘，表面被短柔毛，有时略有脉纹，背面脉上有毛；叶柄长2~6毫米，被毛。花黄色，单生于叶腋，萼5裂，花冠5裂，雄蕊5枚，着生于花冠上，子房上位，1室。蒴果卵形。</p> <p>生态分布：产我国西北部、长江流域及西南各省；多生于沟谷林中或灌丛阴湿处，荒山草地，路边湿地。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、甘、寒。治尿路结石，胆囊结石，化脓性炎症，毒草和药物中毒。全草捣烂敷治疗疮有特效；有止血生肌之效。茎叶与糯米酒糟捣烂，敷治乳腺炎。用量：5钱~1两。</p>
267	过坛龙	乌脚枪， 黑骨芒 箕，铁脚鲁基，乌 脚鲁基，铁钱蕨。	铁线蕨科	<p>植物形态：多年生常绿草本。根茎短，直立，被狭披针形，渐尖的鳞片。叶丛生，叶柄坚韧，深褐色甚至黑色，光亮，基部具鳞片，上部秃净，长10~26厘米，叶为奇数羽状复叶，革质，两面均无毛，为不整齐的阔卵形，长约20厘米，宽约15厘米，为2回或多回叉状份枝的羽状复叶，中央羽片最大，线状披针形，长10~15厘米，宽约2厘米，先端钝头；小叶斜方状椭圆形至扇形，交错互生于叶轴两侧，长1厘米，宽1.5厘米，具被毛的短柄，上缘及外缘圆形，具有细微锯齿，下缘成直角，略成复瓦状排列于叶轴上，也有疏生的，叶脉不明显，扇形，孢子囊群椭圆形，生于小叶背上缘或外缘的叶脉顶端，通常相连接；囊群盖与孢子囊群同形，由叶缘锯齿反折所成。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于林阴岩石湿地及沟谷林中。</p> <p>药用部分：全草入药，全年可采。</p> <p>用途：性味苦、涩、凉。能清热利尿，降火，消炎，解毒，止咳。治瘰癧，痢疾。体虚血亏者忌用。用量：5钱~1两。</p>
268	华山矾	闷门子，猪婆柴， 檬子树，毛柴子， 土常山，毛格子， 渣子树，羊子屎， 白檀。	山矾科， 灰木科	<p>植物形态：落叶灌木，高可达3米。根皮灰白色，树皮灰黑色至灰褐色，小枝密生黄灰色细柔毛。叶互生，长椭圆形至长椭圆状倒卵形，长3.5~10厘米，宽1.5~4.5厘米，基部楔形或浑圆，先端钝圆或短尖，有小突头，边缘有细钝锯齿，表面绿色，幼时有细毛，后无毛或几无毛，背面灰白色，密生细毛，叶柄长约3毫米，密生灰白色细毛。花白色，顶生圆锥花序，萼、花冠5裂，雄蕊多数，花丝细，基部联合，子房下位，2室。核果卵形，表面有疏毛，熟时兰黑色。</p> <p>生态分布：产我国东北、华北、长江流域至广东、福建等地；多生于山坡林边，荒山草地，村落附近及路边。</p> <p>药用部分：根、叶入药，夏秋可采用。</p>

				用途：性味甘、微苦、凉，有小毒。清湿热，止血，止泻剂，外用能收水，生肌，收敛伤口。用量：根2~3钱。
269	华荠苎	华荠，痲子草。	唇形科	<p>植物形态：一年生草本，高达45厘米，全体有香气。茎直立，方形，绿褐色或略带淡红色，被逆生长柔毛，茎多分枝，小枝斜生，纤细。叶对生，无柄或具短柄，柄长1~2毫米，被白色微柔毛，叶线形或线状披针形，长1~2厘米，宽2~4毫米，基部楔形，先端突尖，边缘具疏锯齿，两面均密被白色细柔毛，并密布腺点，主脉一条明显。花淡紫色，轮生头状花序或总状花序，通常顶生，每花具苞片1枚，萼筒状，5裂，花冠2唇形，5裂，雄蕊2枚，子房上位，2深裂，花柱自子房基部着生。小坚果4枚，圆形，藏于宿存花萼内。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡林边，岩石上或荒山草地上。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏采收。</p> <p>用途：性味辛、凉，无毒，能利湿行水。主治感寒伤暑头痛，发热，恶寒，腹痛吐泻，全身水肿，疖肿痲子等症。用量4~6钱。</p>
270	华鼠刺	老茶王，鸡骨菜，银牙莲，牛皮桐。	鼠刺科，虎耳草科	<p>植物形态：常绿灌木，高达4米，枝有片状髓。叶互生，革质，长椭圆形或椭圆形，长6~12厘米，宽2~4.5厘米，基部楔形，有时近圆形，顶端渐尖，表面暗绿色，背面淡绿色，两面均无毛，侧脉约5对，主脉于下面隆起，边缘具锯齿，有时全缘，叶柄长1.5~2厘米，无毛。花淡黄色，腋生总状花序，具叶状苞片，花萼5裂；花瓣5片，在蕾中镊合状排列，雄蕊5枚，插生于花盘边缘的下方，子房上位，常2室。蒴果长卵形。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于常绿阔叶林中或溪边丛林中。</p> <p>药用部分：根及花入药，夏秋采收。</p> <p>用途：作滋补药和治喉痛。</p>
271	华中北五味子	红铃子。	北五味子科，木兰科。	<p>植物形态：落叶木质藤本，长达4米。茎细长无毛，灰紫色，有皮孔。叶互生，膜质，椭圆形或倒卵状长椭圆形，亦有卵状披针形者，长1.5~3厘米，无托叶，基部楔形，先端渐尖，边缘有小齿牙，两面均无毛，偶有短柔毛。花橙黄色，单性同株，单生于叶腋，花梗长2~4厘米，下垂，萼片与花瓣约共为9片，雄蕊10~15枚，心皮多数，分离。果为聚生浆果，伸长成串，下垂，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国山西至长江流域、云南等地；多生于林边灌丛中。</p> <p>药用部分：浆果入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味酸、咸、温。能生津，敛汗，止泻。治咳，喘息，口渴，自汗，盗汗，遗精，久泻，久痢等症。用量：5分~1钱。</p>
272	芋	芋头	天南星科	<p>植物形态：多年生草本。地下茎肉质，椭圆形或近圆形，外面褐黄色，有节及须梗。根生叶4~5枚，具长柄抱茎，长20~90厘米，叶卵状盾形，长20~50厘米，先端尖，基部二裂，耳状。花淡黄色，肉穗花序长达30厘米，上部雄花，下部雌花，佛焰苞淡黄色。</p> <p>生态分布：我国南部广栽培。</p> <p>药用部分：根茎（芋子）及茎、叶入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：芋子性味辛、平滑，有小毒。能宽肠胃，破宿血，去死肌，调中补虚，行气消胀，壮筋骨，益气力。还能祛暑热，止痛消炎。治血热烦渴，身上浮风。茎、叶性味辛、冷滑，无毒。具有除烦止泻之功效，治胎动不安，蛇虫咬伤，蜘蛛伤，黄水疮等。</p>
273	芍药	白芍	毛茛科	<p>植物形态：多年生草本，高达80厘米。茎圆柱形，淡绿色，微带淡红色。叶互生，常2回3出羽状复叶，顶端叶为3出叶，或顶端小叶又分3深裂而侧生小叶又为不规则的2裂，小叶片长椭圆形至披针形，长7~13厘米，宽2~4厘米，基部楔形或宽楔形，先端锐尖或钝尖，表面绿色，背面淡绿色，两面除沿叶脉微背细毛外，余均无毛，边缘具突起而略粗糙，纸质；总叶柄长6~8厘米，圆柱形，淡绿色、无毛。花白色或淡红色，有芳香，顶生树花，萼4片，花瓣5~10片，雄蕊多数；雌蕊皮心4~5枚，分离。骨突果卵圆状锥形。</p> <p>生态分布：产我国东北、北部，中部等处。</p>

			<p>药用部分：根（白芍）入药，5月下旬（立夏后十天内）掘取根部。</p> <p>用途：性味酸、苦、微甘，微寒。能养血柔肝，和中止痛。治脾虚中满，心下疼，胁下痛，止下痢腹痛后重，崩漏带下，血闭腰疼及月经前、产后诸病；并疗四肢急，自汗，肠风泻血，小便不利等症。用量：1钱5分~3钱，现代作镇痉药。</p>
274	芝麻	黑芝麻，胡麻，巨胜，脂麻。	<p>胡麻科</p> <p>植物形态：一年生草本，高达1.5米。茎直立，基部稍木质化，四棱形，棱角略凸出成圆形，密被白色长柔毛。叶对生。稀为上部叶互生；叶柄长可达7厘米，被白色柔毛；叶片卵圆形至长卵状披针形，长5~14厘米，宽1~7厘米，基部楔形，先端锐尖，全缘或疏生锯齿，接近根茎基的叶往往3裂，表面绿色，背面淡绿色，两面均散生白色柔毛，沿叶脉处毛显著增多。花白色，往往但有淡紫色或黄色，单生或数朵丛生于叶腋；花萼5裂，花冠唇形，5裂，雄蕊4枚、2强，子房圆锥形，上位，早期呈假4室，成熟后为2室。蒴果四棱，长圆筒状。</p> <p>生态分布：我国广为栽培。</p> <p>药用部分：嫩茎、叶及种子药用，茎、叶夏伏采收，种子秋季采收。</p> <p>用途：种子性味甘，平。能补肝肾，养血，润燥，主治身体羸瘦，大便秘秘，风湿瘫痪等症。用量：种子1~3钱。</p>
275	芒萁骨	路萁，小里白，芒萁，狼萁。	<p>里白科</p> <p>植物形态：多年常绿色草本，高达1米或更高。根茎细长横走，有分枝，密被暗锈色长毛。叶远生，直立，无限生长，叶柄长24~56厘米，叶轴1~2回二叉分枝，各有1对羽片，两个羽片之间有密被锈黄色的腋芽，羽片披针形或宽披针形，裂片篦齿状平展，20~50对，线状披针形，长1.5~2.9厘米，先端钝，常微凹，羽片基部的数对裂片极短，三角形或三角状圆形；叶膜革质，表面黄绿色或绿色，沿羽轴被有锈色毛，后脱落，叶背面灰白色，沿中脉及侧脉疏被锈色毛。孢子囊群圆形，无囊群盖，着生于中羽片的裂片背面两侧小脉的弯弓处，由5~8个孢子囊组成。孢子四面形，无周壁，白色透明。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于荒山草地或疏生松林中，在森林砍伐后或放荒的坡地上常形成优势的群落。</p> <p>药用部分：根、茎心、叶入药，全年可采。</p> <p>用途：性味甘、平。能清热化湿，祛瘀止血，利尿。用量：茎心4钱~1两，根5钱~1两。</p>
276	光叶桦	大叶榔，红桦树。	<p>桦木科</p> <p>植物形态：落叶乔木，高可达20米。幼树树皮呈青灰色，光滑，老树皮灰褐色至暗红色，褐红色或灰紫色，具黄色茸毛，后变无毛。叶互生，卵圆形，长4~10厘米，宽2~4厘米，基部楔形或近圆形，先端渐尖，边缘具不规则的尖锯齿，表面光滑无毛，背面疏生短柔毛，侧脉明显，9~13对，叶柄长1~2厘米。花黄绿色，单性同株，雄花集成茅荑花序，萼4裂，雄蕊两枚，雌花亦集成茅荑花序，无花被，子房上位，2室。果为小坚果，呈卵形压扁状，顶端有2宿存的花柱，两边各具一膜质翅，呈半圆形，较小坚果阔2~3倍，果苞披针形，通常在中部以下两边有耳状片。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至广东北部山地；多生于向阳山坡疏林中或砍伐后的松山林中。</p> <p>药用部分：叶供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：治疔毒。</p>
277	光叶海桐	七星胆，钻山虎，皮子药，见血飞。	<p>海桐科</p> <p>植物形态：常绿灌木或小乔木，上部枝条有时呈轮生状。叶互生或轮生，长椭圆状披针形，长5~12厘米，宽1.5~4厘米，基部楔形，先端锐尖，边缘微波状或全缘，两面光滑，表面绿色，背面苍白色。花黄色，呈稀疏的伞房花序，花5枚，萼片及花瓣基部联合，子房上位，为不完全的2室。蒴果木质，卵状椭圆形，成熟后通常3瓣裂，露出有鲜红色假种皮的种子多枚。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部各省；多生于山坡阔叶林中或沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：树皮、叶、种子药用，全年可采。</p> <p>用途：树皮性味苦、凉，无毒。能消炎退热，通经活血，镇咳化痰，祛湿止痛。治昏眩，麻木。腰背痛，盗汗。种子性味苦、涩，平。治咽痛，</p>

			腹泻，乏力。用量：皮5钱~1两，种子1钱5分~3钱。
278	羊乳	奶参，奶婆婆，代奶娘，奶薯子，山海螺，白鳞肉，庐山党参。	桔梗科 植物形态：多年生蔓性草本。根肥厚为倒卵状纺锤形，茎缠绕，多分枝，长达2米以上，全株都含有乳白色的液汁和特殊的臭味。叶通常2~4片，轮生，广披针形或菱形、椭圆形，长3.5~7.5厘米，宽2~3.5厘米，基部楔形，有短柄，先端尖，全缘或具不明显的锯齿，沿边缘有短刚毛。花黄色，有暗紫色斑点，着生在小枝的末端，有短梗，萼5裂，萼片三角形，锐尖，花冠钟形，浅5裂，尖端向外反卷，雄蕊5枚，子房上位，3室。蒴果圆锥形，有宿萼。 生态分布：产我国东北至长江流域以南各省；多生于山坡疏林灌丛中，荒山草地，路边均常见有生长。 药用部分：根、茎、叶入药，夏秋采收。 用途：性味甘、平，无毒。作催乳剂，并治痈毒恶疮，肺脓肿等。根5钱~1两。
279	羊蹄	野当归，牛舌头，牛舌菜，野大黄，和尚秃，皱叶酸摸。	蓼科 植物形态：多年生草本。根肥厚，黄色，茎直立，具细沟纹，高可达1米，通常不分枝。叶根生具长柄，叶片狭长椭圆形，基部圆或楔形，先端锐尖，边缘波状皱折，叶长10~15厘米，宽1.5~3厘米，茎生叶细长，具短柄，叶鞘为膜质管状，易破裂而脱落。花淡绿色，轮生于茎端，形成圆锥状花序，花序间夹有叶状苞，花被6片，雄蕊6枚，子房上位，1室，花柱3枚，柱头2裂，花后内轮花被3片发育而形成广卵形翅状的果被，果被阔卵形，有不甚显明的网纹，先端钝或锐，基部截形或略成心脏形，全缘或具不明显的齿，各具一个大小不等的卵形瘤状突起。瘦果椭圆三角状，先锐尖，棱角锐利。 生态分布：产我国长江下游各省；多生于草坡、路旁湿地、城镇村落、庭园中极为常见。 药用部分：根、全草、嫩叶入药，8~9月份采集。 用途：性味苦、寒。杀虫，润肠，凉血清热。用量7~8钱。
280	羊蹄甲	马蹄，鄂羊蹄甲，羊蹄藤，双肾藤。	云实科，豆科。 植物形态：落叶木质藤本，被很稀疏的红棕色柔毛。茎横切面有淡紫红色放射状髓线，似菊花状，卷须1或2个对生，被红棕色柔毛。叶互生，近于肾形，有7~9脉，基部心形或近于截形，顶端分裂至叶片1/4~1/2处，裂片顶端圆形，两面被稀柔毛，长3.3~6.5厘米，宽4.7~9.5厘米，叶柄有疏毛，长2~4厘米。花红棕色，有紫色脉纹，顶生伞房花序，萼5裂，花瓣5片，假蝶形，雄蕊10个，能育雄蕊仅3个，子房有长子房柄，无毛。荚果扁带形，无毛有明显纲脉，果长14~29厘米，宽4~5厘米。 生态分布：产我国长江流域上中游各省；多生于山坡林边或灌丛中。 药用部分：秋后采其根入药。 用途：性味苦、涩、温，无毒。治膀胱疝气，睾丸肿痛，肾囊风痒。用量：1~2两。
281	羊躑躅	闹羊花，搜山虎，羊不食草，炼羊花，黄杜鹃，老虎花。	杜鹃花科，石南科。 植物形态：落叶灌木，高1~2米。分枝，通常棕褐色，幼枝有短柔毛或刚毛。叶互生，有短柄，长圆形至披针形或倒披针形，长6~15厘米，基部楔形，先端钝或突尖，边缘具外旋状缘毛，背面被灰色短柔毛。花黄色，顶生伞形花序，萼宿存，5浅裂，萼齿具缘毛，花冠钟状或漏斗状，5裂，外面被短柔毛，雄蕊5枚，子房上位，5室。蒴果长椭圆形，成熟时赤褐色。 生态分布：产我国长江流域 至南部各省；多生于山坡林边，灌丛中，荒山草地也有生长。 药用部分：花、根入药，4~5月采收。 用途：性味辛、温，有大毒。内用必须注意用量。一般作为麻醉药，小量有镇痛、镇静作用。（体虚及孕妇忌用）因有剧毒，全株多用为驱杀农业害虫，杀灭钉螺也有效。用量：根5分~1钱。
282	合欢	夜关门，关门柴。	含羞草科，豆科。 植物形态：落叶乔木，高约6米。树皮灰褐色，平滑，枝条粗而较短，小枝带棱角，表面被网纵纹，黑褐色，散生黄褐色圆点至椭圆状突起的皮孔。叶互生，偶数2回羽状复叶，长达30厘米，总叶柄呈四方形，有细毛，基部腹面具一凹形突起的腺点，羽片4~12对，有时至20对，长4~9厘米，

				<p>柄约2毫米，羽轴具细毛，尤其在腹面沟槽两侧较多柔毛，小叶10~30对，镰刀状线形至长椭圆形，无柄，长7~10毫米，宽2~3毫米，顶端尖，全缘，有绒毛，基部截形，表面无毛，背面有时沿主脉具有细毛，主脉两面突起，贴近上缘。花淡红色，顶生多数有柄的伞房状的头状花序，萼圆筒形，5裂，花冠漏斗形，表面上半部有毛及红腺点，瓣片5，雄蕊多数，下部四分之一合成管状，子房上位，1室。荚果扁平。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于向阳山坡林缘、灌丛中，或生于荒山草地，也有栽为行道树者。</p> <p>药用部分：树皮、花、种子入药；树皮6~7月采，花5~6月采，种子10月采收。</p> <p>用途：性味甘、苦、平，无毒。皮能消肿止痛，续筋骨。治忧郁失眠，肺痈、跌打损伤、骨折、痈疽等。现代用作强壮，利尿，驱虫及镇痛药。花能养心安神，开胃理气，治夜寐不安。用量：皮5分~3钱。花5分~1钱5分。</p>
283	合萌	野兰，禾镰草。田皂角，野含羞草，锯子草，梳子树，蜈蚣杨柳，夜关门，连根拔。	豆科	<p>植物形态：一年生草本。茎直立，高达80厘米，枝无毛，淡绿色。叶互生，偶数羽状复叶，叶轴长5~10厘米；小叶20~35对，线形或线状椭圆形，长0.5~0.8厘米，宽0.2~0.3厘米，基部椭圆，先端圆钝，有微突，全缘，托叶披针形。膜质。花淡黄色，蝶形，腋生总状花序，萼2唇形，雄蕊10枚，5枚一束，两体。荚果，节裂，荚节5~10个。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于水田边，水沟中，或山坡湿地。</p> <p>药用部分：全草、根、叶或木质部入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、涩、凉，无毒。除时疫瘴气，祛风化痰，托毒生肌，利尿，明目。治痢疾。用量：全草5钱~2两。</p>
284	合子草	双合子，蛇瓜子，野苦瓜，野瓜藤，湿疹草。	葫芦科	<p>植物形态：多年生草质藤本，茎蔓长，细弱，长可达1.5米，有与叶对生的卷须。叶互生，卵状长三角形，长2.5~6厘米，宽2~4厘米，基部心脏形，先端渐尖，有时两侧为耳状或截状，边缘有疏齿，表面深绿色，背面淡绿色，两面除叶脉被毛外均无毛，叶柄长1.5~3厘米，有细毛，花黄绿色，单性同株，雄花为总状花序，萼辐形，5深裂，花瓣5裂，雄蕊5枚，离生，雌花单生，子房下位，1室。果为盖果状，绿色，卵状椭圆形，下半部较粗厚有凸刺，熟时中部横裂似盒子状故名“盒子草”。种子2个，灰黑色，卵形，背凸膜平。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部各省；多生于沟畔、水边、池塘旁、草丛中。</p> <p>药用部分：种子及叶供药用，6~10月采收。</p> <p>用途：性味苦，寒。能清热，解毒，去湿。治毒蛇咬伤及无名肿毒。多外用。</p>
285	合掌消	肿三消，牛皮消，合掌草，土胆草，硬皮草。	萝藦科	<p>植物形态：多年生草本，高约可达1米。茎直立，秃净。叶对生，倒卵状长椭圆形，长2.5~6厘米，宽1~3厘米，基部楔形，先端短尖，两侧下延呈短耳状，稍抱茎，全缘，两面光滑无毛，背面叶脉明显，无叶柄，花黄绿色，腋生聚伞花序，萼与花冠均5裂，付花冠小，雄蕊5枚，雌蕊由2离生心皮合成，子房上位，各1室。骨突果2枚，圆锥状。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于荒山草地及路边。</p> <p>药用部分：全草、根入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味微苦、辛、平。祛风，解毒消肿，行气。用量：根5钱~1两。</p>
286	吉祥草	松寿兰，小青胆，小叶万年青，竹叶青。	百合科	<p>植物形态：多年生常绿草本。茎匍匐，带绿色或紫白色，有节。叶丛生，线形，卵状披针形或线状披针形，长7~30厘米，宽5~15毫米，基部平阔，无柄，先端尖或长尖，全缘，两面无毛。花紫红色或白色，花被6片，下端呈管状，雄蕊6枚，子房上位，3室。浆果圆形，红色。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至西南各省；多生于山谷林下，溪边等阴湿处。</p> <p>药用部分：根及全草入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味甘、平。能补肺、止咳、止血、接骨、补肾。将吉祥草根浸酒，加虎骨膏，可治遗精；根泡酒可治跌打损伤。用量：全草1~2两。</p>

287	夹竹桃	九节肿，大节肿。	夹竹桃科	<p>植物形态：常绿灌木，高达4米，叶革质，常3叶轮生，线状披针形至长披针形，长5~19厘米，宽1~3厘米，基部楔形，先端渐尖，叶表面深绿色，背面淡绿色，中脉背面凸起，侧脉多数，平行，叶短柄。花桃红色，有芳香，或白色，顶生集伞花序；萼5裂，花冠漏斗状，5裂，或重瓣，雄蕊5枚，子房上位，2室。骨突果2个，长达18厘米。</p> <p>生态分布：我国南北各地均有栽植。</p> <p>药用部分：树皮、叶入药，全年可采。</p> <p>用途：性味苦、寒，有大毒。能强心利尿祛痰，发汗催吐，过量能致死，切不可随意使用，外用跌打损伤。</p>
288	交让木	画眉珠	交让木科，大戟科。	<p>植物形态：常绿小乔木，高10~12米。树枝灰白色，平滑，枝粗壮，小枝灰绿色无毛，疏生椭圆形皮孔，叶痕明显，半圆形而上端微凹。叶互生，常聚生于枝端，长椭圆形，长10~20厘米，宽3~5.5厘米，基部宽楔形，先端短尖，表面深绿色带光泽，背面淡绿色薄被白霜，两面无毛，全缘，草质，侧脉不甚明显，主脉于背面显著隆起；叶腋长1.8~4厘米，叶柄与叶脉呈红色，折断后带香气。花单性异株，腋生总状花序，花无花被，雄蕊8~10枚，雌花具8~10枚呈鳞片状的退化雄蕊，生于子房下而密接，雌蕊缺花柱，柱头2~3裂。果为核果，椭圆形或近球形，熟时蓝黑色，被白霜，具宿存柱头。</p> <p>生态分布：产我长江流域各省至广东北部；生长于山坡，溪谷潮湿的林缘及常绿阔叶林中。</p> <p>药用部分：种子及叶入药，秋季采收。</p> <p>用途：治疗毒红肿。</p>
289	亚麻	胡麻	亚麻科	<p>植物形态：一年生直立草本，高达1米，全体平滑无毛。茎圆柱形，表面具有纵条纹，上部分枝，幼枝绿色，带棱角，皮部富纤维。叶互生，线形或披针形，长2~3厘米，宽2~5毫米，基部渐狭，近于无柄，先端渐尖，全缘，通常叶脉三出，近于平行。花蓝色或白色，排列成聚伞形疏生的圆锥花序，花萼5片，最内1萼片的边缘白色薄膜状，具短缘毛，花瓣5片，早落，雄蕊5枚，假雄蕊5枚，子房上位，5室。蒴果近于球形而微扁，先端尖，有宿存萼片。</p> <p>生态分布：产内蒙古自治区、山西、陕西及东北诸省，全国各地多有栽植。</p> <p>药用部分：叶、根、种子及亚麻仁油入药，6~7月份采收。</p> <p>用途：种子性味甘、温。粉碎的亚麻仁可作敷料；完整的亚麻仁可作缓和剂、滑润剂、轻泻剂的制剂。亚麻油可作涂布料，（治烫伤、火伤）、软膏原料及涂漆、亚麻仁油漆布、印刷油等。内服可作润滑剂，轻泻剂。</p> <p>用量：种子2~3钱。</p>
290	西瓜	寒瓜	葫芦科	<p>植物形态：一年生草质藤本，有分枝的卷须，全株被毛茸。叶互生，广卵形至卵状椭圆形，长10~17厘米，宽5~15厘米，羽状深裂，基部心形，裂片3~4对，中间主裂片较长，每一裂片再行分裂为齿牙状，先端阔，叶柄较叶片短，长6~12厘米，有长毛。花单性，淡黄至黄色，萼广钟形，5裂，花冠辐状，5裂，雄花雄蕊3枚，雌花子房下位，1室。瓜果球形或长椭圆形，无毛。</p> <p>生态分布：我国南北有栽培。</p> <p>药用部分：果实及干燥果实皮供药用。7~9月采收。</p> <p>用途：性味甘，凉。为祛暑利尿药，能清暑热，止烦渴，利小便，解酒毒，用治高血压、肾脏炎浮肿，膀胱炎，糖尿病，黄疸，子宫等病。西瓜翠衣亦有清暑解热功效。西瓜汁膏用于糖尿病、肾脏炎有效。用量：果皮3~6钱。</p>
291	问荆	土木贼，节节草，骨节草，猪宗草，笔头菜，马锋草。	木贼科	<p>植物形态：多年生常绿草本。根茎长，有节，匍匐，黑色或暗褐色，深埋地下。地上茎为营养茎，与孢子囊茎不相同，孢子囊茎春季由根茎伸出，无叶绿素，淡褐色，肉质，不分枝，具12~14不显明的肋棱。叶退化，叶鞘漏斗形，齿棕褐色，厚膜质，每2~3齿，连接成阔三角形。营养茎，</p>

			<p>绿色，有分枝，坚强直立，高30~40厘米，具6~12肋棱，沟中气孔2~4行，茎下部光滑，上部具微小疣状突起，中心孔甚小，叶鞘筒的鞘片先端具一浅沟，齿广披针形，黑褐色，边缘膜质，白色，分枝轮生，中实，3~4棱，通常不在分枝。孢子囊穗有总梗，长椭圆形，锐尖或微尖，长2~3.8厘米；孢子叶六角盾形，下生孢子囊6~8个，当孢子囊成熟时，孢子囊茎即枯萎。</p> <p>生态分布：产我国东北至长江流域各省；多生于沟谷及河岸冲积土上。</p> <p>药用部分：夏秋季采全草药用。</p> <p>用途：性味苦、甘，无毒。用作利尿及止血剂。治风湿，淋病，刀伤，又可治气急、结气、瘤痛。农业上用根茎水浸液防止菜青虫。用量：1~3钱。</p>
292	向日葵	葵花，望日葵，向阳花。	<p>菊科</p> <p>植物形态：一年生草本，高1~3米。茎常有斑点，被疏长毛或短而硬的刺状毛。叶通常互生，具长柄，卵形，长10~25厘米，先端长尖，边缘有锯齿，下部的叶常作心脏形，两面均被以白色的刺状短毛。花黄色，顶生单个头状花序，直径7~20厘米，总苞片卵形披针形，先端尾状渐尖，具睫毛，外围的花为一轮舌状花，中性、黄色，中央为管状花，两性，花冠裂片和雄蕊均5枚，子房下位，1室。瘦果扁长卵形或椭圆形，灰棕色或黑色。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：葵花盘（花托）、茎心、叶及种子入药，秋季采集。</p> <p>用途：性味平、淡，无毒。驱风，平肝，清湿热，散滞气。用量：茎心5钱~1两，葵花盘5钱~2两，根3~5钱。</p>
293	血水草	水黄连，鸡爪连。	<p>罂粟科</p> <p>植物形态：多年生草本。根茎匍匐地下，全体有鲜黄色液汁。叶根生，叶柄长约40厘米，肉质，脆而多汁，灰绿色，有光泽；叶薄纸质，阔心形，长7.5~15厘米，宽9~12厘米，基部有深凹，顶端圆形，边缘有阔波状齿，表面灰绿色，背面微有白霜。花白色，总状花序，直立，花茎高30~40厘米，上部分枝，花萼早落，花瓣4片，雄蕊多至70枚，子房上位，1室。蒴果长椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至广东、广西等省。多生于山坡、路旁、溪边、林边等潮湿处。</p> <p>药用部分：根、根茎及全草供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、寒，有小毒。用作黄连代用品。用量：根及根茎2钱~1两。</p>
294	观音座莲	观音莲，马蹄蕨，地莲花，福建观音座莲。	<p>观音座莲科</p> <p>植物形态：多年生常绿大草本，高可达2米，根状茎粗大，块状，多丛生呈圆柱状。叶根生，大型二回羽状复叶，叶柄粗壮，长约50厘米，叶片宽广，宽卵形，长及阔各60厘米以上，羽片5~7对，互生，长50~60厘米，宽14~18厘米，狭长圆形，基部不变狭，羽柄长约2~4厘米，奇数羽状，小羽片35~40对，对生或互生，平展，上部的稍斜向上，具短柄，1.5~2.8厘米，小叶长7~9厘米，宽1~1.7厘米，披针形，基部近截形或几圆形，先端渐尖，叶缘具有规则的浅三角形锯齿，叶脉开展，下面明显，一般分叉。孢子囊群棕色，长圆形，生于小叶背面两侧，近边缘处。</p> <p>生态分布：产我长江中下游至贵州、福建、广东等地。多生于林下溪边阴湿处。</p> <p>药用部分：带叶柄的根茎供药用，全年可采。</p> <p>用途：祛风解毒。用量：3~5钱。</p>
295	有角乌菟莓	石老鼠，金线吊葫芦，石猴子，土经丸，三叶青。	<p>葡萄科</p> <p>植物形态：多年生攀性草质藤本，长可达4米，须根多，或有肉质块根，圆柱形，略呈纺锤形或葫芦形，表面棕褐色，里面白色，茎细长，卷须与叶对生。叶互生，3小叶，有时为5小叶，顶端小叶较大，卵状披针形，长3~6.8厘米，宽1.2~2厘米，边缘有疏生锯齿，两面均无毛。花黄绿色，腋生聚伞花序，萼杯状，4裂，花被4裂，雄蕊4枚，花盘与子房合生，子房上位，2室。浆果球形，熟时黑紫色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于山坡林边，林中空地及岩石边。</p> <p>药用部分：块根入药，夏秋采用。</p>

				用途：性味微苦、平。能清热解毒，祛风化痰。用量：1~3钱。
296	冷水花	苔水花	荨麻科	<p>植物形态：一年生软弱多汁草本，高约25厘米，茎直立或偃伏，圆柱形，有分枝，光滑无毛，淡绿色，有时呈半透明状。叶对生，卵形或椭圆状卵形，长1~8厘米，宽0.5~2厘米，基部阔楔或钝，先端钝或渐尖，边缘具3~6粗齿，两面均无毛。花绿色，单性同株，腋生聚伞花序，雄花花被2~5裂，雄蕊同数；雌花花被5裂，子房上位，1室。瘦果平滑，无斑点。</p> <p>生态分布：产我国长江流域及南部各省；多生于山坡林下，林边湿地，沟谷草丛中。</p> <p>药用部分：全草入药：夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘，凉。能清热，解毒，安胎止血。治淋浊尿血，喉痛，骨哽及小儿胎毒，丹毒，又可治子宫炎。赤白带下。用量：鲜根5钱~1两。</p>
297	沙参：一、杏叶沙参	沙参（通称）	桔梗科	<p>植物形态：多年生草本，高可达1米。根肥厚，长圆锥形，茎直立，单一或基部分枝，被白色细毛。根生叶肾圆形，有长柄，茎叶互生卵圆形或广卵圆形，长2~7厘米，宽1~3厘米，基部楔形，先端尖边缘有粗细不匀的锯齿，无叶柄。花蓝紫色，顶生总状花序，小花柄极短，花萼5裂，花冠钟状，下垂，5裂，雄蕊5枚，雌蕊1枚。蒴果球形。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部各省；多声于山坡荒山草地或灌木丛中，沟边草地也常有生长。</p> <p>药用部分：根入药，秋季采挖。</p> <p>用途：性味苦、微寒，无毒。能养阴清肺，除虚热，止咳嗽。治肺阴不足，虚热咳嗽，燥咳及肺痿等症。用量：1.5~5钱。</p>
298	二、轮叶沙参	南沙参，四叶沙参。	桔梗科	<p>植物形态：多年生草本。根粗壮，似胡萝卜状而稍细，具皱纹。茎直立，单一，高达1.5米，圆形，无毛，有纵纹。叶通常4叶轮生，无柄或有短柄，叶片椭圆形或披针形，长4~8厘米，宽1.5~3厘米，边缘有锯齿，表面绿色，有时疏生短毛，背面淡绿色，生有密柔毛。花蓝紫色，顶生圆锥状花序，花多下垂，萼5裂，花冠总状，5裂，雄蕊5枚围在花盘（密腺）外，子房下位，3室。蒴果卵圆形。</p> <p>生态分布：产我国北部至长江流域各省；多生于山坡疏林边，砍伐迹地及灌丛中。</p> <p>药用部分：根入药，秋季采收。</p> <p>用途：与杏沙参相同。</p>
299	三、细叶沙参（兰花参）	金箍棒，毛鸡腿，沙参。	桔梗科	<p>植物形态：多年生草本，高可达40厘米，根细长，茎直立或匍匐，细长丛生，下部被疏毛，上部稍光滑。叶互生，基生叶较密，近似丛生，叶片倒披针形或线状披针形，长1~3厘米，宽0.2~0.4厘米，无柄，基部稍窄，先端短尖，边缘微波状，疏生钝齿。花兰色，顶生二歧花序，花梗长，花萼5枚，花冠5裂，漏斗状钟形，裂片椭圆形，雄蕊5枚，子房下位，3室。蒴果，倒圆锥状，有宿萼基部狭窄成果柄，顶裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南至西南各省。</p> <p>药用部分：秋后采其根入药。</p> <p>用途：性味甘，微寒，无毒。补脾胃，益肺肾，祛痰，杀虫，止血。用量：5钱~1两。</p>
300	伯乐树	山桃树	伯乐树科	<p>植物形态：落叶乔木，高达15米。小枝粗壮，平滑无毛，其上有大而圆形的叶痕，有点纹及皮孔。叶互生，近于革质，奇数羽状复叶，小叶7~15枚，小叶长椭圆状卵形，长约12厘米，宽约4.5厘米；基部圆形或有时偏斜，先端短而渐尖，全缘，表面绿色有光泽，背面粉白色，有网脉，沿中肋有褐色毛丛。花粉红色，径约3厘米，顶生总状花序，萼钟状，全缘，为不明显的5裂，花瓣5片，雄蕊5~9枚，子房上位，3~5室。蒴果红色，木质2~5瓣裂。</p> <p>生态分布：特产我国云南、贵州、湖南、江西等省；多生于海拔800米以上山林中。</p> <p>药用部分：树皮药用，夏秋采收。</p> <p>用途：树皮捣烂外敷治筋骨痛。</p>
301	何首乌	外红藤，夜交藤，	蓼科	植物形态：多年生落叶草质藤本，根细长，末端膨大成块状，外表赤褐

		多花蓼。	色至暗红色。茎缠绕，平滑无毛。叶膜质，互生，心脏形或卵状心脏形，长3~8厘米，宽2~5厘米，基部心脏形或近截形，先端渐尖，全缘，叶短柄，托叶膜质，褐色，成鞘状包于茎上。花白色，大型圆锥花序，花被5裂，雄蕊8枚，雌蕊1枚，子房上位。瘦果椭圆形，褐色，有光泽。 生态分布：产长江流域至西南各省；多生于溪边、山谷、山坡、灌丛中，村落、城镇庭院中也常有生长。 药用部分：根、茎、叶入药，8~9月采收。 用途：性味苦、甘、温。能益血气，黑须发，强筋骨，益精髓。茎叶治风疮疥疮作痒，失眠，梅毒，经水不调，神经衰弱，烫伤，大肠风秘，贫血，发白，佝偻病，蛇咬伤。用量：根2~5钱，藤5钱~1两。
302	佛甲草	龙牙草，糯米草，万年草，午时花，半枝莲，打不死，狗牙瓣。	景天科 植物形态：多年生草本。茎高约30厘米，多数丛生，肉质多汁，颇柔软，倾卧地面，着地的部分节节生根。花茎直立，高10~20厘米，圆柱形，绿色，叶线形，三片轮生，基部扁平，上方渐次呈细圆柱形，锐尖头，先端稍钝，长约2~3厘米，宽约2毫米，多肉质。花茎于顶端分枝，每枝更分为叉状，疏生多数黄色小花，无花梗，苞片线形，萼片5片，花瓣5片，长椭圆形，先端细尖，质薄，雄蕊10枚，其内列5枚着生于花瓣基部，心皮5个，略直立，基部生短小鳞片，花后结骨突果。种子细小。 生态分布：产我国南方各省；多生于山坡，岩石上或山村颓墙上。 药用部分：鲜叶或全草入药，四季可采。 用途：性味酸、寒。清热泻火，解毒散瘀，止血。用量：5钱~1两。
303	扶桑	大红花，朱槿。	锦葵科 植物形态：半常绿灌木，多分枝，高可达4米，树皮富纤维。叶互生，阔卵形，或狭卵形，长7~10厘米，基部钝圆，先端突尖或渐尖，边缘有粗齿或缺刻，除先端外几乎全缘，秃净或于背面脉上有少许疏毛。花大，玫瑰红色或淡红，淡黄色，单生上部叶腋，小苞片（付萼）6~7枚，萼5裂，花瓣5枚，漏斗状，有时为重瓣，雄蕊多数，合生包围着雄蕊，子房上位，5室。蒴果卵形。 生态分布：产我国南部，各地广栽培。 药用部分：根、叶、花入药，根全年可采，叶、花夏秋采收。 用途：性味甘、平。能解毒消肿，清热利水。主治腮腺炎，急性结膜炎，尿路感染，白带，痈疽，疔疮肿毒等症。用量：根3~5钱。外用鲜叶捣烂敷患处。
304	扶芳藤	拈络藤，攀缘丝棉木。	卫矛科 植物形态：常绿灌木。匍匐或攀缘状，高约1.5米，枝上通常生长细根并有小瘤状突起。叶对生，薄革质，长椭圆状卵形至长椭圆状倒卵形，长2.5~8厘米，宽1.5~4厘米，基部宽楔形，先端尖或短锐尖，边缘有锯齿，表面叶脉隆起，背面叶脉甚明显，叶柄短。花绿白色，腋生聚伞花序，花萼、花瓣均为4枚，雄蕊4枚，着生于花盘的边缘，子房与花盘连生成四脊隆起，上位，3~5室。蒴果球形，种子外被有桔红色的假种皮。 生态分布：产我国北部至南部各省：多生于林缘、山村附近，常匍匐于岩壁，围墙上或攀缘于树上。 药用部分：茎、叶入药，夏秋采收。 用途：性味温、苦、无毒。能行气活血。治腰膝疼痛，跌打损伤，外伤出血，月经不调，咯血，血崩等，用量：3~6钱。外用适量。
305	杉	天蜈蚣，千把刀。	杉科，松柏科。 植物形态：常绿乔木，高达30米。枝轮生或有不规则伸展，树皮纵裂，常露出淡红色的内皮层。叶螺旋状着生，厚革质而扭转为假2列式，叶片扁平，线状披针形，长2~6厘米，基部下延，扭转，先端渐尖，边缘有细锯齿，表面光滑，背面有2条宽白粉带（即气孔带）。花单性，同株，雄花黄绿色，丛生于枝端，圆柱状，雌花淡红色，单生或3~4枚丛生于枝稍，球状，每一胚鳞有倒垂的胚珠3枚。胚鳞发育成为种鳞，多数种鳞聚生为卵圆形的球果，种鳞革质，淡黄色，顶端尖锐，每种鳞的腹面具有种子3枚，种子扁平有狭翅。 生态分布：特产我国长江以南至南部各省，甘肃省白龙江尚有残存者。 药用部分：树皮、根、球果、杉寄生、杉树油均供药用，全年均可采收。 用途：性味辛，微温。杉材治疔疮，脚气肿痛，心腹胀满，肺壅痰滞，

			小儿阴肿。叶治风虫牙痛，预防疝气痛。皮治金疮出血，汤火灼伤。用量：油1~2钱，皮5钱~1两。
306	杉柏	山刺柏，刺柏树。	柏科 <p>植物形态：常绿乔木，高可达25米。树皮灰棕色，具裂纹，作细长薄片状剥落；枝条向上开展，小枝下垂，枝上有三棱，表面赤褐色。叶常3叶轮生，呈尖刺状，长1.2~1.5厘米，宽1.5~2毫米，先端尖，背面隆起，表面中肋的两侧具白色气孔线2条，在先端相连。花单性，同株，雄花小，具短柄，卵形，生于叶腋，具苞片数片，内含多数或3枚轮生的雄蕊；雌花单生于叶腋，有数片苞片包被，胚鳞紧贴，3枚。种鳞聚生愈合成球形或短卵形肉质浆果状的球果，成熟时3种鳞顶端开裂，内藏种子3粒。</p> <p>生态分布：产我国陕、甘、晋至长江流域和福建等地。</p> <p>药用部分：根入药，秋冬采收。</p> <p>用途：性味苦、寒。治麻疹发透至手足出齐后，疹点不按期收没，身热不退。用量4~5钱。</p>
307	杜若	竹叶莲，地藕。	鸭跖草科 <p>植物形态：多年生草本，根茎白色，细长横走，节上生须根，茎高达90厘米，稍粗。叶互生，长椭圆形，长20~30厘米，宽4~5厘米，基部渐狭成鞘，抱茎，先端尖，有香气。花白色，顶生圆锥花序，花被及雄蕊均6枚，子房3室，上位。果实小球形，兰色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于沟谷林边阴湿处、溪边湿地。</p> <p>药用部分：全草、根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、微温，无毒。能益精，明目，温中，止痛，除口臭，去皮间风热，养肾益阴。治胸胁下逆气，头肿痛，流涕泪，胃中逆痛，霍乱胀痛。用量：根1~3钱。</p>
308	杜仲	思仲，思仙，玉丝皮。	杜仲科 <p>植物形态：落叶乔木，高达20米。枝、叶、树皮及叶内均含有硬树胶，折断引伸有银白色细丝，树皮灰色。叶互生，椭圆形或卵形，长6~13厘米，宽3.5~7厘米，基部圆形，先端尖，边缘有锯齿，两面幼时均具褐色毛，老时仅叶脉有毛，叶柄长1~2厘米。花单性，异株，发叶前或发叶时开花，单生，无花被，雄花苞叶匙状倒卵形，雄蕊5~10枚，雌花花柄短，苞叶较小，子房上位，1室，顶端2裂。翅果扁平，成卵状长方形，内含1颗种子。</p> <p>生态分布：特产我国西部，西北部至东部。</p> <p>药用部分：根、树皮、叶、花及果实入药，春季采收。</p> <p>用途：性味辛、甘、温，无毒。能补肝益肾，坚筋骨强志。治腰膝痛，胎漏，胎堕，阴下湿痒，小便余沥等症，并治高血压。用量：树皮3~5钱。</p>
309	杜衡	大救驾，马蹄香，双龙麻硝，花叶细辛，花脸细辛，翻天印。	马兜铃科 <p>植物形态：多年生常绿草本。茎短，地下具匍匐茎，多节，节上及下端有无数圆柱形的粗根，根肉质，长4~7厘米，径3毫米许，末端呈细须状。叶革质，根生卵状椭圆形，长10~15厘米，宽7~9厘米左右，基部耳状，深心脏形，先端钝尖，全缘，表面深绿色，有白花斑，背面绿色，具长柄，长10~20厘米。花单生于近地表的叶腋，淡棕紫色，花被管状，3裂，雄蕊12枚，着生于子房外壁，子房下位，6室。蒴果，顶端开裂。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部各省；多生于阔叶林下或林边阴湿处，有时山林或毛竹林下也有生长。</p> <p>药用部分：全草入药：春夏采收。</p> <p>用途：性味辛、微苦、温，有小毒。能散寒止咳，祛痰除风，治风寒湿邪头痛，咳嗽，鼻塞声重等症。又为兽类之发汗剂。用量：根5分~1钱，水煎服，研粉每用2~3分服。</p>
310	杜鹃	映山红，满山红，清明花。	杜鹃花科，石南科 <p>植物形态：半常绿灌木，高可达3米，小枝有粗短毛。叶互生，椭圆状卵形以至披针形，长2~5厘米，基部楔形，先端尖，表面浓绿色，疏生硬毛，背面有密生硬毛，在脉上尤著，夏季所生长之叶为倒卵形，以至倒披针形，能常存，不易凋落。花红色，顶生总状花序，花冠阔漏斗状，萼、花冠5裂，雄蕊7~10枚，有时更多，花药顶孔裂，子房上位，5室。蒴果室间开裂。</p> <p>生态分布：产我国长江及珠江流域各省。</p>

			<p>药用部分：根、花入药，根秋冬采收，花春季采收。</p> <p>用途：性味酸、辛，平。和血调经，跌打损伤，风湿筋骨痛，叶外敷消肿毒。用量：根5钱~1两。</p>
311	杜茎山	山茄子，踏天桥。	<p>紫金牛科</p> <p>植物形态：常绿灌木，高达2米，少分枝。叶互生，近革质，长椭圆形或狭椭圆形，长5~15厘米，宽2~5厘米，基部楔形或圆形，先端渐尖，全缘或下部全缘，中部以上有疏锯齿，无毛，叶柄长0.5~1厘米。花黄白色，腋生总状花序，萼、花冠5裂，雄蕊5枚，子房半下位，1室。特立中央胎座。浆果球形或卵形，萼与花柱宿存。</p> <p>生态分布：产我国长江中下游各省至福建、广东等地；多生于常绿阔叶林下。</p> <p>药用部分：叶、根入药，全年可采。</p> <p>用途：性味苦，寒。能祛风寒，消肿胀，治腰痛，感冒头痛，目眩。</p>
312	杠板归	豆干草，河白草，梨头刺，急解锁，老虎刺，蛇不过，刺酸浆，贯叶蓼。	<p>蓼科</p> <p>植物形态：多年生草质藤本，长达3米。茎攀缘或匍匐，细长弯曲，多分枝，小枝有棱，散生倒沟刺，淡绿色或稍带红色。叶互生，膜质，柔软，盾状三角形，长2~7厘米，宽与长相近，基部截形戟状，或微呈心形，先端钝尖，无毛，背面沿叶脉有小沟刺，叶柄长，散生倒沟刺，托叶圆形，绿色，抱茎。花绿白色，腋生短穗花序，花轴具沟刺，萼5深裂，无花瓣，雄蕊8枚，子房上位，1室。瘦果球形，蓝黑色，藏于花萼内。</p> <p>生态分布：产我中部、南部各省；多生于山坡草地，旷野及灌木丛中，村落及城镇附近常有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采用。</p> <p>用途：性味酸，平。能补血散瘀，解毒，杀虫止痒，清热止痰。治肠风下血，肛门瘙痒，鱼口便毒，下疳溃烂，砂淋，脱肛，痔疮，带下，毒蛇咬伤。用量：3~6钱。</p>
313	牡丹	洛阳花，木芍药。	<p>毛茛科</p> <p>植物形态：落叶亚灌木，高可达2米。茎皮灰色，无毛，分枝多，短而粗壮，灰黑色。叶互生，为不规则的2回羽状复叶，顶生小叶常呈3深裂，顶端裂片常具2~3粗齿牙，两侧的全缘，侧生小叶常呈卵形，作掌状3~5裂或具同数牙齿，表面深绿色，无毛，背面淡绿色被白霜，背面主脉上并疏被白色长毛。花红或白色，大型，单生于枝顶；花萼5片，绿色；花瓣有单瓣和重瓣者，变异很大；雄蕊多数，雌蕊心皮常5枚，绿色。密被细毛，幼嫩时全部为革质的花盘所包围，待心皮长大时，花盘始开裂，骨突果卵圆形。</p> <p>生态分布：特产我国西北部，现全国各地均有栽植。</p> <p>药用部分：根皮（丹皮）入药，9~11月（秋分~立冬）采集。</p> <p>用途：性味辛、苦，寒。能泻血中伏火，活血散瘀、排脓。治劳热骨蒸，惊，吐血，衄血，疮毒，跌打损伤，腰膝痛。用量：1钱5分~3钱。现代作通经药，又治高血压。</p>
314	牡蒿	流尿蒿，布菜子，齐头蒿。	<p>菊科</p> <p>植物形态：半灌木状多年生草本，高达1.4米。茎直立，上部有分枝，具细棱沟，无毛或稍微被细柔毛。营养枝上的叶匙形，长3.5~8厘米，宽3~8毫米，基部狭窄，顶端圆形，先端具齿裂成羽裂，裂片具细齿，无毛，或两面具绢质柔毛，花枝上的叶楔状匙形，长4~8厘米，基部有假托叶，先端齿裂，3裂或羽状分裂，裂片宽1.5~2毫米，有绢质柔毛或无毛，花枝最上部的叶线形，较小。花黄白色，头状花序多数聚成顶生圆锥花丛，总苞3~4层，光滑，花全部为管状。瘦果椭圆形，无冠毛。</p> <p>生态分布：产我国中南部；多生于林边、灌丛边、河边或荒山草地。</p> <p>药用部分：全草入药，3~5月采收。</p> <p>用途：性味淡、平，无毒。能清血热，肝热，治五癆七伤，感冒，中暑，高血压，咳嗽，大小便不通。用量：3~5钱，作煎剂。</p>
315	防风草	土藿香，排风草，稊草，落马衣。	<p>唇形科</p> <p>植物形态：一年生直立、分枝草本，高1~2米，茎四方形，多少被茸毛，揉之有恶臭味。叶对生，阔卵形，长4~10厘米，宽3~5厘米，基部钝，先端渐尖，边缘有不规则的钝齿。花淡紫色，轮生叶腋，呈顶生长总状或穗状花序，萼5裂，花冠管状，5裂，雄蕊4枚，2强，子房上位，4裂。小坚果4枚。</p>

			<p>生态分布：产我国南部；多生于山坡湿处，村落附近湿地。</p> <p>药用部分：全草及根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、苦，微温。能祛风解表，消肿止痛。主治风湿骨痛，感冒发热，呕吐腹痛，皮肤湿疹，瘙痒。用量：全草3钱~1两，水煎服。外用适量煎水洗患处。</p>
316	阴行草	茵陈，鬼油麻，罐子茵陈，吊钟草，黄花茵陈，土茵陈，狗牙子草。	玄参科 <p>植物形态：一年生或二年生草本，高可达90厘米。茎直立，上部分枝较多，被短柔毛。叶对生，羽状深裂，长1.2~4厘米，宽0.8~2厘米，裂片3~4对，线形，基部楔形，先端渐尖，边缘有不整齐锯齿，表面绿色，背面浅绿色，两面均具有柄的腺毛及短伏毛，叶基部下延，近于无柄。花黄色，单生于叶腋或顶生，萼筒状，5裂，花冠唇形，5裂，雄蕊4枚，2强，子房上位，2室。蒴果长椭圆形，</p> <p>生态分布：产我国东北、北部至长江流域及福建等地；多生于旷野、山坡灌丛边、荒山草地村落附近也有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、寒。能顺气化痰，发诸毒，祛暑行气，清热解毒。为治肝炎，黄疸，水肿，烫火伤的重要草药。用量：3钱~1两。</p>
317	阴地蕨	破天云，散血叶，独立金鸡，蛇不见。	阴地蕨科，瓶尔小草科。 <p>植物形态：多年生草本，连孢子叶高达35厘米。根茎粗壮，肉质，营养叶基生，黄绿色，总叶柄长1~4厘米，叶阔三角形，长8~10厘米，宽10~14厘米，先端尖，三回羽状分裂，羽片3~4对，对生或互生，基部1对羽片最大，广三角形，先端尖，边缘有不整齐细锯齿，表面稍不平，叶脉不明显。孢子叶与营养叶共生1柄上，但孢子叶柄长度远超过营养叶，孢子叶细裂，孢子囊集成圆锥状。2至3羽状裂，小穗疏松，略张开。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省至福建、台湾等处；多生于疏林中阴湿地或灌丛阴处。</p> <p>药用部分：叶入药，秋冬季采收。</p> <p>用途：性味甘、苦、微寒，无毒。能清凉解毒，平肝散结。治肿毒风热，小儿惊风，吐血，瘰癧。用量：5分~3钱。</p>
318	阴石蕨	石豆角，石蚕，石筋，石伸筋，老鼠尾，白毛蛇，白毛伸筋。	骨碎补科 <p>植物形态：常绿多年生草本，高达23厘米。根茎长而横走，密被白棕色狭鳞片。叶远生。叶柄长5~7.5厘米，基部有关节；叶片三角形，长8~15厘米，宽7~10厘米，3~4回羽状分裂；基部羽片最大，披针状三角形，5~8厘米，宽5~7厘米，其基部下向的2回小羽片最大，卵圆披针形，长2~5厘米，宽1~1.5厘米，其余各对2回小羽片长椭圆形，基部楔形，羽状深裂，裂片钝头，3~4对；叶亚革质，无毛。孢子囊群在叶背面边缘之内；囊群盖圆形，仅基部附着。</p> <p>生态部分：产我国南部各省；多生于沟谷丛林下岩石积土上，或溪边岩石积土上。</p> <p>药用部分：全草及根茎入药，全年均可采用，以秋冬季最好。</p> <p>用途：性味甘、苦，寒。能祛风除湿，清热，凉血，止血。治关节炎，血尿，腰痛，妇女白带。用量：5钱~1两。</p>
319	鸡眼草	班牛窝，人字草，抖丫草，矮脚阴阳草，伏地阴阳草，公母草，夜关门，老鸦须。	豆科 <p>植物形态：一年生草本，高20~40厘米，分枝多，枝条细长而坚硬，被毛茸。叶互生，3小叶，小叶倒卵状长椭圆形，长1~2.5厘米，宽0.2~0.6厘米，叶脉上有毛，叶柄短，托叶三角形。花浅玫瑰色，蝶形，1~2朵，腋生，萼肿状，5裂，雄蕊10枚，2体。荚果卵状圆形。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于山坡、田边、林边草地、溪边，村落城镇庭院中也有生长。</p> <p>药用部分：春夏秋采其根入药。</p> <p>用途：性味辛、寒，无毒。能利尿通淋，解热止痢，跌打损伤，清暑散痧。用量：3~4钱。</p>
320	鸡冠花	白鸡冠花	苋科 <p>植物形态：一年生草本，高达80厘米，全体无毛。茎粗壮，直立，近上部扁平，绿色带红色，有棱纹凸起。叶互生，长椭圆形至卵状披针形，长6~9厘米，全缘，基部渐狭，形成叶柄，先端尖。花红色也有白色，黄橙红紫等杂色，顶生密集穗状花序，花序轴扁化，肉质，呈鸡冠形，花被5片，雄蕊5枚，花丝下部联合，上部分离，药作丁字状着生，雄蕊1枚，</p>

			<p>子房卵圆形，花柱丝状宿存，子房上位，2心皮，蒴果，盖裂。</p> <p>生态分布：我国各地常栽培。</p> <p>要用部分：花、种子入药。</p> <p>用途：性味甘、涩，无毒。治崩漏、出血、赤白带、痔疮下血等症。用量：种子1~3钱，花3钱~1两。</p>
321	鸡矢藤	牛皮冻，臭藤，鸡屎藤，哑巴藤。	<p>茜草科</p> <p>植物形态：多年生草质藤本，基部木质化，茎缠绕攀缘，长达3米，幼茎、叶背、叶柄、花被均被灰色毛茸，老枝秃净或稍被毛，茎、叶、果揉之有鸡屎臭味。叶对生，椭圆形，长椭圆状披针形，先端渐尖，基部楔形或圆钝，表面深绿，背面浅绿，主脉显明。花白色带紫色，顶生或腋生圆锥花序，花萼狭肿状，5裂，花冠管长7~10毫米，被粉状柔毛，5裂，雄蕊5枚，子房下位，2室。果为小坚果，球形，成熟时有光泽，草黄色，果皮膜质而脆。</p> <p>生态分布：我国除东北和西北外，其余各省均有分布；多生于丘陵平地林边，灌丛中，荒山草地，沟边以及村落附近庭院边都极常见。</p> <p>药用部分：夏秋采收全草或根、茎、叶入药。</p> <p>用途：性味微甘、涩、平。祛风散湿，消痰解毒，消食化积，杀虫消肿。</p> <p>用量：5钱~1两。</p>
322	丰城鸡血藤	过山龙，毛豆结藤，猴子括屁股，猪婆藤，香花崖豆藤，弟氏崖豆藤，下巴豆。	<p>豆科</p> <p>植物形态：落叶攀缘灌木，长达5米。枝上被有褐色短毛。叶互生，奇数羽状复叶，长15~30厘米，小叶5片，具短柄，小叶片阔披针形至长椭圆形，长5~15厘米，宽2.5~3厘米，顶端小叶较大，先端长尖或钝，全缘，基部阔楔形，背脉突出，具短毛。小托叶刺毛状，不脱落，花蝶形，紫红色。顶生与腋生总状花序，并于顶端组成圆锥花丛，总梗长约8厘米，花梗长约10毫米，花长2厘米，外被丝质绒毛；萼钟形，有齿裂，花冠蝶形，雄蕊10枚，2体（9+1）；雌蕊1枚，子房上位，线形，外被丝质毛，1室。荚果长5~8厘米，宽约1.5厘米，密被淡绿色绒毛，种子1~3枚，扁长圆形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省至海南岛。</p> <p>药用部分：根入药，10~11月采集。</p> <p>用途：性味微甘、苦、温。能行气和血，治风湿筋骨疼痛。用量4~6钱，作酒剂或煎剂。</p>
323	昆明鸡血藤	鸡血藤	<p>豆科</p> <p>植物形态：常绿攀缘木质藤本，长达5米。叶互生，羽状复叶，有小叶5~9片，小叶卵状椭圆形，长5~12厘米，宽3~4.5厘米，基部圆形，先端钝，微缺，全缘，两面有网脉，小叶柄长4~7毫米。花蝶形，紫色或红色，顶生圆锥花序，萼阔钟形，5裂，旗瓣广倒卵形；雄蕊10枚，两体，子房线形，无柄。荚果线形，革质无毛。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部和西部各省；多生于山坡林边，灌丛中或沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：6月采根、茎或藤入药。</p> <p>用途：性味苦、温。能补血行血，通经活络，暖腰膝，健筋骨，为强壮药。治遗精，白浊，胃痛，月经不调，赤白带下，气血虚，腰膝麻木，痹痛等症。根为杀虫药。用量：根及藤5钱~1两。</p>
324	远志	细叶远志，细草。	<p>远志科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达30厘米。根长圆柱形，茎由基部丛生，叶互生，线形或椭圆状披针形，长2~3厘米，宽0.5~0.8厘米，基部楔形，先端尖，全缘，无柄。花紫色，顶生或腋生疏总状花序，萼片5枚，宿存，内2片较大，呈瓣状，花瓣3枚，1枚较长，呈龙骨状，雄蕊8枚，雌蕊1枚，子房略扁，上位，2室。蒴果扁平，缘有狭翅。</p> <p>生态分布：产我国东北，华北至中部各省；多生于山坡疏林下、灌丛边、荒山草地。</p> <p>药用部分：根入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味甘、温。治惊悸，健忘，咳嗽多痰，癰疽疮肿及喉痹等症。</p> <p>用量：1~1.5钱。</p>
325	连翘	竹根，黄花杆，黄奇丹。	<p>木樨科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高达3米。茎直立，枝条开展或下垂，小枝呈四棱形，节间中空不具片状髓。叶对生，单生或三小叶，卵圆形或长椭圆状</p>

			<p>卵形，长约6~10厘米，宽约1.5~2.5厘米，基部阔楔形或圆形，先端尖锐，边缘有锯齿，具叶柄，长约1厘米。花黄金色，1~3朵，有时6朵丛生叶腋，先叶开花，花萼4深裂，花冠4裂，雄蕊2枚，子房上位，2室。蒴果，狭卵形，略扁。</p> <p>生态分布：产我国东北、北部、长江流域至云南。</p> <p>药用部分：果实药用，秋后采集。</p> <p>用途：性味苦、微寒。果实为疮家常用药，有清热、解毒的功效。治一切炎性病症，如脓巴疮，淋巴腺炎，淋巴结核，丹毒，疮疖等，并为防治中风症要药。用量：1.5~3钱。</p>
326	连钱草	透骨消，甯地香，金钱薄荷，大金钱草，活血丹。	<p>唇形科</p> <p>植物形态：常绿多年生匍匐草本，高达60厘米。茎细，方形，被有短柔毛，下部匍匐生根，须根纤细；上部直立，常分枝。叶对生，叶柄长0.4~4.4厘米，叶片肾形或心脏形，长0.5~2.2厘米，宽0.6~3.2厘米，基部心脏形，先端钝，边缘有圆钝齿，表面绿色，背面较淡，两面均被有短白柔毛。花淡红紫色，2~6朵轮生叶腋，苞片钻形，花萼筒状，5齿，花冠唇形，上唇短而平展，倒心脏形，下唇有3裂片，蕊4枚，2强，子房上位，4裂。果为4小坚果。</p> <p>生态分布：产我国陕西至长江流域南部各省；多生于山坡林边，溪边草地。</p> <p>药用部分：全草药用，全年均可采收。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能活血通络，解热利尿，祛风止痛。治感冒咳嗽，风湿麻木，筋骨疼痛，跌打损伤，黄疸，肺痈，腮腺炎等症。用量：5钱~1两。</p>
327	灵芝	紫芝	<p>多孔菌科</p> <p>植物形态：腐生真菌，生于枯腐树木的根际。菌盖（子实体）肾脏形，黑褐色、赤褐色或暗紫色，有如漆的光泽，菌盖下面有许多细孔，呈白色或淡褐色，称为管孔面。菌柄长圆柱形而稍弯，表面黑色，也有如漆的光泽，菌柄附于菌盖的侧方。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于阔叶林下阴湿处枯树基部，近年已有人工繁殖。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味淡、温。为强壮剂。用治神经衰弱，头昏，消化不良等慢性疾病，并治痔疮，胃痛。用量5分~1钱。</p>
328	皂荚	皂节，皂角。	<p>云实科，豆科。</p> <p>植物形态：落叶乔木，高达15米左右。树皮黑褐色，粗糙，树干具有粗壮棘刺，刺呈圆锥形，常分枝，小枝淡褐绿色，无毛。叶互生，通常为1回偶数羽状复叶，长12~18厘米，叶轴圆形，疏被褐色短柔毛，小叶4~7对，互生或近对生，小叶片卵形至卵状披针形，或长椭圆状卵形，偶为倒卵状椭圆形，长3~7厘米，宽1.5~3厘米，基部楔形或宽楔形，或近圆形，常偏斜，先端钝或稍锐，表面黄绿色，背面淡绿色，两边沿主脉均有褐色短柔毛，表面主脉上较密，侧脉和细脉连结成网状，并明显隆起，边缘具钝锯齿，厚纸质，小叶柄短或无柄，被短柔毛。花黄白色，杂性，顶生总状花序，萼、花瓣均4片，雄蕊8枚，子房广线形，扁平。荚果扁长而弯，紫黑色，革质而有光泽。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于山坡疏林内和郊野村落附近及河边，长单株生长。</p> <p>药用部分：皂角刺及其干燥成熟的荚果，又干燥种子（皂角子）入药，夏秋采收。</p> <p>用途：皂荚果性味辛、咸、温，有小毒。能消炎破坚，通窃，搜风，杀虫。治中风口噤，急喉痹，痰喘肿满等症。皂角刺性味辛、温。能消肿毒，恶疮，治麻风。用量：刺5分~3钱，荚与子8分~1.5钱。</p>
329	旱莲草	水旱莲，莲子草，墨斗草，墨烟草，全陵草，猪牙草，冰冻草。	<p>菊科</p> <p>植物形态：一年生草本。茎斜立或匍匐状，多分枝，高达60厘米，绿色或紫红色，全株被毛。叶对生，线形，长椭圆形至披针形，长1~5厘米，宽0.5~2厘米，基部渐狭，先端短尖或钝，全缘或稍具浅齿，表面绿色，两面均有白色粗茸毛，无叶柄，茎叶折断后，端面逐渐变黑。花白色，腋生或顶生头状花序，常2~4个丛生，总苞2列，每列4~5枚，舌状花生于</p>

			<p>花序外围，中央为管状花。瘦果扁椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至西南各省；多生于山坡原野、田边、路旁、村落、城镇庭院湿地也有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，秋夏采收。</p> <p>用途：性味甘、酸、凉。能乌须发，止血排脓，固齿，凉血。治血痢，偏正头痛，眼疾，尿血，肠风，痔漏，牙痛。用量5钱~1两。</p>
330	吴茱萸	吴于，吴萸	<p>芸香科</p> <p>植物形态：落叶小乔木，高达8米。树皮青灰色或褐色，被黄褐色长绒毛，具圆形或椭圆形而细小的皮孔。叶对生，奇数羽状复叶，连叶柄长18~40厘米，叶轴长16~32厘米，浑圆或上部微具棱，被淡黄褐色柔毛；小叶5~9片，对生，椭圆形至卵形，或卵状长椭圆形，长5.5~15厘米，宽2.8~6.5厘米，基部楔形，宽楔形或几为圆形，顶端短尖或骤尖，有时为渐尖，表面深绿色，带光泽，干后常呈暗褐色，疏生短柔毛，脉上较密，背面绿色，密被白色长柔毛，脉上最密，具粗大透明的油腺点，侧脉常不明显，边缘近全缘，或具极不明显的圆锯齿，厚纸质，小叶柄长2~5毫米，顶生小叶柄长可至1.5~3厘米，被柔毛。花白色，单性异株，顶生聚伞状圆锥花序；萼、花瓣、雄蕊均4~5枚，子房上位，深4裂，4室。果为蒴果状。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省至福建、广西、云南等地；多生于疏林下，或林缘矿地上和谷地溪边。</p> <p>药用部分：未成熟果实入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、温。能温中散寒，下气止痛。治脘腹胀满疼痛，呕吐吞酸，头痛，疝痛，泄泻等症。亦有浸酒作碘酒代用品。用量：1~3钱。</p>
331	谷精草	谷精珠，珍珠草，酒饼草，文星草，鼓槌草，流星草。	<p>谷精草棵</p> <p>植物形态：水田中水生、一年生草本，根白色，须状。叶数十片丛生，近直立，线状披针形，长约2~3厘米，宽1.5毫米，基部多脉，具透明横沟，先端锐凿形，花茎较叶为长，数条聚生，高6~12厘米，有5条纵沟，稍扭卷；鞘长1~2厘米，先端白膜质；二斜裂，花球状卵形，由多数苞片紧密排列而成，生于花茎顶端，上被有白色柔毛，总苞片倒卵状长椭圆形，较花短，白色膜质；雄花的外花被片合成佛焰苞状，先端成三齿缘，内花被筒状愈合，先端三裂，裂片披针形，雄蕊6枚，白色，雌花的外花被3片，狭线形，离生，内花被片缺，子房3室，有柄，花柱长，先端3裂。蒴果倒卵形。</p> <p>生态分布：产我国山东至广东各省；多生于水田、浅水泽中。</p> <p>药用部分：花穗入药，秋末采花，阴干备用。</p> <p>用途：性味辛、甘，微温。有消炎，利尿，镇痛作用。为清凉性明目药，专治眼翳膜及各种炎性眼病，煎汁内服或洗眼均有效，对感冒性喉头炎及各种热病所致之头部疼痛，亦有疗效。用量3~5钱。</p>
332	君迁子	软枣，红兰枣。	<p>柿树科</p> <p>植物形态：落叶乔木，高达14米。树皮暗黑色，深裂，成方块状，嫩枝具黄色柔毛。叶互生，革质，全缘，椭圆形至长圆形，长6~12厘米，基部圆形至阔楔形，表面初时生柔毛，后渐脱落，背面灰色与苍白色，在侧脉上稍有短柔毛。花单性，异株，淡黄色至淡红色，萼4裂，壶状，花冠筒状，先端4裂；雄花2、3朵集生，雄蕊16枚；雌花子房上位。浆果长椭圆形，黄色渐转为黑色，常被白粉状物，基部具增大而宿存的花萼。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至西南各省；多生于山坡阔叶林中。</p> <p>药用部分：果实供药用，秋季采收。</p> <p>用途：性味甘、涩，平。有治消渴，去燥热之功效，并可用制柿漆作雨具涂料。</p>
333	李	野苦李	<p>蔷薇科</p> <p>植物形态：落叶小乔木，高可达8米。树皮灰褐色，粗糙，小枝褐色，无毛而且光泽。叶互生，倒卵形，椭圆状倒卵形或卵状披针形，长5~8.5厘米，宽2~3.5厘米，基部楔形，并下延成柄，先端短骤尖或渐尖，表面深绿色，幼时在主脉上疏生白色柔毛，后渐脱落，背面淡绿色，脉间具淡褐色丛生柔毛，边缘具细密圆钝重锯齿，两侧基部连叶柄处具腺点数粒，叶柄长0.8~1.5厘米，上面中央具沟，光滑无毛。花白色，常数朵丛生，花萼、花冠5片，雄蕊多数，子房光滑无毛，上位，1室。核果球状卵形，</p>

				<p>顶端尖，基部深陷，具沟线，熟时黄色或紫红色，表面披白粉一薄层，核扁。</p> <p>生态分布：我国中部和南部各省栽培。</p> <p>药用部分：果实、核仁、叶、枝、根入药，夏季采收。</p> <p>用途：果实性味酸、苦，微温。治骨节间劳热，胃痛呕恶。核仁性味苦、平。能活血祛瘀，滑肠，利水。治跌打损伤，瘀血作痛，水气浮肿，大便燥结等症，孕妇忌用。根白皮性大寒。治消渴，赤白痢，妇人带下等症。花芳香味苦。去粉刺黑斑，叶性味甘、酸、平。治小儿壮热。树胶性味苦、寒，定疼消肿。治目翳。用量：果3钱~1两，核仁2~4钱。</p>
334	辛夷	木笔，木兰，望春花，紫玉兰，春花。	木兰科	<p>植物形态：落叶灌木，高达3米。多分枝，树皮灰白色，平滑。叶互生，广倒卵形，基部渐狭，先端急尖，全缘，表面平滑无毛，背面沿叶脉有细毛，具叶柄。花先叶开放，单生于枝顶，大形，紫色，花瓣多不开展，几为直立状，萼片3枚，形小，绿色，早落，花瓣6枚，每3枚为一轮，雄蕊多数，心皮多数，螺旋状排列在伸长的花托上，子房卵形，外面平滑无毛。骨突果长椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国中部各省，各地均有栽培。</p> <p>药用部分：未开放的花苞入药，1~2月采集。</p> <p>用途：性味辛，温。能散上焦风热。治感冒头痛，鼻窦炎等。用量：8分~1钱5分。</p>
335	玉兰	辛夷，木笔花，紫玉兰。	木兰科	<p>植物形态：落叶乔木，高达15米。树冠卵形，分枝多，幼枝有毛，有显著的环状托叶痕。叶互生，叶柄长1~2.5厘米，被柔毛，叶片倒卵状长椭圆形，长8~16厘米，宽5~10厘米，基部渐尖，先端阔而突尖，全缘，表面绿色，脉上被疏毛，背面淡绿色，被灰白色柔毛。花大，外紫内白或白色，单生枝顶，先叶开放，杯状，直径10~15厘米，萼与花瓣相似，9片，雄蕊多数，心皮多数，卵形，聚生于延长的花托上，骨突果圆筒形，木质，长7~10厘米。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于阔叶林中或山坡疏林中。</p> <p>药用部分：2月采花蕾晒干或阴干入药。</p> <p>用途：与辛夷用。</p>
336	豆薯	葛薯，地瓜，土瓜，凉瓜，地萝卜，凉薯，沙葛。	豆科	<p>植物形态：一年生草质藤本，地下有肉质块根，肥大，圆锥形或纺锤形而具4~6棱，根皮淡黄色，富有纤维，易剥去，肉白色，味甜多汁，茎缠绕状，有毛。叶互生，具长柄，小叶3片，长宽几相等，顶端一片宽达10厘米，有时可达15厘米，菱形，两侧小叶较小，有短柄。不对称，叶脉由基部三出再作羽状分歧，在背面隆起，生伏状细柔毛，表面全部有毛，花蓝紫色或淡紫红色，蝶形，3、4朵腋生总状花序，萼钟形，5裂，雄蕊10枚，两体，子房有毛。荚果棕褐色，表面平滑有光泽。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省。</p> <p>药用部分：块根入药，9~10月采收，鲜用。种子有毒供药用，在9~12月采收。</p> <p>用途：块根性味甘、微凉，无毒。能止渴，解酒毒。种子有毒，可作杀虫剂，对治防烟、甘蔗、棉蚜虫有效。用量：块根鲜品4~8两。</p>
337	赤小豆	赤豆，红豆，芳紫赤，米赤。	豆科	<p>植物形态：一年生草本。茎直立，高达75厘米，茎上有显著的长硬毛。叶互生，三出复叶，具长柄，托叶为略偏的线形，着生于基部，顶生小叶卵形或菱状卵形，中部以下宽大，长4~10厘米，全缘或有三浅裂，叶先端短急尖或渐尖。花黄色，蝶形，2~12朵，腋生于短的总花梗上，萼下有小苞片，长于萼的二倍，萼5裂，雄蕊10枚，两体。荚果圆柱形，长6~12.5厘米，含6~10粒种子。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：6~7月采集种子供药用。</p> <p>用途：性味甘、微酸、平。有利水行血，消肿排脓等功效。治水肿脚气，泻痢，痈肿等症。用量：3~5钱。</p>
338	赤车使者	细水麻叶，石边采，楼梯草，小白	荨麻科	<p>植物形态：多年生草本，高达40厘米。根茎短，多肉质，带红色，须根多，茎斜上。叶互生，斜卵形或斜椭圆形，长4~9厘米，宽2~4厘米，基</p>

		沙。	<p>部不对称，先端呈长尾状，锐尖，边缘有粗锯齿，无柄。花黄白色，单性，密生叶腋，花萼4枚，雄蕊4枚，子房上位。瘦果细小，卵形，表面有皱纹。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于山坡、林边湿地或沟谷灌丛边。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采集。</p> <p>用途：性味辛、苦、温，有毒。风冷邪疟，蛊毒症瘕、五脏积气，恶风冷气。用量：3~8钱。</p>
339	芡	刺莲，鸡头菱	睡莲科 <p>植物形态：水生，一年生巨大草本。全体生有刺针，地下茎粗壮而短，生有多数须根。叶数片丛生，具有刺的长柄，叶片圆盾形或盾状心形，浮于水面上，大的直径可达1~2米许，小的直径20厘米左右，表面有皱纹，边缘向上卷折，呈盘状，表面绿色，背面带紫色；叶脉隆起成网眼，上有细毛，两面叶脉上均有小刺：由种子生出的沉水叶，膜质，箭形而小，次出的叶为椭圆形，一侧有缺罅，以后生出的叶逐渐大形，缺罅亦逐渐少，终于形成大形的圆盾形叶。花紫红色，单生于花茎顶端，花蕾似鸡头状，有长而多刺的圆柱形花茎，花昼开夜闭。花萼4片，花瓣多数，雄蕊多数。子房下位，心皮8个，嵌入于膨大的花托顶端，柱头圆盘状，扁平略向下凹入，花托长大与心皮能结成球形多刺的海绵状浆果。种子外有肉质假种皮。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省。</p> <p>药用部分：种仁（名芡实）、根、叶入药，9~10月（秋分至霜降）采收。</p> <p>用途：种子性味甘，平。能补脾益肾，涩精。治大便溏泄，小便失禁，遗精，带下，白浊及腰腿关节疼痛。茎性味咸、甘、平，无毒。烦渴，除虚热。根性味与茎同，治小肠结气痛，偏坠气块。叶性味甘、平，无毒。用于胎衣不下。用量：根、种子3~6钱；叶5钱~1两。</p>
340	苋菜	红苋，青香苋。	苋科 <p>植物形态：一年生草本，高60~90厘米或更高。茎直立，多分枝，绿色或红色。叶互生，变异极大菱状广卵形或三角状广卵形，长5~13厘米，宽3~7厘米，基部阔楔形或渐狭，有长叶柄，先端圆钝或长尖，全缘或紫红色，叶脉在两面明显突起。花黄绿色，单性顶生或腋生穗状花序，顶端花序较长，苞片匙形，有芒刺，花萼3枚，膜质，披针形，雄蕊3枚，雌蕊1枚，柱头3裂。胞果盖裂，种子黑色，有光泽。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：全草及果实入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、寒，无毒。能利大小肠，祛风杀虫，止痒，解毒。子治眼雾昏花，青盲白翳，根治红白痢及痔疮。用量：种子3~4钱，根、梗5钱~1两。</p>
341	芥菜	青菜	十字花科 <p>植物形态：一年生高大草本，高可达1.5米。全株有辛辣味，茎直立，有多数上升的分枝。叶多有缺刻，基生叶，颇大，存在不久，长圆形，阔长椭圆形至倒卵形，长15~35厘米，宽7~18厘米，先端钝，边缘具粗重锯齿或粗齿，不分裂或羽状分裂，具长柄，无毛或下面疏生刺毛，茎生叶互生，柄短，叶形往上渐渐变小，呈披针形至线形，不抱茎，边缘有缺齿。花黄色，十字花冠，顶生总状花序组成为圆锥状花丛，花萼4枚，花瓣4片，雄蕊6枚，4强，雌蕊由2心皮合成，子房上位，2室。长角果具喙。</p> <p>生态分布：我国各地均普遍栽培。</p> <p>药用部分：种子入药，4~5月采集。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能消肿毒，止血痢，平肝，明目。治目中云翳及流痰等症。用量：1~5钱，炒香研末用。</p>
342	芹菜	旱芹	伞形科 <p>植物形态：一年生或二年生草本。秃净，具圆锥根和多数的支根，全体有强烈香味。茎直立，高50~150厘米，具菱角和直槽。根生叶为奇数羽状复叶，具长总轴，小叶3~5对，每一小叶再3裂，裂片近菱形，长约1厘米，边缘具圆锯齿或锯齿，小叶柄长1~2厘米；茎生叶通常为楔形，全裂或条裂。花白色，顶生复伞形花序，无总梗或具短总梗，萼、花瓣、雄蕊均5枚，子房下位，2室。双悬果近圆形至椭圆形，果菱5条。</p>

			<p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：全草入药，冬、春季采收。</p> <p>用途：性味甘、淡、平，无毒。能散寒止咳，清热。治风寒咳嗽及痈肿，高血压。用量：3~5钱，外用酌量。</p>
343	芦荟	奴芸	<p>百合科</p> <p>植物形态：多年生常绿草本，茎极短。叶丛生于茎顶，直立或近于直立，肥厚多汁，呈狭披针形，长15~36厘米，宽2~6厘米，基部宽阔，先端长渐尖，粉绿色，边缘有刺状小齿。花黄色，有赤色斑点，花茎单生或分枝，高60~90厘米，总状花序，花下垂，花被管状，6裂，雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果三角形，室背开裂。</p> <p>生态分布：我国各地栽培。</p> <p>药用部分：叶中流出的液汁入药。全年可采。</p> <p>用途：性味苦、涩、寒。治惊痫，便秘，外用捣烂取汁，涂汤火伤及疥疮。用量1~3分。</p>
344	芦苇	白马草，芦草。	<p>禾本科</p> <p>植物形态：多年生高大草本，具粗壮的地下匍匐茎；秆直立，高2~5米，中空，表面平滑，常有白粉。叶二列式互生，具抱茎的叶鞘，叶片线形，披针形，扁平，长15~60厘米，宽2~5厘米，光滑或边缘粗糙。叶舌长1~2毫米，成一轮毛状。花紫色或淡黄色，穗状花序组成为顶生圆锥花序，长达40厘米，小穗线状披针形，有小花3~7朵，颖不等长第一颖长约为第二颖之半或更短，外稃无毛，基盘具丝状长毛。颖果椭圆形与内外稃分离。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于浅水中。</p> <p>药用部分：花、根茎、秆入药，秋冬采收。</p> <p>用途：性味甘、寒。根茎为利尿、健胃、解毒药，并有清凉镇呕作用，用于一切热病之口渴及小便赤涩，能溶解胆液凝石，治黄疸，急性关节炎等。又可用为食鱼、蟹、河豚中毒解毒药。用量：根茎5钱~1两。</p>
345	芭蕉	板蕉，牙蕉。	<p>芭蕉科</p> <p>植物形态：多年生直立宿根高大草本，高3~4.5米。根茎块状肥大。侧根横走，有较粗的须根。叶鞘包叠，形成假茎，径约20厘米，叶巨大，螺旋状排列，厚纸质，鲜绿色，初生时为卷旋状直立向上，逐渐向外平伸开展，长椭圆形，长达3米，宽达40厘米，基部圆形，先端钝尖，边缘微波状，中脉粗壮隆起，宽约2厘米，侧脉多数平行，叶柄粗壮。花黄色，单性，穗状花序似猪心形，花生于花茎顶端，弯垂，佛焰苞红褐色，萼片3枚，花冠2唇形，雄蕊6枚，子房下位，3室。浆果三棱形。</p> <p>生态分布：原产我国南部，现全国各地均栽培。</p> <p>药用部分：根、茎、花蕾。夏秋季采收。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。根利尿，解毒，消肿，安胎。用量：根1~2两。</p>
346	茺花	金腰带，兰腰带，棉丝柴，奸雀子饭。	<p>瑞香科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高可达1米，茎直立多分枝，幼时被细柔毛，皮富纤维，不易折断。叶对生偶有互生，椭圆形至长椭圆形，长2.5~5厘米，先端急尖，基部楔形，全缘，幼时叶两面全被短柔毛，老时渐脱落，仅叶背沿脉有细毛，叶柄短，亦被柔毛。花淡紫色，先叶开放，3~7朵丛生，几满树皆花，萼呈花冠状，萼筒细瘦被丝状细柔毛，花瓣缺，雄蕊8枚，2裂，子房上位，1室。核果，熟时白色。</p> <p>生态分布：产我国中部及江南各省至福建。</p> <p>药用部分：根及花药用，花春季采收，根秋季采收。</p> <p>用途：花性味苦、辛、温，有小毒。能杀虫鱼，宽胸消痰，泻水，解毒，催生，止血活血，消肿，开郁疏风，拔毒生肌。用量：花0.5~1钱。</p>
347	苍术	赤术，茅术，术，南苍术。	<p>菊科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达70厘米。全体光滑无毛，根茎粗肥，长3~10厘米，直径1~2厘米，茎直立，通常单一，有时上部分枝圆形而有纵棱，下部木质化。叶互生，革质，下部叶多在花期前凋落，3浅裂，裂片先端尖，顶端一裂片较大，卵形，两侧裂片较小，基部多成楔形，无柄而略抱茎，茎上部叶卵状披针形至椭圆形，长3~5.5厘米，宽1~1.5厘米，基部渐狭近于无柄，先端短尖，叶缘均具有刺状齿。花白色，有时稍带红紫色，顶生头状花序基部具苞状叶1轮，与头状花序等长，羽状分裂，总</p>

				<p>苞圆柱形，具有5~7列复瓦状的膜质苞片，边缘带紫色并有细柔毛，花托平坦，其上着生白色管状花。瘦果圆筒形，冠毛橙黄色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域中下游各省至山东等地；多生于山坡林边，灌丛或草丛中。</p> <p>药用部分：根茎入药，在3~4月或9~10月采集。</p> <p>用途：性味苦、辛、温，无毒。为祛风湿，强壮补养药。能健脾，燥湿发汗；治慢性肠胃炎，食欲不振，泄泻胀满，风寒湿痹，夜盲等症。此外可作发汗剂及香料。用量：1~3钱。</p>
348	苍耳草	苔耳，老苍子，卷毛子。	菊科	<p>植物形态：一年生粗大草本，高30~90厘米，茎粗糙，微有棱条，茎基部常中空，内有“苍耳囊虫”1条，全体被有白色短毛，上部茎绿色有紫色条斑。叶互生，广卵形或卵状三角形，长6~16厘米，宽5~10厘米，基部心脏形，先端尖，边缘有不规则的锯齿或3浅裂，主脉3条明显，表面绿色，粗糙，有短毛，叶柄长2~6厘米。花单性，雄花淡黄色，雌花绿色，头状花序，雄花序球状，顶生，花冠管状，5裂，雌花序位于下部，卵形，总苞有刺沟，内有小花2朵，无花冠。瘦果长卵形，包藏于有刺沟的总苞内，顶部有直或弯曲的喙。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于荒地、原野、路边及村落、城镇旷地。</p> <p>药用部分：全草、果实、根及囊虫均入药，秋冬采收。</p> <p>用途：果性味甘、温；根性味微苦、平。果实为发汗，利尿，解热，排毒药。有镇痉，镇痛作用。治肌肉神经麻痹，关节痛，水肿等病。茎、叶捣烂涂疥癣，湿症，虫伤。对麻风病及痢疾有疗效。近有用根治高血压。用量：全草1~1.5两；根5钱~1两；果实2~3钱。</p>
349	苍耳七	白须草，白侧耳根，水侧耳根，诗人草。	虎耳草科	<p>植物形态：多年生常绿草本，高20~30厘米。根茎粗短，须根众多。基生叶丛生，常4~8叶，具有长叶柄，叶片肾脏形或稍呈圆形，基部心脏形至深心脏形，先端圆、短急尖或微凸尖，全缘。花淡黄色，单生茎顶，花萼5片，基部多少联合且与子房合生，宿存，花瓣5片，边缘流苏状细裂，雄蕊5枚，退化雄蕊5枚，子房卵状椭圆形，上位，3心皮，1室。蒴果长椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至贵州；多生于沟谷林边湿地及溪边草地。</p> <p>药用部分：全草入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味温、淡。能清湿热，止血。用量：5钱~1两。</p>
350	花点草	幼油草	荨麻科	<p>植物形态：多年生小草本，高达20厘米。基部分枝，具匍匐茎，茎细弱，稍透明状，具有上向的毛。叶互生，菱状卵形或稍三角形，长和宽几相等，约1~2厘米，基部阔楔形至截形，先端钝，边缘具粗钝圆锯齿，表面疏生长毛和点状突起。下部疏生小柔毛。花绿色，单性，雄花为聚伞花序，着生于枝梢，雌花丛生于上部叶腋，雄花花萼5裂，雄蕊同数，雌花花萼4裂，内包雌蕊1个。瘦果卵状，有点状突起。</p> <p>生态分布：产我国中部、南部各省；多生于山林下湿地、沟谷阴湿岩缝处。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味酸、温。治咳嗽痰血，兼有潮热。用量1~2两。</p>
351	花榈木	鸭公草，三钱三，青龙捫地，青竹蛇。	豆科	<p>植物形态：常绿乔木，高5~10米或更高。树皮平滑，褐色，嫩枝密被灰黄色短茸毛。叶互生，革质，奇数羽状复叶；小叶5~9片椭圆形、长椭圆形或长椭圆状披针形，长5~12厘米，宽2~5厘米，基部椭圆或楔形，先端尖，全缘，叶背密被灰黄色短茸毛。花蝶形，黄白色，腋生或顶生圆锥花序或为顶生总状花序，萼陀螺形，5裂，旗瓣近圆形，具柄；子房边缘有疏长毛。荚果扁平，末端稍为喙状，种子红色。</p> <p>生态分布：产我国东部和南部；多生于常绿阔叶林中，或残存于杉木林及竹林中。</p> <p>药用部分：叶、茎、根入药，全年可采。</p> <p>用途：性味辛、温，有毒。治产后恶露冲心，症瘕结气，赤白漏下，冷嗽，血丝虫病。又用于跌大损伤，骨折，难产等。用量：根2~3钱。</p>

352	麦斛	石蚊虫，石仙桃， 黄豆鞭，楼上楼， 果上叶，小扣子 兰，七仙桃，根上 子。	兰科 植物形态：多年生常绿草本。附生于悬岩或阴湿沟谷岩石上，须根丝状。匍匐横走，疏分枝，质硬，假鳞茎似小桃状，卵圆形，长0.5~0.8厘米，有皱沟。叶生于假鳞茎顶端，每鳞茎生叶1枚，叶亚革质，倒卵状椭圆形或倒卵状长椭圆形，长1~3.5厘米，宽0.6~8厘米，先端圆钝或凹头，基部狭窄，叶脉7~9条，中脉陷下，叶柄短。花白色，花被5枚，2轮，外轮3枚，内轮2枚，唇瓣短小，卵形，和蕊柱基部的突起相连，蕊柱短粗，药盖半球形，花粉块两颗，子房下位，1室。蒴果。 生态分布：产我国长江流域各省；多生于山林中悬岩上或树皮上，或生于瀑布附近阴湿的悬岩上。 药用部分：全草入药，全年可采。 用途：性味甘、辛、寒。能清热，清瘀，活血，化痰止咳。治风湿痛，月经不调，头晕痛，干咳，牙痛。用量：1~5钱。
353	麦门冬	大麦门冬，麦冬， 门冬，	百合科 植物形态：多年生常绿草本，地下具匍匐根茎，须根细长，中有膨大，呈纺锤形块根。叶多数丛生于基部，线形或线状披针形，长约15~30厘米，宽2~6毫米，基部渐狭，先端钝，具细叶柄，有膜质稍，叶片深绿色，光滑无毛。花淡紫蓝色，生于伸长的花茎上，疏生于稍弯垂的总状花序，花被6片。雄蕊6枚，子房上位，3室。浆果，球形，熟时兰黑色。 生态分布：产长江流域各省；多生于阔叶林下阴湿处，沟谷灌丛或草地中。 药用部分：块根供药用，立夏至芒种间采集。 用途：性味甘、平，无毒。为养阴生津，化痰止咳。治虚劳咳逆，燥咳吐血，咳血，衄血，热性病口干烦渴，津伤，便秘等症。民间用于催乳。 用途：3~5钱。
354	阔叶麦冬	麦门冬	百合科 植物形态：多年生草本。根茎短，地下须根细长，尖端常膨大成纺锤形，肉质小块根。叶亚革质，丛生，线形，长20~45厘米，宽0.8~1.2厘米，或更宽，基部渐狭，先端钝，边缘全缘，两面深绿色，有光泽。花淡紫色，顶生总状花序，生于由叶丛中抽出的花茎上，花被6片，雄蕊6枚，子房上位，3室。浆果球形，熟后紫黑色。 生态分布：产我国长江流域至西南各省；多生于阔叶树林下或沟谷丛林下阴湿处。 药用部分：块根入药，农历3~4月采挖。 用途：性味甘、平，无毒。能强阴益肾，消谷调中，保神定肺气，安五脏，去心热，止咳嗽。治心腹结气，口干燥渴，呕吐，热狂头痛，浮肿，泻精，乳汁不下，齿缝出血，男女血虚。用量：3~5钱。
355	沿阶草	麦门冬、麦冬、小 叶麦冬，韭叶麦 冬。	百合科 植物形态：多年生常绿草本，根茎短，须根长而多，有膨大呈椭圆形的块根。叶多数丛生根部，狭线形，长10~20厘米，宽2~3毫米，基部有膜翅状边缘，先端尖锐，表面暗绿色，背面稍淡，均平滑无毛。花青紫色，总状花序生于花茎顶端，花被6片，雄蕊6枚，子房下位，3室。浆果球形，未熟时呈碧蓝色，熟后变紫黑色。 生态分布：产我国南北各地；多生于山坡灌丛下阴湿处，城镇庭院中常栽培。 药用部分：谷雨前后采掘根入药。 用途：药用同麦门冬。
356	岗松	香柴，扫帚子。	桃金娘科 植物形态：常绿灌木，多分枝，全体无毛，高可达3米，一般荒山上由于每年砍伐的原故，高仅达60厘米。小枝纤细，线形。叶细小，对生，线状锥尖，直立或扩展，长5~10毫米，宽0.3~0.5毫米，表面有槽，背面隆起，有透明的腺点，揉之有香味。花白色，细小，单生于叶腋，花柄长1~1.5毫米；萼钟形，5裂，花瓣5枚，雄蕊10枚，子房下位，3室。蒴果由上部室裂，种子有棱角。

			<p>生态分布：产我国南部各省，东部沿海达浙江南部；多生于红壤幼松林下与芒萁等耐旱植物生在一起。</p> <p>药用部分：根、叶入药，根秋冬采收，叶全年可采。</p> <p>用途：性味辛、温，有芳香。叶内含有挥发性香油，马来亚一带用于叶作治热病的一种香茶。用量：根5钱~1两。</p>
357	肖梵天花	野棉花，地桃花，千下缢。	<p>锦葵科</p> <p>植物形态：草本或落叶亚灌木，高约1米。变异极大，多少被柔毛。叶互生，具叶柄，下部的近圆形，上部的较狭，长椭圆形至披针形，长3~9厘米，基部心形，掌状3~7脉，边缘有锯齿，或3~5浅裂，裂口阔，背面主脉基部有1腺体。花淡红色，单生或稍丛生于叶腋，小苞片约与萼等长，均被星状柔毛，萼、花瓣均5枚，雄蕊多数，下部联合，子房上位，5室。蒴果扁球形，具刺毛。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于山坡林边，荒山草地。</p> <p>药用部分：根、叶供药用，6~10月采。</p> <p>用途：性味微甘、涩、平，无毒。能去风除湿，活血止血，健脾益虚。</p> <p>用量：根1~2两。</p>
358	梵天花	野棉花	<p>锦葵科</p> <p>植物形态：本植物是肖梵天花的1个变种，主要区别是叶3~5掌状深裂，裂片倒卵形或菱形，基部极狭。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于山坡林边或沟谷丛林边，溪边或荒山草地中。</p> <p>药用部分：根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味涩、凉，无毒。去风除湿，活血止血，健脾益虚。</p>
359	园（圆）柏	柏树，桧树。	<p>柏科</p> <p>植物形态：常绿乔木，高可达20米。枝条斜上开展，树皮赤褐色，幼时呈薄片状剥落，至老则为浅纵裂而成长狭条状剥落。叶具两型，针状叶3片轮生，极少对生，长7~9毫米，表面略凹下，具两白色气孔线，鳞状叶对生，呈狭四方形，顶端钝，紧密排列，形成一四角形的幼枝，长约1.2~1.5毫米，两种叶片均呈嫩绿色，在幼树时为针状叶占多数，至老令树上以鳞状叶片较显著。花单性，异株或很少同株，花序单生于小枝顶端，雄花黄色，卵状椭圆形；雌花球状卵形，由3~8片对生或轮生的三角状形成胚鳞所组成，胚鳞内藏1或2枚直立胚珠，也有不具胚珠的鳞片。胚鳞发育成为种鳞，种鳞合生成浆果状圆球形的球果，成熟时绿褐色，外被白粉。</p> <p>生态分布：产我国中部各省。</p> <p>药用部分：枝、叶及树皮入药，全年或夏秋季采用。</p> <p>用途：性味辛、温，有毒。能杀虫，辟秽，散结，解毒，为尿道消炎药。治淋病，肺癆。兽医用枝、叶及树皮治膨胀症。用量：1~2钱。</p>
360	园（圆）叶节节菜	水菹菜，水松叶，狗牙齿，水指甲，水串。	<p>千屈菜科</p> <p>植物形态：多年生水泽草本。下部伏地或沉入水中生根，常丛生，茎高5~30厘米，全体无毛。叶对生，无柄或具短柄，圆形，倒卵形至阔长椭圆形，长5~10毫米。花极小，淡紫红色，单生于苞片内近于无柄，为顶生稠密的穗状花序1~3个，长1~4厘米，苞片卵形或长圆形，长约与花相等长；萼钟形，4裂，三角形，短尖，花瓣4枚，倒卵形，长为萼齿的2倍；雄蕊4枚，子房上位，2室。蒴果椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国南部；生于浅水泽、水沟或水田中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋季采用。</p> <p>用途：性味涩、凉，无毒。能清热解毒，通便消肿。治牙龈肿痛，痈毒，痔疮及火淋、热痢，狗咬伤等症。用量：5钱~1两。</p>
361	泡桐	水桐树，空桐木，花桐，桐，荣桐。	<p>玄参科</p> <p>植物形态：落叶乔木，高达10米。叶对生，薄革质，卵形，卵状长椭圆形或心脏形，长17~20厘米，宽12厘米，基部心脏形，先端尖或短尖，表面暗绿色，背面密被淡黄色或白色茸毛，叶柄长9~12厘米。花白色有紫色斑点，顶生聚伞状圆锥花序，萼钟形，5裂，花冠管状，二唇形，5裂，雄蕊4枚，2强，子房上位，2室。蒴果卵形，种子细小，有翅。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于向阳山坡，林边或沟谷林边，村落或城镇中常有栽培。</p> <p>药用部分：根、叶、花入药，花春季采收，叶夏季采收，根秋季采收。</p>

			用途：性味苦、寒。能消肿，去风解毒止痛。用量：根5钱~1两。
362	油桐	三年桐，罌子桐，桐沙树，虎子桐。	大戟科 植物形态：落叶小乔木，高可达7米。树皮平滑灰色，上部多2~3叉状分枝。叶互生，革质，卵状心脏形，基部心形或截形，与叶柄连接处有红紫色杯状无柄的腺体，先端渐尖，有时具3浅裂，叶长10~15厘米，宽6~14厘米。花白色，单性同株，先叶开放，为圆锥状复聚伞花序，密生于小枝端，每小枝有一雌花，萼片2裂，绿色，花瓣5片，白色，基部具橙红色斑点和条纹；雄花有8~10雄蕊；雌花子房有毛，上位，4室，具4柱头。核果近球形，顶端急尖，内有种子3~5颗。 生态分布：产我国长江以南各省。 药用部分：叶、根、花，种子入药，夏秋采收。 用途：根性味甘、微辛、寒，有小毒。能催吐消肿，杀疥癣虫。治食积饱胀及湿气水肿等。又为膏药原料。用量：根4~6钱。
363	油菜	芸苔	十字花科 植物形态：冬季一年生草本，高1米左右。茎上部分枝，光滑无毛。茎生叶开展，呈倒卵形或广倒卵形，全缘或仅有钝圆齿或波状齿牙，基部渐狭而呈显明的叶柄，茎生叶长圆形或披针形，无柄，耳状抱茎。花黄色，顶生总状花序，初时为伞房状，后逐渐伸长，花萼、花瓣均4枚，十字形，雄蕊6枚，4强；子房上位，2室。长角果线状圆柱形。 生态分布：我国各地广栽培。 药用部分：5~6月（小满-芒种）采干燥成熟种子入药。 用途：性味辛、温，无毒。能行血破气，散结消肿，催生，滑肠，清肺明目。用量：3~4钱。
364	泽兰	水香，都梁香，虎兰，龙枣，山兰，山竹兰，香草，不老草。	菊科 植物形态：多年生草本，高达2米。茎直立，圆柱形，基部浅褐色或带紫色，近于光滑，上部绿色，散生紫色斑点，被有细柔毛。叶对生，叶片卵圆形，卵圆状椭圆形或椭圆形，长7~16厘米，宽3~8厘米，基部楔形，先端尖，有长短不等的柄，或近于无柄，边缘齿裂，深浅大小不等，背面毛较多，并带有腺点。花白色，顶生头状花序，集成伞房状，总苞钟状，苞片约9枚，花全为管状花，花冠5裂，雄蕊5枚，子房下位，1室。瘦果细小，熟时黑色，先端有冠毛1列。 生态分布：产我国南北各地；生于荒山草地、林边和沟谷丛林边。 药用部分：茎叶、根、种子入药，夏秋采收。 用途：茎叶性味辛、平。能行血消水，疏肝散郁。主治闭经，产后腹痛，身面浮肿，症瘕，痈肿。用量：茎叶1钱~5分；根5~7钱。
365	泽泻	水泽	泽泻科 植物形态：水生多年生草本，地下生球茎，连花茎高约1米。叶丛生，根出，呈长椭圆形至广卵形，长3~18厘米，宽1~9厘米，先端渐尖，基部楔形或心脏形，叶柄长约30厘米，叶鞘宽5~20毫米，边缘膜质。花白色，复轮生总状花序生于花序顶端，萼片3，花瓣3片，雄蕊6枚，雌蕊多数，分离心皮，子房上位，各1室。瘦果倒卵形，扁平，聚生成扁球状聚合果。 生态分布：产我国南北各省。 药用部分：冬季采收地下根茎入药。 用途：根茎性味甘、淡、微苦、寒，无毒。能利水，消肿，通淋。治小便不利，肠炎，热痢，妇人乳汁少，糖尿病等。叶性味咸、平、无毒。强阴气，通血脉；用于乳汁不出，难产。果实性味甘、平、无毒。益肾气，强阴；治风痹消渴。用量：根茎2~4钱。
366	泽漆	五朵云，猫儿眼睛草，龙虎草，铁骨伞，奶浆草，九头狮子草。	大戟科 植物形态：二年生草本，高达30厘米。茎丛生，全株绿色，肉质，光滑无毛，初生茎匍匐地上，后即直立，下部淡紫红色，富含乳汁。茎下部叶互生，倒卵形或匙形，基部宽楔形或渐狭成柄，先端钝圆，截形或微凹，边缘中上部有锯齿，茎上部叶5片轮生，形同茎下部叶，上端歧出5枝，每枝再分3枝，分枝处3叶轮生，阔倒卵形或三角状倒心形。花黄绿色，单性，无花被，复歧伞形花序（或鸟巢花序），雄蕊多数，雌花1朵。蒴果，具3棱。 生态分布：产我国长江流域各省；多生于原野，路边草地，田边，溪边草丛中。 药用部分：全草入药，夏秋采收。

				用途：性味苦、微寒，一说辛，一说冷，有小毒。能利大小肠，明目轻身，消炎退热，杀虫。治淋巴结核，水肿，杀蛆。用量：1~3钱。
367	泥胡菜	剪刀草，癩子草，蒲公英，艾草，绒球。	菊科	植物形态：一年生或二年生草本。高达80厘米，根圆柱形，茎直立圆柱形，有纵沟，光滑或被白色绵毛。叶互生，倒披针状卵圆形，长7~15厘米，羽状深裂或提琴羽状分裂，顶端裂片较大，三角形，有时3裂，两侧裂片5~8对，长椭圆状倒披针形，叶片白绿色，密被白色茸毛，中间裂片椭圆形，基部下延，先端尖。花紫红色，顶生圆锥状头状花序，有梗，总苞球形，花全部管状，花托有刺毛。瘦果椭圆形，冠毛刺毛状。 生态分布：产我国南北各地；多生于山坡灌丛边草地中，溪边，路边，村落，城镇庭院边常见。 药用部分：全草入药，四季可采。 用途：性味辛、平。能消肿，散结，解毒。用量：3~5钱。
368	抱石莲	瓜子金，瓜子菜，石瓜子，鱼鳖金星。	水龙骨科	植物形态：多年生常绿蔓生草本，根状茎细长，横走，疏被鳞片，鳞片淡棕色而薄，粗筛孔状，基部宽而有不整齐的分枝，先端钻形。叶2型，单叶，远生，肉质，深绿色，叶脉不明显；营养叶卵圆形至长椭圆状卵圆形，长1~2厘米，宽2厘米许，叶下疏被鳞片。孢子叶细长，舌形或匙形，长3~6厘米，宽不及1厘米，也常有与营养叶同形的。孢子囊群中等大小，远离，上部接合，排列于孢子叶背面，主脉两侧各1行。 生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于阴湿处林中岩壁上或树皮上。 药用部分：全草入药，四季均可采收。 用途：性味苦、微甘、平，无毒。能补益精气、利水、除湿；治虚劳咳嗽，凉血，解毒，五淋，白浊，膨胀，瘰癧及咽喉伤痛。用量：4~8钱。
369	侧柏	扁柏，扁松，黄柏，香柏。	柏科	植物形态：常绿乔木或灌木。树皮薄，红褐色，常为纸片状剥落。叶密集，交互对生，鳞片状，紧贴于小枝上，叶背有凹陷斑。花单性同株，雄花椭圆形，黄色，雌花卵形，紫褐色，孕性胚鳞具2胚珠。由3对对生的种鳞聚生成为卵形的球果，初时肉质后变木质。每种鳞顶端有1反曲尖钩。 生态分布：产我国东北部；全国各地均有栽培。 药用部分：四季可采，叶及球果入药。 用途：性味苦、涩，微寒。能凉血，止血，清热及湿热。用量：叶3~5钱。
370	使君子	四君子，史君子，留球子。	使君子科	植物形态：落叶灌木，枝条扩展而带蔓性，高2~7米，幼时各部有锈色短柔毛。叶对生，长椭圆形，长5~13厘米，先端渐尖，全缘，叶柄长1厘米左右，表面通常密被有锈色短柔毛。花白色，后变红色，有芳香，顶生穗状花序，萼筒延长呈细管状，5裂，花瓣5片，雄蕊10枚，子房下位，1室。果革质，有五棱角，黑褐色，内含种子一粒。 生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡林边，灌丛中，或溪边丛林中。 药用部分：种子（使君子用时去果壳）。7月采。 用途：性味甘、温。为驱虫药，能杀虫，健脾，消积。治小儿疳积及驱除蛔虫。用量：1钱5分~3钱。忌茶。
371	枇杷	卢桔（广东）	蔷薇科	植物形态：常绿小乔木，高达8米。树皮灰色，平滑，小枝粗壮，密被锈褐色绒毛。叶互生，长倒卵形，长椭圆形或为倒卵状披针形，长12~25厘米，宽3.5~8.5厘米，基部楔形，并下延成叶柄，顶端短尖或渐尖，表面深绿色，有光泽，背面密被锈褐色绒毛，侧脉12~15对，直达叶缘锯齿尖端，边缘具稀疏锯齿，革质，托叶2片，三角状，渐尖或短渐尖。花淡黄白色，顶生圆锥花序，萼筒壶形，5裂，花瓣5片，雄蕊20~25枚，子房下位，5室。果为浆果状梨果，卵形，椭圆形或近圆形，熟时橙黄色。 生态分布：产我国长江流域中部及南部各省。 药用部分：根、叶、花及果，叶常年可采，果夏初采用，花冬季采用。 用途：叶性味甘、微苦，平。清肺和胃，止咳化痰。果肉性味甘、酸、平。果核化痰疏肺。花治头风鼻流清涕。根性味苦、平。治虚劳咳嗽，镇痛下乳。用量：根2钱~1两，叶1钱5分~3钱。

372	构树	楮, 谷浆树, 谷树。	桑科	<p>植物形态：落叶乔木，高达16米。树皮平滑灰色，富纤维，小枝密生绒毛。叶互生，常在枝端为对生，广卵形，长8~18厘米，宽4~10厘米，基部圆形或稍呈心脏形，先端尖锐，常有3~5不规则的深裂，幼枝或小树的叶显著有深裂，表面暗绿有粗糙伏毛，背面灰绿色，密生柔毛；叶柄长3~6厘米，密生绒毛。花黄绿色，单性异株雄花为腋生茅荑花序，花萼、雄蕊均4枚；雌花为腋生球形头状花序，萼管3~4裂，子房上位，1室。果为多数小坚果组成球形的复果，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于村落城镇附近。</p> <p>药用部分：复果、叶及树浆（乳汁）、根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：复果（楮实）性味甘、寒，无毒。能强筋骨，补虚劳，治阳痿，水肿，目不明及骨鲠等。用量：根皮或果实1~4钱。</p>
373	板栗	大栗，栗子	壳斗科, 山毛榉科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达15~20米，树皮暗灰色，具不规则深纵裂，枝条灰褐色，有纵沟，具许多黄灰色的圆形皮孔，有短毛和散生的长毛。叶互生，薄革质，椭圆形或卵状椭圆形至椭圆状披针形，长8~18厘米，宽4~6厘米，基部圆形或阔楔形，间或两侧不对称，先端渐尖，边缘有疏锯齿，齿端为内弯的刺毛状，表面深绿色，有光泽，背面色深绿色，密被白色星状短柔毛和较长的单毛，但无鳞片状腺点，侧脉10~17对，中脉上有毛，托叶披针形，叶柄长1~1.5厘米。有长毛和短柔毛，花黄褐色，单性同株，雄花序穗状，生于新枝下部的叶腋，花被6片，雄蕊8~10枚，雌花无梗，生于雄花序下部，萼6裂，子房下位，花柱6~9条。坚果包藏于球形刺状总苞内，每个总苞内含2~3个坚果，总苞4瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国中部各省。</p> <p>药用部分：花夏季采收，果实秋季采收，根与树皮全年可采用。</p> <p>用途：果实性味甘、微咸、温、平，无毒。能益气健胃。治损伤筋骨肿痛。果壳治反胃；花性味涩、平，无毒。治瘰癧及腹泻，树皮治疮毒、漆疮。根性味甘、淡、平无毒。治疝气。用量：果1~2两。</p>
374	杨梅	朱红（福建）	杨梅科	<p>植物形态：常绿乔木，高可达12米，树皮黄灰黑色。叶互生，倒卵状长椭圆形或倒披针形，革质，长约8~13厘米，基部为狭楔形，先端钝或微尖，全缘，或上部有少数钝锯齿，表面深绿色，有光泽，背面色稍淡，平滑无毛。花红黄色，单性异株，雄花序为圆柱形，腋生，雌花序为卵状长椭圆形，腋生，无花被，雄蕊4~6枚，子房上位，1室。核果球形，外果皮暗红色，由多数囊状体密生而成，内果皮坚硬。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至海南岛各地；多生于阔叶林中，或山坡疏林中。</p> <p>药用部分：初夏采收果实，春初剥取树皮，秋后采根入药。</p> <p>用途：果实性味甘、酸、温。行气止痛，止呕，消食。治霍乱，下痢。根为收敛剂，止血，舒筋活络。树皮为褐色染料又能作农业杀虫药。果可酿酒，核仁治脚气，叶可提香油。用量：果实5钱~1两，根1~4两。</p>
375	枫杨	溪沟树，枫柳，水化香。	胡桃科	<p>植物形态：落叶乔木，高可达30米。枝条密生，平展，树皮幼时呈灰赤褐色，至老则成深灰色，深纵裂，幼嫩枝具长柔毛，后渐脱落，老枝上无毛，散生淡黄色皮孔，枝条中髓部为薄片格状。叶互生，奇数羽状复叶，长20~35厘米，叶轴两侧具狭翅，翅的边缘有时具锯齿，总叶柄长2.5~7厘米，被短柔毛或无毛，小叶9~25片，对生，无柄，小叶片长圆形至长椭圆状披针形，长5~12厘米，宽2~4厘米，顶端圆钝或短尖，基部圆或偏斜，表面深绿色，无毛，但具多数腺点，背面黄绿色，叶脉及脉腋间被短柔毛，余均无毛，但具紧贴鳞状物，边缘具细锯齿，厚纸质。花单性，下垂的茅荑花序和新叶同时抽出，雄花序生于二年生的枝条叶腋，雄花序具1延长的苞片及2小苞片，花被萼片状，常为1片，偶有2片，雄蕊常为6枚，或较多。为2~3列。雌花序生于新枝顶端，雌花单生苞腋，左右具2小苞片，花被4片，贴生于子房上，顶端分离，花柱2，果为坚果，果序下垂，长达40厘米，两侧具小苞，发育增大呈翅状，长椭圆形或长椭圆状披针形，外果皮极薄，内果皮坚硬如角质，基部具不完全4室。</p> <p>生态分布：产我国黄河流域至广东各地；多生于溪涧旁，山麓及沿河两</p>

			<p>旁，或栽植于城镇中为行道树。</p> <p>药用部分：叶（麻柳叶），树皮及嫩根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、温；亦说苦、寒；亦说大热，有小毒。能祛风杀虫，治龋齿及积年痛风。</p>
376	枫树	枫春树，路路通， 摄摄，鸡枫树，白 胶香，三角枫，	金缕梅科 <p>植物形态：落叶大乔木，高可达40米。叶互生，有长柄，掌状三裂，裂片卵状三角形，锐尖头，边缘有细锯齿，叶片卵圆形，长宽均7~8厘米左右，两面无毛，秋时微带红色。花单性，雄花成头状，聚集成总状花序，雌花成球形头状花序，花无花被；雄花的雄蕊数目不定，与小鳞片混生，雌花基部有4~5个刺状鳞片，子房上位，2室。果实由很多蒴果集成球形复果，径约25厘米，蒴果有宿存细长柱头。种子椭圆形，有翅。</p> <p>生态分布：产我国北至河南，南至闽广、台湾，沿长江自东而西至西南诸省。多生于向阳山坡林边，村落附近。</p> <p>药用部分：12~1月采果实，5~6月采叶、茎干树脂入药。</p> <p>用途：果实性味辛、涩、平。为镇痛及通经，利尿药。用于遍身痹痛，经络拘挛，月经不调，小便不通等。烧灰外用于湿癣，痔漏等。树脂性味辛、苦、平，无毒。治吐血、咯血，又活血，生肌，止痛，解毒，并可为化脓性痈疽的内服药。树皮能下水气。根叶治痈疽已溃，浮肿，齿痛。用量：果实3~6钱（孕妇忌用）；根、叶5钱~1两。</p>
377	枫荷梨	梨荷枫，三叉一支 镖，边荷枫，半枫 荷，五加皮。	五加科 <p>植物形态：常绿乔木或灌木。根皮及树皮均呈灰白色，稍平滑。叶互生，椭圆形，卵状椭圆形至长椭圆形，掌状分裂，但结果枝上叶不分裂，叶大小悬殊较大，叶长5.5~25.5厘米不等，叶基部钝圆，顶端渐尖至尾状，全缘或2~5浅裂或深裂，裂片顶部有时有疏生锯齿，叶柄长1.5~2.3厘米，基部略抱茎，以老叶柄为最长，新叶柄最短，叶基部有显著的3出脉或5出脉，叶脉在表面较背面显著凸出，透光可看到网格中有显明的黄色腺点。花黄绿色，顶生伞形花序；萼，花瓣，雄蕊均5枚，子房下位，2~5室。果为浆果状，紫色，椭圆形，长0.8~1.2厘米。</p> <p>生态分布：产我国南部江西、福建、广东、广西等省；主要生长于丘陵山地的沟谷常绿阔叶树林中或林下。</p> <p>药用部分：秋冬两季采根及茎入药。</p> <p>用途：性味甘、温，无毒。能疏筋活血，去风除湿。治跌打损伤，风湿关节炎，半身不遂及偏头痛。用量：5钱~1两。</p>
378	松萝	女萝，金钱草，关 公须。	松萝科 <p>植物形态：附生于深山岩石和老树上，全体成丝状，基部着生于树皮或岩石上，似树枝而悬垂，长可达40厘米，最粗部分径约1~1.5厘米，全体呈淡黄绿色或白色，基部分歧少，先端部分分歧较密；表面常现出多数横生的扁沟，中心为强韧致密的丝状体，易和外围皮部分离而现出中轴。子器稀生，扁平，盘状，径约3~5毫米，内藏圆形孢子囊。</p> <p>生态分布：产我国各地；多生于潮湿山林，沟谷岩壁上。</p> <p>药用部分：常年采收全叶状体入药。</p> <p>用途：性味甘、平，有小毒。一说甘、苦、寒，无毒。强心利尿，止血，生肌，强筋。主治创伤出血，风湿痹痛，肺结核，瘰癧；又作祛痰剂，镇咳剂。用量：1.5~3钱。</p>
379	松风草	鹧子钻山，石胡 椒，臭沙子，臭草。	芸香科 <p>植物形态：多年生宿根直立草本，高达80厘米，全株有强烈的气味。主根圆柱形，米黄色，有分枝。茎紫红色，下部淡灰绿色，幼枝髓部很大，常中空，基部常为木质。叶互生，为三回3出羽状复叶，亦有2回羽状复叶的；小叶片倒卵形，菱形或椭圆形，大小不等，长1~2厘米，宽5~18毫米，基部圆钝或楔形，先端圆，有时微凹，全缘，薄纸质或膜质，表面绿色，背面灰青色，具透明油腺点。花白色或淡红色，顶生聚伞花序，萼片、花瓣均4枚，雄蕊8枚，长短不等，长者伸于花冠之外，子房上位，6~8室，具长柄。蒴果，表面有瘤状凸起。</p> <p>生态分布：产我国长江南部至西南各省；多生于山坡林下或沟谷丛林下湿地。</p> <p>药用部分：夏秋采收全草入药。</p> <p>用途：性味辛、苦、温。能散瘀，杀虫，治疟疾，跌打损伤。用量：3~5</p>

			钱，作煎剂或泡酒服。
380	明党参	山花，粉沙参，南沙参。	伞形科 植物形态：多年生草本，高达1米。具有肥厚圆柱形或椭圆形的宿根，茎直立，圆柱形，中空，上部分枝，呈乳绿色，表面具细纵条纹，全草光滑无毛。根生叶具长柄，基部扩大呈鞘状而抱茎，叶片为3出2~3回羽状复叶，小叶披针形，长2~4毫米，宽1~2毫米。茎上部的叶呈鳞片状或叶鞘状。花白色，顶生复伞形花序，无总苞，萼5片，花瓣5片，雄蕊5枚，子房下位，2室。双悬果扁圆形至卵状长椭圆形。 生态分布：产我国长江下游各省。 药用部分：根入药，4~5月份采收。 用途：性味甘、苦、平，无毒。根为滋养强壮药，并有散毒，消肿排脓等功效，通常用治肺病咳嗽、呕吐。又作补血或解毒治疗疮用。用量：1~5钱。
381	肥皂荚	肥猪子树，肉皂角，肥皂树。	云实科，豆科。 植物形态：落叶乔木，高可达10米。树皮灰褐色，小枝幼时密生锈褐色或白色细毛，后无毛，芽为叶柄藏芽。叶互生，2回偶数羽状复叶，叶轴有短柔毛，羽片互生，小叶10~24片，互生，长椭圆形，长2.2~4厘米，宽1~1.5厘米，基部圆形，稍不等称，先端圆或微凹，表面深绿色，背面淡绿黄色，两面有丝状细毛，小叶柄短，有白色细毛。花假蝶形，白色或紫色，杂性，顶生总状花序，萼管5裂，花瓣5片，雄蕊10枚，分离，子房无毛，上位，1室。荚果肥厚，长椭圆形，长至10厘米，顶端有短喙。 生态分布：产我国长江中下游各省；多生于山坡林边、路边及村落附近。 药用部分：秋季采种子及果实入药，树皮及根亦供药用。 用途：性味辛，温。治风湿，下痢，便血，疮疮肿毒及跌打损伤等症。 用量：种子1~2钱。
382	细辛	圆叶细辛，土里开花土里谢。	马兜铃科 植物形态：多年生草本。根茎极短而横生，肉质多节，有芳香、辛辣味。叶生于根茎顶端，通常2枚，阔心形，长7~11厘米，宽6~12厘米，先端短渐尖，基部圆耳形，下垂，两耳近相接，全缘或微呈波状，有纤毛，表面疏生硬毛，沿脉较密，背面沿脉有灰褐色毛，掌状脉明显，两面隆起，叶柄长达11厘米，疏生细毛。花生于地表，淡红紫色，单生于叶腋，具短柄，萼筒扁球形，顶端3裂，向外反卷，无花瓣，雄蕊12枚，子房半下位，6室。蒴果呈半球形。 生态分布：产我国东北、新疆及长江流域各省；生于路边枯枝落叶中或草丛中。 药用部分：5~9月挖取全草阴干入药。 用途：性味辛，温。能发散风寒，利水开窍。治头痛，神经痛，肋膜炎，胸痛等症。又是祛痰，发汗，利尿药。用量3分~1钱。
383	玫瑰	赤蔷薇	蔷薇科 植物形态：落叶灌木，干粗壮，高达2米，枝丛生，密生绒毛、腺毛及皮刺。叶互生，奇数羽状复叶，小叶5~9片，椭圆形至卵状椭圆形，长2~5厘米，宽1~2厘米，基部圆形或楔形，先端钝头或圆头，边缘具细锯齿，表面暗绿色，无毛，稍皱缩，背面苍白色有柔毛，叶柄上密生绒毛，托叶大形，叶状，中部以下附着于叶柄上，边缘有腺点。花红色偶有白色，单独或2~3朵顶生，萼筒略带球形，花托及花萼均具腺毛，萼5片，花瓣5片或为重瓣，雄蕊多数，雌蕊多数，分离，包于花托内，花托成熟后为红色，内有多数小瘦果，呈扁形。 生态分布：产我国北部。 药用部分：花及根入药，5月盛开花时采收花入药，根四季可采。 用途：性味甘、微苦、温，气香，无毒。其花用于矫味矫嗅药，并有收敛性，用于妇女月经过多，赤白带下，一般肠炎，痢疾；又为香染原料。 用量：1~3钱。
384	陆英	臭草，八棱麻，公道老，珊瑚花，落得打，接骨草。	忍冬科 植物形态：多年生灌木状草本，高1~3米。茎具棱角，表面青绿色，有浅纵沟。叶对生，奇数羽状复叶，长30~45厘米，小叶5~7片，长椭圆形状披针形，长10~16厘米，宽3~5.5厘米，基部楔形或左右不对称，先端长而渐尖或尾状，边缘锐锯齿，表面绿色，中肋微凹，背面淡绿色，两面均无毛，唯叶脉上有短柔毛，叶柄长约5厘米，无托叶，小叶柄短或近于

				<p>无柄。花白色，顶生伞房花序，萼5裂，花冠5裂，雄蕊5枚，子房下位，3室。花间杂有黄色不育肉质花。浆果球形，熟时黑色。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于原野、村落城镇荒地上。</p> <p>药用部分：根、茎、叶、花均供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、淡，微温。为镇痉消肿药，治四肢拘挛疼痛，骨间诸痛，风湿及跌打损伤骨痛等。又利尿、健脾。用量：根5钱~1两。</p>
385	知母	连母,地参,水参,货母。	百合科	<p>植物形态：多年生草本。地下具匍匐状根茎，其上密被老叶枯凋后残留的基部，膜质，常分裂成纤维状，带黄褐色。叶由基部丛生，广线形，长20~70厘米，宽3~5厘米，质稍硬，基部扩大呈薄膜状，包着根茎，先端尖细。花白色，顶生总状花序，生于花茎上；花被6片，基部稍愈合，雄蕊6枚，着生于花被管上，子房上位，3室，具6棱。蒴果三角状卵圆形，黑色。</p> <p>生态分布：产我国河北、山西、东北等地。</p> <p>药用部分：根茎入药，9~10月采收。</p> <p>用途：性味苦、寒。能清热，止咳，去痰。滋阴降火，除烦止渴，润燥滑肠。治发热，口渴，心烦，热肺久咳，大便燥结，小便不利，肺结核，尿道炎等症。用量：1~3钱。</p>
386	刺苋	苋菜，野苋菜。	苋科	<p>植物形态：一年生草本，高达70厘米。茎直立，有分枝，近秃净或疏生短毛，每一叶腋内有刺1~2枚。叶互生，狭卵状披针形或长椭圆形，长4~10厘米，宽1.5~4厘米，基部楔形，先端钝，全缘，绿色，秃净，叶柄长1~8厘米，基部有1~2个针芒状刺。花绿色，单性，腋生球形花束或延长腋生或顶生的穗状花序，萼5裂，膜质，花瓣缺，子房上位，1室。胞果盖裂。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于路旁、草地、空旷荒地上。</p> <p>药用部分：5~9月采全草或根、叶、茎入药。</p> <p>用途：性味甘、微苦、凉。能清热解毒，凉血，除湿，消肿。主治急性痢疾，腹泻、溶血型毒蛇咬伤，痔疮出血，癣等。用量：全草1~2两。外用适量。孕妇忌用。</p>
387	刺楸	刺枫树，鼓钉刺，刺楸树，丁桐皮	五加皮	<p>植物形态：落叶乔木，高达15米。树皮粗糙有裂缝，呈暗褐色，枝疏生，粗壮，上有多数鼓钉状粗刺。叶互生，略为圆形，直径10~20厘米，亦有大至33厘米者，5~9裂，裂片三角状卵形至长椭圆状卵形，边缘有细锯齿，先端渐尖，表面暗绿色，平滑，背面淡绿色，通常幼时稍有短柔毛，叶柄长8~50厘米。花黄绿色，顶生复伞形花序，萼、花瓣4~5片，雄蕊4~5枚，较花瓣长，子房下位，2室。核果球形，熟时蓝黑色，先端具有细长的花柱。</p> <p>生态分布：产我国自东北至广东等地；多生于沟谷阔叶林中。</p> <p>药用部分：春夏间采集根及树皮入药。</p> <p>用途：树皮性味甘、苦、平，无毒。能祛风行血，除湿杀虫。治腰酸疼痛，风寒湿痹及疥癣等症。根性味苦、凉，无毒。能散血清热，除风湿；治肠风下血，跌打损伤及风湿骨痛等。用量：3~5钱。</p>
388	刺槐	洋槐，胡藤。	豆科	<p>植物形态：落叶乔木，高达20米。树皮褐色，有深沟，小枝具刺针，平滑无毛，幼时微有短柔毛。叶互生，有柄，奇数羽状复叶，小叶7~19枚，卵形或椭圆形或长圆状披针形，长2~6厘米，宽1~3厘米，具短柄。花白色，蝶形，芳香，腋生总状花序，下垂，花萼钟形，5齿，旗瓣下部带黄色，雄蕊10枚，2体。荚果线形，扁平，有5~7粒种子。</p> <p>生态分布：我国北部、东部栽培。</p> <p>药用部分：春后采其茎、叶，秋后采其根入药。</p> <p>用途：治大肠出血，咯血，吐血，红崩及劳伤乏力。</p>
389	刺葡萄	山葡萄	葡萄科	<p>植物形态：落叶木质藤本。枝条粗壮，老树枝皮片状剥落；幼枝密生直立或先端弯曲的刺，枝及刺均呈棕红色。叶互生，广卵形，长6~12厘米，宽5~9厘米，先端短尖或渐尖，有时呈不明显的分裂，基部心脏形，边缘具细锯齿，呈微波状，齿尖突出，表面深绿色，无毛，背面灰白色，除</p>

			<p>主脉上具长毛及柔毛外，余均无毛，叶柄长6~9厘米，其上生弯曲的腺状刺毛，秋季叶变红色。花黄绿色，圆锥花序，与叶对生，花的构造同葡萄。浆果黑色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南至云南各地；多生于向阳山坡林边，溪边灌木丛中。</p> <p>药用部分：根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：治筋骨伤痛。</p>
390	狗脊	大叶卢鸡，黄狗头，金毛狗脊，狗脊条，金毛狗薯。	乌毛蕨科 <p>植物形态：多年生常绿草本。高达1.5米，根茎粗壮而短，有褐色鳞片状毛。叶丛生根茎上，叶柄长30~50厘米，下部密生大形褐色披针形鳞片，叶片长椭圆形至卵状披针形，长25~80厘米，宽20~40厘米，亚革质，2回羽状复叶，羽片约10对，上部羽片为羽状深裂，羽片线状披针形，长15~25厘米，宽2.5~4厘米，基部钝，先端渐尖，下面脉上有小鳞片，裂片卵状椭圆形，长1~2厘米，宽1~1.5厘米，急尖，边缘有细锯齿，叶脉分离或在近叶轴处偶有连接。孢子囊群线形，沿叶背裂片中脉两旁着生，囊群盖褐色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于阔叶树林下，杉木林和竹林下和沟谷丛林下阴湿处。</p> <p>药用部分：根茎入药，全年可挖，以夏秋为佳。</p> <p>用途：金毛狗脊性味苦、甘，温。能补肝肾，强腰膝，除风湿。治风寒湿痹，腰痛脚软，小便频数，淋露等症。用量：1钱5分~5钱。狗脊性味苦、微寒，有小毒。能清热解毒，杀虫散瘀。治疮疡肿毒，虫积腹痛，湿热便血，血崩不止，下痢堕胀并用于预防流脑及感冒。用量：2~3钱。</p>
391	狗爪豆	虎爪豆，猫爪豆，龙爪黎豆，龙爪豆。	豆科 <p>植物形态：一年生缠绕性草质腾本。茎圆柱形，具纵棱线，疏被白色柔毛。叶互生，三出复叶，总叶柄长8~15厘米，疏被柔毛，顶生小叶广卵形，长椭圆形或菱状卵形，侧生小叶斜卵形，长7~14厘米，宽5~8.5厘米，顶端钝而微凹，具短针头，基部宽楔形或近圆形，侧生小叶基部及偏斜，两面均疏生白色长柔毛，叶脉在背面明显隆起，侧生小叶柄长3~4毫米，均疏被白色长柔毛，小托叶刚毛状。花蝶形，白色或紫色，腋生总状花序下垂，花萼钟状，5裂，雄蕊10枚，两体，子房无柄，花柱细长。荚果长椭圆形，顶端略弯，成熟时稍扁，黑色，具纵棱1~2条，种子5~6粒。</p> <p>生态分布：产我国南部各省。</p> <p>药用部分：夏秋采收种子入药。</p> <p>用途：性味甘、味苦、温，有小毒。能温中益气。治腰脊酸痛。</p>
392	狗牙根	铁线草，马挽手，行仪芝，绊根草。	禾本科 <p>植物形态：多年生草本。根细韧，具横走根茎，秆匍匐地面，长达1米，向上直立部分高10~30厘米。叶二列式互生，线形，下部叶片因节间较短似为对生，长1~6厘米，宽1~3毫米。花灰绿色或带紫色，穗状花序3~6条呈指状丛生于茎顶，颖具1中肋，背呈脊状，两侧膜质，与第2颖近于等长或稍短，外稃草质，与小穗同长，具3脉，脊上有毛，内稃约与外稃等长，具2脊。果为颖果。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于平地旷野、田边、河边、路边、村落、城镇、庭院中普遍有生长。</p> <p>药用部分：四季采收全草入药。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。能解热生肌，跌打损伤，风湿骨痛，劳伤骨痛吐血，刀伤，狗咬伤出血及小儿虫积等症。1日用量：3钱~1两。</p>
393	狗肝菜	狮子草，九头狮子草，金龙柎，金龙棒。	爵床科 <p>植物形态：1~2年生草本，高达80厘米。通常被毛，茎有4棱线，节膨大。叶对生，卵形至卵状长椭圆形，长2.5~7厘米，宽1~2.5厘米，基部阔楔形，先端急尖或渐尖，全缘，表面深绿色，脉上有柔毛，背面绿色，脉上柔毛较少，近于无毛；叶柄长1厘米。花淡红色，唇形，腋生聚伞花序，苞片绿色，对生，小苞片极狭，长约4毫米，萼5裂，与小苞片等长，花冠管细长，约1.2~1.4厘米，雄蕊2枚，子房上位，2室。蒴果棒状，熟时2瓣裂开而弹出种子。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于山坡丛林边湿地，或沟谷草丛中。</p> <p>药用部分：茎、叶入药，夏秋采收。</p>

				用途：性味微甘、凉，无毒。能清肝热，凉血生津，除湿火骨痛，斑疹发热。治血尿，感冒发热，肺热咳嗽，结合膜炎，带状疱疹，黄疸，肝热头痛，无名肿毒。用量：5钱~1两，外用适量。
394	狗花椒	鹰不泊，鸟不宿。	芸香科	<p>植物形态：落叶灌木，高达3米。根皮黄色，有辛辣味，茎部有三角形钩刺，枝上钩刺向上弯。叶互生，奇数羽状复叶，小叶7~15枚，有油腺点，总叶轴长7~12厘米，有少刺或无刺；小叶具短柄，小叶片斜方状倒卵形或斜椭圆形，稀为斜方状披针形，长2~5厘米，宽1~2厘米，最顶端一枚小叶椭圆形，长可达7厘米，基部狭楔状而成短柄，先端通常钝，边缘略呈波状。花白色，顶生圆锥花序，或为2~3次伞形花序的分枝，约与叶等长，萼、花瓣、雄蕊均5枚，子房上位，2分离心皮。果为蒴果状，瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡灌丛中或溪谷丛林中。</p> <p>药用部分：嫩叶、根及果入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、微温，微香。能行气、止痛、利水。主治慢性肝炎，阑尾炎，肾炎性水肿，风湿骨痛，胃痛等。用量：根1~2两，果1~2钱。</p>
395	迎春花	金腰带，小黄花，迎春。	木樨科	<p>植物形态：落叶小灌木，枝细长略呈蔓状，长达3~4米，易生不定根。叶对生，3出复叶，小叶卵形，长椭圆状卵圆形，长1~2厘米，基部楔形，先端尖锐或钝圆，边缘被细毛，有叶柄。花淡黄色，先叶开花，常3~4多丛生于老枝上，小苞狭长绿色，花萼裂片6枚，线形，绿色，花冠筒部长0.6~1厘米，先端波状，6裂，短于筒部，雄蕊2枚，子房上位，2室。浆果有宿存花萼。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省。</p> <p>药用部分：春季采花入药。</p> <p>用途：性味甘、涩、平，无毒。治恶疮肿毒。用量：2~3钱。</p>
396	兔儿伞	独脚莲，南天扇，伞把草。	菊科	<p>植物形态：多年生草本，根茎短，匍匐，茎直立，少分枝，高达1.2米，有纵细线棱，无毛，略带棕褐色。叶互生，通常2枚，下部叶盾圆形，直径20~30厘米，掌状分裂，裂片7~9枚，亦有羽状分裂，先端尖，边缘有锯齿，表面绿色，背面灰白色，叶柄长，上部叶盾状圆形，裂片4~5枚，叶片较短；近花序的叶为披针形或线形，近无柄。花带红色，顶生头状花序密集成伞房状，花全部管状，两性。瘦果长椭圆形，冠毛灰白色或带红色。</p> <p>生态分布：产我国中部和西南部；多生于山坡丛林中或溪谷丛林边。</p> <p>药用部分：夏秋采收全草入药。</p> <p>用途：性味苦、微辛。治跌打损伤，痈疽。</p>
397	京大戟	京天雷，千层塔，将军草，龙虎草，红大戟，膨胀草，天平一支香。	大戟科	<p>植物形态：多年生有毒草本，茎直立，初淡红色，后变为绿色，高可达1米，全体被白色短柔毛，茎、叶均含有乳白液汁。叶互生，长圆形或长椭圆状披针形，边缘具细锯齿，基部稍狭近无柄，先端尖，表面深绿色，平滑，背面苍白色，散生柔毛；茎顶常五叶轮生，平展，较下部叶宽大，呈广卵形，先端尖或锐尖，两面均无毛，叶腋间抽出5小枝，每枝再分3~4小枝，基部着生3~4片小叶，近圆形，十字形对生，每小枝再1~4回叉状分枝。花黄绿色，单性同株，鸟巢花序（或大戟花序），生于小枝顶端，雌、雄花均无花被，每朵雄花仅有1雄蕊，每朵雌花由1雌蕊组成，子房三角状卵圆形，常伸出总苞外，下垂，外面有疣状突起，3室。蒴果三角状扁球形，熟后3瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于溪谷灌丛边湿地、路边、田边，村落附近也常见。</p> <p>药用部分：秋后采其根入药。</p> <p>用途：性味苦、寒，有毒。能泻水饮。治全身水肿，腹水，痰饮积聚。有的用根排除血吸虫病的腹水。用量：5分~1钱。</p>
398	罗汉松	罗汉杉，土杉，小罗汉松。	罗汉松科，紫杉科。	<p>植物形态：常绿乔木，高达20米，一般多为5~6米左右。叶互生，革质，线状狭披针形，长7~10厘米，基部窄楔形，先端短尖，全缘，表面暗绿色，光亮，背面黄绿色或微有白霜，中脉两面都凸起，甚显著。花单性，异株，腋生；雄花序为茅荑花序；雌花单生。种子卵圆形，核果状，外</p>

				<p>皮肉质，绿色，被白霜，种柄长约10毫米，其上中部发育且膨大为肉质，较种子粗大，初时绿色后变为红色转红紫色，一般每1种柄上只载有1粒种子，但有时也有2粒种子。</p> <p>生态分布：产我国西南部。</p> <p>药用部分：根皮及果实供药用，根四季可采，9~10月采种子。</p> <p>用途：性味甘、微温，无毒。能益气补中；治心胃气痛。皮能杀虫，一切血病及搽疥癣。用量：1~3钱，皮外用适量。</p>
399	岩白菜	岩壁菜	虎耳草科	<p>植物形态：多年生常绿草本，高达30厘米，全体无毛。（庐山产者稍有毛，因无花，尚未正确鉴定）地下根茎稍粗，垂直或弯曲，节间短。叶丛生于根节上，叶片肉质而稍厚，倒卵形或长椭圆形，长7.5~15厘米，宽3.5~7厘米，表面深绿色有光泽，背面黄绿色，有腺状小点，基部狭或楔状，先端钝圆，边缘微波状或细齿状，叶柄长2~7厘米，基部扩大成膜质鞘状。花白色，散房状花丛生于花茎顶端，萼片、花瓣均5片，雄蕊10枚，子房上位，2室。蒴果。</p> <p>生态分布：产我国西南部；多生于岩石或悬崖积土上。</p> <p>药用部分：夏季采收全草入药。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。为滋补强壮剂，有止咳血，吐血，化痰之效。外用消无名肿毒。用量：1~3钱。</p>
400	委陵菜	翻白草，根头草，野鸪旁花，白头翁，龙牙菜，蛤蟆草，黄州白头翁。	蔷薇科	<p>植物形态：多年生草本，高达60厘米。根肥大，圆锥状，木质化。茎直立，上部分枝，全体密被灰白色绵毛。根生叶丛生，向上斜展，奇数羽状复叶，小叶8~10对，顶端小叶最大，两侧向下渐次变小，小叶为狭长椭圆形，边缘羽状深裂，裂片呈三角状披针形，先端短尖，边缘向下反卷，表面有短毛，背面密被白色绵毛，茎生叶与根生叶同形，但较小，小叶1~7对，叶柄较短或近于无柄。花黄色，顶生伞房状聚伞花序，萼片、花瓣均5枚，雄蕊多数，心皮多数，分离，子房，1室。瘦果卵圆形，无毛，褐色。</p> <p>生态分布：产我国南北各省。</p> <p>药用部分：4~10月采根及全草入药。</p> <p>用途：性味苦、微辛、寒，有小毒。能止血，止咳解热润燥。治痢疾，咳嗽，疥疮瘰癧。用量：全草5钱~1两。</p>
401	三叶翻白草	毛猴子，软梗蛇扭。	蔷薇科	<p>植物形态：多年生草本，高达25厘米。宿根肉质，椭圆形。根生叶和茎生叶均为3出复叶，顶生小叶菱状倒卵形，或菱状椭圆形，两侧小叶为斜卵形，长1.5~6厘米，宽1~3.5厘米，基部宽楔形，先端钝尖，背面被绢状柔毛，边缘具圆钝锯齿，托叶卵形至卵状披针形，棕褐色，全缘或顶端3浅裂，花黄色。瘦果无毛。</p> <p>生态分布：产我国中部各省；多生于山坡灌丛边湿地。</p> <p>药用部分：全草及宿根入药，夏秋均可采用。</p> <p>用途：治产后阴道流血及子宫出血有显著效。</p>
402	枣	大枣,红枣,枣子。	鼠李科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高达10米。枝平滑无毛，有刺，对生，一长一短，长者约1厘米，直伸，短者向下钩曲；小枝丛生。叶互生，长圆状卵形或卵状披针形，少数为卵形，基部偏斜，具3~5脉，先端微尖或钝，边缘有细钝锯齿，表面绿色而有光泽，背面灰白色，有柄，长1~5毫米。花黄色，腋生短聚伞花序，花萼，花瓣均5片，雄蕊10枚，子房上位，2室。核果长椭圆形，熟时暗赤色。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽植。</p> <p>药用部分：果、根、树皮入药。8~9月采收。</p> <p>用途：果性味甘、温，无毒。能补中益气，养脾生津，和解百药。治中气虚弱，脾胃不和，虚泻，虚咳，挛引强急等症。解附子，天雄毒。根性味甘、平、无毒。能下乳，清热，调经；治湿气及小儿风丹（荨麻科）。枣树皮治刀伤出血和腹泻。用量：果3~10枚；根5钱~1两。</p>
403	青萍	水萍，浮萍。	浮萍科	<p>植物形态：浮水生长，多年生小草本。茎扁平叶状，倒卵形或长椭圆形，长2~6毫米，全缘，绿色或暗绿色，表面光滑，有不明显的三脉纹，幼时有短柄。真叶不明显。根单生于叶状茎背面，下垂水中，长达4厘米，无</p>

			<p>维管束，先端有钝头的根帽。叶状茎背面两侧各生1囊体，由此生出新的植物体。叶状茎的部分重叠，通常2~3片相连。秋末叶状茎上生圆形或椭圆形冬牙，分离后沈于水底，在泥中过冬，至来年春后浮出水面进行繁殖。花微小，白色，生叶状茎的侧边；雄花2，雌花1藏于2唇形的佛焰包内，雄花具1雌蕊，花柱长，柱头漏斗状，子房瓶状，胚株单生。果实近似陀螺状。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：全草入药，夏季采收。</p> <p>用途：青萍与紫萍功用相似。性味辛，寒。能发汗，利水，消肿毒。治风湿脚气，风疹热毒，衄血肿毒。用量：1~2钱。</p>
404	紫萍	浮萍，水萍，紫背浮萍。	<p>浮萍科</p> <p>植物形态：浮水多年草本。植物体为扁平状，倒卵形至圆形，直茎3~6毫米。长约6~9毫米，先端圆，表面绿色，有光泽，背面紫红色，叶脉不大明显，7条，常3~4片相连，自背面中央下垂数条纤细的须根。花单性同株，白色或淡绿色，佛焰苞短小，2唇形，雄花2枚，雄蕊2枚，雌花1心皮，子房无柄，1室。植物体冬季枯死，由母体生出的椭圆形的冬芽，次年春季浮出水面发芽，成为新植物。</p> <p>生态分布：广布我国南北各地。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：同青萍。</p>
405	青蒿	三七大白，草蒿，香蒿。	<p>菊科</p> <p>植物形态：二年生草本。茎直立，高达1.5米，无毛，具纵条纹，上部多分枝。基部叶和下部叶花时凋落，叶片椭圆形，长9~15厘米，宽3.5~5.5厘米，2回羽状分裂，第1回裂片椭圆形，中轴上部呈栉齿状，第2回裂片线形，宽1.5~2毫米，中部叶长约6厘米，椭圆形，二回羽状分裂，小裂片线形，宽约0.5毫米，具缺刻状尖锐锯齿。花黄绿色，头状花序多数集成圆锥花丛，侧向1边，直径5~6厘米，具细弱短柄，长2~6厘米，花后下垂，苞片光滑，边缘膜质，周围雌花筒状，中心为管状两性花。瘦果椭圆形，无毛。</p> <p>生态分布：产我国东北、山东南至广东各省；多生于山坡草地、路边，村落附近极为常见。</p> <p>药用部分：地上部分或全草入药，7~10月结子时采集。</p> <p>用途：性味苦、寒。内服为祛暑解热剂。能清暑辟秽，除阴分热。治盗汗，慢性久热。又为止血剂，治鼻衄及便血。外用为杀虫剂，治疥疮，痲痒及蜂毒。用量：1钱5分~3钱。</p>
406	青葙	圆鸡冠花，青葙子，狗尾巴子，野鸡冠花。	<p>苋科</p> <p>植物形态：一年生草本，高达90厘米，全体无毛。茎直立，绿色微带红色。叶互生，披针形或椭圆状披针形，全缘，长达9厘米许，下部渐狭形成叶柄。花紫红色，后转白色，顶生穗状花序，长椭圆形，长约6~10厘米；花多数，每一朵花下面有3片小苞片，干燥膜质，有光泽；花被5片，长方状披针形，端尖，亦为膜质，雄蕊5枚，基部连合，上端分离，雌蕊1枚，子房上位，1室。苞果盖裂，果实上部作帽状脱落，种子数粒，细小，扁圆形，有光泽，黑色微带紫红色。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部各省；多生于荒田，山坡，路边。</p> <p>药用部分：茎、叶、花，种子入药。9~10月采收。</p> <p>用途：性味苦、微寒，无毒。能泻肝明目。治风热身痒，皮肤中热，目赤翳障及青盲多泪等症。用量：种子1~3钱；茎、叶5钱~1两。</p>
407	青莢叶	绿叶托红珠，大部参。	<p>四照花科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高达2米。小枝细瘦，绿色，无毛。叶互生，卵圆形至卵圆状椭圆形，长3~13厘米，宽1.7~5.5厘米，基部阔楔形，先端长渐尖，边缘有细锯齿，齿端有小刺毛；两面光滑无毛，鲜绿色，叶柄长1.5~4.5厘米，有时有分枝的钻形小托叶。花绿白色，单性异株，着生于叶表面中脉近中央处，花萼不发达，裂片不明显，花瓣5片，雄花10~20朵丛生，有短梗，雄蕊3枚，雌花1~3朵丛生，近无梗，无雄蕊或退化雄蕊，子房上位，3~5室。核果近球形，黑色。</p> <p>生态分布：产我国黄河流域至长江流域各省；多生于阔叶林下。</p>

				<p>药用部分：茎、叶、果入药，夏秋采收。</p> <p>用途：果可治阴寒病，叶性味苦、凉，无毒。清热除湿，治一切疖毒，痢疾，便后血及落胎等症。用量：5~8钱。</p>
408	青皮木	鸡白紫，茶条树，羊脆骨。	铁青树科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达10米。树皮浅灰色，粗糙而不裂，枝条疏生，老枝灰白色，皮孔突起，小枝青紫褐色，具细条纹，有白色皮孔。叶互生，卵形至卵状披针形，长4~10厘米，宽2.5~5厘米，顶端短渐尖或尾尖，基部圆形或近截形，两面光滑，全缘，质柔软叶柄长3~5毫米。花淡黄白色，2~5朵腋生，为总状花序，下垂；萼小形，与子房的基部合生，萼齿不明显，花瓣联合成筒状，顶端4~6裂，裂片反卷；雄蕊4~6枚，子房半下位，3室。核果卵圆形或椭圆形，熟时橙红色。</p> <p>生态分布：产我国中部及西南部，生于丘陵山地向阳山坡的疏林中，或生于沟谷常绿阔叶林中。</p> <p>药用部分：根入药，秋季采收。</p> <p>用途：脱力黄胖及劳伤乏力。用量：1~2两。</p>
409	青牛胆	金古榄，金果榄，金牛胆，山慈菇，地蛋，破岩珠，破石珠，九牛胆，九牛子	防己科	<p>植物形态：多年生常绿缠绕性小藤本，长达2米。根茎细长，达1米许，中部具有1~9枚球形，椭圆形成串相连的块根，表皮黄色或浅绿色，里面白色。嫩茎疏被短毛。叶亚革质，互生，长三角形，长4~15厘米，宽2~4厘米，先端尖，基部箭形，全缘，叶脉突起，基出脉5~7条，侧脉5~7对，叶柄长2~5厘米。花紫红色，单性异株，腋生总状花序，花萼6枚，2轮，花瓣5~6枚，广卵圆形；雄蕊6枚，子房上位，1室。浆果略呈圆形。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至两广、西安各省；多生于沟谷阔叶林边和岩石缝。</p> <p>药用部分：块根入药，9~10月采收。</p> <p>用途：性味苦，寒。能消炎解毒。治疮肿毒，咽喉急痹，烂目，耳胀热咳，风瘴吐衄，蛇蝎虫伤。用量：1~3钱。</p>
410	青钱柳	甜茶树，青钱李。	胡桃科	<p>植物形态：落叶乔木，高达25米。树皮厚，灰色，老时深裂，幼枝有细绒毛。叶互生，奇数羽状复叶，小叶7~9枚，长椭圆状卵圆形至长椭圆状披针形，长4~10厘米，宽2~4.5厘米，基部偏斜，先端短渐尖，边缘有细锐锯齿，中脉两面隆起，有细毛，侧脉在表面微凸，稍有细毛，在背面明显隆起，密生细毛，叶轴无翅，密生锈褐色细毛。花单性同株，下垂茅荑花序，雄花序每2~4穗生于叶腋，花被4片，雄蕊20~30枚，雌花序单生枝端，花被4裂，子房上位，1室。柱头2裂。果序长20~25厘米，坚果有圆盘状阔翅似铜钱状。</p> <p>生态分布：产长江流域各省；多生于沟谷及山坡阔叶林中。</p> <p>药用部分：叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：同枫杨。嫩叶捣烂取汁搽癣，效果良好。</p>
411	青木香	白青木香，痧药，独行根，土射香，肚痛怕，马兜铃，青藤香，天仙藤。	马兜铃科	<p>植物形态：多年生落叶革质藤本，长可达2米。根长蔓延地中，处处生苗，苗初呈暗紫色，茎、叶都有一种臭味，茎细而强韧，无毛，绿色，初直立，后缠绕他物上升，长达1.5米。叶互生，有长柄，三角形，卵状披针形或卵形，长约5厘米，基部心脏形，两边成垂耳状，先端渐狭而钝；全缘，中部两侧多少狭窄。花紫绿色，单生叶腋，侧向开放，花被略呈弯形喇叭状，上部狭圆筒状，顶缘呈三角状披针形，先端细长，多少卷曲，下部膨大成球形，外侧无毛，筒内有长软毛，在膨大内部的中央为6花柱合成多肉的短柱，其外侧附着6枚雄蕊，雌蕊1枚，子房下位，6室。蒴果球形或椭圆形，悬垂，成熟时基部6裂，和花梗6分裂的细丝相连，状似吊篮，内含多粒种子，种子褐色，扁平有翅。</p> <p>生态分布：产我国中部各省；多生于山坡灌丛边，路边常有生长。</p> <p>药用部分：根、茎夏季采用，果实8~9月挖采。</p> <p>用途：根性味苦、辛、寒。能消食顺气，消肿解毒，治腹痛水泻，蛇虫咬伤，疝气痛，高血压。果性味苦、辛、微寒，清肺热，降气喘，化痰止咳。天仙藤性味苦，温，有疏风活血作用，治腹痛，妊娠水肿。用量：藤、果、根1钱5分~3钱。</p>
412	茄子	矮瓜，白茄，吊菜	茄子	<p>植物形态：一年生草本，基部木质化，高可达1米。叶互生，卵状椭圆形，</p>

		子。	<p>长6~18厘米，宽3.5~12厘米，边缘波状浅裂，两面具星状柔毛，基部通常歪斜，先端钝，有柄。长2~5厘米。花白色或紫色，单生或数朵腋生，萼钟状，5裂，花冠辐状或钟状，5裂，雄蕊5枚，子房上位，2室。浆果淡绿色，紫色或白色，球形或圆柱形，随品种不同而异，萼宿存，外生有粗刺毛。</p> <p>生态分布：我国各地有栽植。</p> <p>药用部分：10~11月份采收根、茎梗、花及蒂供药用。</p> <p>用途：性味苦、辛、平，无毒。散血消肿，洗冻疮；根用以脱牙，其蒂治子宫脱垂，用茄子贴刀伤止血、解毒、镇痛。用量：根5~8钱，作箭剂，研末每服2钱。</p>
413	茅莓	蒔田泡，三月泡，红梅消，草杨莓子，过江龙。	<p>蔷薇科</p> <p>植物形态：匍匐性半常绿小灌木。枝条常呈拱形，长达1.4米左右，枝和叶柄有短毛及倒生小钩刺。叶互生，羽状复叶，叶柄长3~5厘米；小叶片通常3片，少有5片，广倒卵形，顶端1片长2~5厘米，宽2~4厘米，侧生的较少，生于顶端新枝的小叶，菱状圆形至广倒卵形，基部阔楔形和截头状，先端钝尖，边缘具不整齐的缺刻粗齿牙，表面疏生长毛，背面密生白色短柔毛，托叶针状，被毛。花粉红色，圆锥花序或单生叶腋，花序柄有疏刺，萼片、花瓣均5片，雌、雄蕊多数，分离。小核果红色，聚生成球形聚果。</p> <p>生态分布：产我国东部、中部、南部各省；多生于山坡灌丛中、村落、田埂，城镇附近亦有生长。</p> <p>药用部分：根、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、微寒。能活血舒筋，消肿止痛；茎、叶能清热解毒。治肝炎、痢疾、腹泻，妇女血崩。用量：叶3~5钱；根1~2两；茎、叶5钱~1两。</p>
414	茅栗	金栗，野茅栗，毛栗。	<p>壳斗科，山毛榉科。</p> <p>植物形态：落叶小乔木或灌木，高达15米。树皮灰色，纵裂，小枝无顶芽，呈暗褐色，有短柔毛，皮孔鲜明，黄白色。叶互生，薄革质，叶片椭圆状长圆形，或椭圆状倒卵形至椭圆状披针形，长7~14厘米，宽2.2~5.5厘米，基部圆或稍呈楔形，先端渐尖，边缘具粗锯齿，锯齿呈刚毛状突出，表面绿色，光亮，背面淡绿色，密生鳞片状腺点，羽状脉12~16对，两面除脉上疏生长柔毛外，余均无毛，托叶披针形，叶柄长6~8毫米，花单性同株，黄绿色，雄花序穗状，单生于新枝叶腋，直立，花被6片，雄蕊10~14枚；雌花生于雄花序下部，通常3朵聚生在有刺总苞内，花被6裂，子房下位，6室。坚果扁圆形，呈褐色，包藏于刺状总苞内。</p> <p>生态分布：产我国中部至长江流域和西南各省；生于向阳山坡，裸岩及石砾地、沟边、路边灌木丛中。</p> <p>药用部分：根及果实入药；根秋季采用，8~9月采种仁入药。</p> <p>用途：治失眠。用量：根5钱~1两。</p>
415	茅膏菜	落地珍珠，珍珠菜，地胡椒。	<p>茅膏菜科</p> <p>植物形态：多年生草本，高10~30厘米。茎直立，地下有球形块根，直径约6毫米，叶根生和茎生，根生叶小，圆形，花时枯凋；茎生叶互生，叶片半月形，宽4~6毫米，长2~3毫米，底部阔而弯入，叶缘及外面密生无数腺毛，分泌粘液可捕捉小虫；叶柄细弱弯曲，长约1厘米。花白色，顶生总状花序，萼片、花瓣均5片，雄蕊5枚，子房上位，1室。蒴果细小球形。</p> <p>生态分布：产我国中部，南部及东部各省；多生于山坡潮湿处，松林下及荒山草地中。</p> <p>药用部分：根、全草入药，4~6月采根。</p> <p>用途：性味甘、温，有毒。能治恶性疟疾，解诸疮毒，并治跌打损伤。</p> <p>用量：根1粒（不可多服，妇女、儿童忌服）全草5钱~1两。</p>
416	苦菜	苦莢菜，山莴苣。	<p>菊科</p> <p>植物形态：一年生直立草本。茎圆形，高达1米，有纵沟纹，全体有乳汁，叶互生，倒披形或倒卵形，羽状裂，裂片再齿裂，基部抱茎，先端尖，叶长10~30厘米，宽2~6厘米，表面绿色，背面绿白色。花乳黄色或白色，顶生总状排列的头状花序，总苞下部膨大。头状花序全为舌状花。瘦果黑色，卵圆形，扁平，有喙，上具冠毛。</p>

			<p>生态分布：产我国中部至长江以南各省；多生于山坡林边，溪边，路边草丛中。</p> <p>药用部分：根茎及叶入药，春夏采收。</p> <p>用途：根煎水服用，并用猪膀胱为引子。可治妇女血崩及子宫发炎。茎、叶煎汁服，可以解毒热。研粉末涂搽，可除去疣瘤。</p>
417	苦瓜	癩瓜	<p>葫芦科</p> <p>植物形态：一年生草质藤本。多分枝，有细柔毛，卷须不分枝。叶互生，肾状圆形，长和宽各约5~12厘米，通常呈鸟足状5~7裂至中部或近基部，裂片卵状椭圆形，基部收缩，边缘具波状齿，两面近平滑或有毛，叶柄长3~6厘米。花单性，黄色，雄花单生，有柄，长5~15厘米，中部或基部有苞片，苞片肾形或圆心形，萼5~6裂，花冠轮状，5裂，雄蕊3枚；雌花单生，子房下位，1室。纺锤形，具肉质刺瘤，先端有喙爪。果长椭圆形，卵形或两端均狭窄，全体具钝形不整齐的瘤状突起，成熟时黄色，自顶端三瓣开裂。种子包被在红色肉质的假种皮内。</p> <p>生态分布：全国各地均栽植。</p> <p>药用部分：根、种子、叶及瓜供药用。</p> <p>用途：果实性味苦、凉。能清热解毒。治大便带血，痲子，疖疮。种子性味苦、甘，益气壮阳。花治胃气痛。叶治一切丹火毒。用量：叶3钱研末服。</p>
418	苦参	苦生,野槐,地槐,地骨。	<p>豆科</p> <p>植物形态：落叶小灌木，高达1.5米，小枝细而为绿色，平滑无毛。叶互生，长椭圆形，长2~4.5厘米，宽0.7~1.5厘米，基部圆形或楔形，先端钝或尖，而微凹，全缘或为波状齿牙，近于无柄或有短柄，表面暗绿色，背面苍绿色，疏生有短柔毛，叶柄密生有灰色绢状毛。花蝶形，白色，粉红色或黄色，顶生长总状花序。荚果圆筒状念珠形，种子多颗，基部有萼宿存。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于向阳山坡灌丛或草地中。</p> <p>药用部分：秋季采根入药。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。能清热泻火，燥湿健脾，杀虫，去风，止痒。治湿热黄疸，热痢下血，毒蛇咬伤，风火牙痛，虫积腹痛，无名肿毒，皮癣，跌打损伤等。用量：2~4钱。</p>
419	苦楝	楝,紫花树,森树。	<p>楝科</p> <p>植物形态：落叶乔木，高可达15米。枝条肥大而广展，老时树皮粗厚，为暗褐色而纵裂，幼枝及叶均有苦臭味。叶互生，为大形二出或三出奇数羽状复叶，有多数小叶，小叶卵形或披针形，基部圆形或钝形，先端尖锐，边缘锯齿深裂、浅裂不整齐，通常为羽状浅裂，嫩叶两面初有灰褐色粉，后则脱落，表面鲜绿色，叶脉在背面凸起，侧脉终于锯齿头及齿底，叶柄大而圆，基部肥大。花浅紫白色，与叶同时开放，腋生圆锥状花序，花轴、花梗及萼有细毛，萼绿色，5裂，花瓣5片，雄蕊10枚，花丝联合成筒状，黄色，雌蕊1枚，子房着生于短柄的花盘上，球形，上位，6室。果为核果状，椭圆形，内果皮木质，灰黄色。</p> <p>生态分布：产我国黄河流域以南至海南岛；多生于村落城镇附近，或栽为行道树及庭荫树。</p> <p>药用部分：秋季采根皮，树皮，果实入药。</p> <p>用途：果实性味苦、寒，有小毒。能泻湿热，治疝气，心腹痛，虫积等病。根皮性味苦、寒，有小毒。用于驱蛔虫，条虫，蛲虫。花、叶及根皮煎汁可杀虫，治跌打损伤，疯狗咬伤等。用量：皮1钱5分~3钱，果1~3钱。</p>
420	茉莉花	茉莉,抹厉,木梨花,没利。	<p>木樨科</p> <p>植物形态：常绿灌木，高约1米。小枝扩展，弯垂，被短毛。叶对生，椭圆形至阔卵形，长3~9厘米，宽1.8~5厘米，基部楔形或圆形，先端钝圆，短尖或微凹，有光泽，叶脉在背面出现凸起，脉上疏生黄白色柔毛，叶柄短，向上弯曲，密生柔毛。花白色，有芳香，顶生或腋生聚伞花序，萼齿8~10枚，花冠高脚碟形，4~9片或重瓣，雄蕊2枚，子房上位，2室。浆果。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：春夏采花供药，秋后采根入药。</p>

				用途：花性味辛、苦、温，无毒；根热，有毒。能安眠，麻醉。用量：花1钱5分~3钱。
421	含羞草	怕丑草，知羞草，感应草。	含羞草科，豆科。	植物形态：一年生，有刺亚灌木状草本，高可达80厘米，茎披散，分枝，有散生利刺及无数倒生刺毛。叶互生，二回偶数羽状复叶，叶有敏感，触之既闭合而下垂，羽片4枚，指状排列于总状柄顶端，长4~7厘米，小叶多达21对，线状长椭圆形，长8~13毫米，先端短尖，无柄，散生有刺毛。花淡红色，球形头状花序，单生或2~3个生于叶腋，萼、花冠，雄蕊均4枚，子房上位，1室。荚果扁平，3~5节。 生态分布：归化植物，在广东、海南岛已成野生。 药用部分：全草入药，夏秋采收。 用途：性味甘、涩、微寒，有小毒。能安神镇静，止血收敛，散瘀止痛。主治咯血，神衰落，失眠，跌打内伤，脱肛，带状疱疹等症。用量：2~3钱，水煎服或配方用。
422	鱼腥草	蕺菜，猪耳朵，猪脚爪，足耳根，足耳草，狗贴耳。	三白草科	植物形态：多年生草本。茎下部伏地，生根、上部直立，高达60厘米、秃净，有时紫色，全体有鱼腥气味。叶互生，心形，长4.8~7厘米，宽4~6厘米，基部心形，5~7脉，先端渐尖，边全缘，两面除叶脉稍被柔毛外，全秃净，新鲜时表面暗绿色有细粒密生，背面常现紫色，叶脉长3~3.5厘米，基部鞘状，托叶下部与叶柄合生，线状长椭圆形，先端钝，花白色，顶生穗状花序，苞片4枚，呈花瓣状，白色，无花被，只有极小的小苞片1枚，雄蕊3枚，雌蕊3心皮，基部合生，子房上位，1室。蒴果顶端开裂。 生态分布：产我国长江以南各省；多生于溪谷草丛中或山坡丛林边湿地。 药用部分：全草入药，夏秋采收。 用途：性味辛、微温，有小毒。功能散热消肿。治肺痛，痢疾，恶疮，热咳，疮毒等症，又为蛇伤药，用量：5钱~1两。
423	卷柏	还魂草，九死还魂草。	卷柏科	植物形态：多年生常绿草本，高达15厘米。主茎极短，下生多数须根附生于岩石上，枝多而密，呈放射状丛生，各枝常为2歧，扇状分枝至2~3回羽状分枝，干燥时枝叶向顶上卷缩，故名“卷柏”。叶复瓦状密生，异形，表面绿色，背面苍绿色，侧叶为稍扁卵状钻形，或为稍扁状长圆状卵形，长约2毫米，宽约1毫米，先端有无色长刚毛，外侧缘极狭，膜质，无色，有时基部为暗褐色，几全缘；腹叶两行，为斜方卵状披针形，长约1.7毫米，宽0.75毫米，先端具无色长刚毛，边绿有微细锯齿。苞子囊穗生于枝端，四棱形，苞子叶三角状卵形，先端渐尖有芒尖，边缘膜质，具微细锯齿，背面龙骨状；苞子囊肾形，大小苞子囊的排列不规则。 生态分布：产我国南北各省；多生于沟谷林阴岩石积土上。 药用部分：全草入药，全年可采，但以夏季为主。 用途：性味辛、平。全草为收敛药，用于止血，脱肛，肠出血，痔疮出血，血尿等。用量：1~3钱。
424	卷耳	高脚鼠耳草，婆婆指甲菜。	石竹科	植物形态：直立丛生二年生草本，高可达30厘米，全体具灰黄色软毛。茎直立，基部稍倾斜，带紫红色。叶对生，根生叶匙形或广披针形，基部狭窄成叶柄，基叶狭长椭圆形乃至卵形，长1~2厘米，宽0.5~1.2厘米，钝头或微凸，基部圆形，全缘，主脉明显，凸出于叶背。花白色，顶生两歧聚伞花序，基部叶状苞片具短柄，萼5片，花瓣5片，顶端2裂，雄蕊10枚，2轮，子房上位，1室，花柱4~5枚。蒴果长管形，熟时顶端10齿裂。 生态分布：产我国中部各省；常成片生长田圃，路边及山坡草丛中，为常见的园圃杂草之一。 药用部分：全草入药，夏秋采收。 用途：治妇女乳痈及小儿风寒咳嗽。用量：3~5钱。
425	鸢尾	冷水丹，蛤蟆跳缺，蝴蝶花，兰蝴蝶。	鸢尾科	植物形态：多年生草本。根茎匍匐多节，节间短，淡黄色。叶二列式互生，扁平剑形，长30~45厘米，宽约2厘米。花紫兰色，总状花序，生于花茎顶端，花被6片，雄蕊3枚，子房下位，3室，花柱3分枝，而扩大呈花瓣状，外展复盖着雄蕊。蒴果长椭圆形。 生态分布：产我国各地；多生于山坡林边，灌丛边阴湿处或沟谷草丛中。 药用分布：根茎入药，夏秋采收。

			用途：性味辛、辣、凉，有小毒。治食积胀满，扁挑腺炎及跌打损伤等。全株又可治牛跌伤断骨。用量：3~5钱。
426	虎杖	酸桐杆，黄药子， 黄地榆，酸汤杆， 酸筒管，蛇总管。	蓼科 植物形态：高大粗壮多年生草本，高0.3~5米。根茎木质，黄色，蔓延各处，茎中空，圆柱形，嫩时有红紫色斑点，无毛，节有膜质鞘状托叶。叶互生，广卵形或卵状椭圆形，基部楔形，有短锐尖头，长5~15厘米，质硬，花白色或红色，单性异株，腋生或顶生总状花序，萼5裂，无花瓣，外列3片背面有翼，果时成长；雄花有8枚雄蕊；雌花子房上位，1室。瘦果卵形具三棱，暗棕色，包被在翅状的宿萼中。 生态分布：产我国长江以南至南部和西部各省；多生于山坡林边，溪谷边灌丛中。 药用部分：夏秋采根、茎入药。 用途：性味酸、苦、平、寒，无毒。根茎为收敛止血药，能发表散寒，散瘀血。主治跌打损伤，急性风湿性关节炎，腹水，黄疸，血热，闭经，狂犬病等。外用治疮肿，汤火伤。用量：根3钱~1两。
427	虎刺	绣花针，双绣花 针，伏牛花，寿庭 木，黄鸡脚，黄脚 鸡，黄鸡卵。	茜草科 植物形态：常绿有刺小灌木，高可达1.5米。茎枝有直刺，对生于叶柄间，枝细瘦，幼时有细毛。叶对生，卵形至椭圆状卵形，长5~18毫米，宽8~10毫米，基部圆形，先端尖或突尖，全缘，革质，边缘向外反卷，表面绿色，两面均无毛，主脉在两面隆起，侧脉不明显，花白色，1~2朵腋生，萼钟形，花冠漏斗状，均4裂，雄蕊4枚，子房下位，2~4室。核果近球形。生态分布：产长江以南至南部各省；多生于常绿阔叶林下阴湿处。 药用部分：夏、秋、冬三季均可采根、茎、果实入药。 用途：性味甘、平，无毒。能活血，凉血，驱风除湿，消肿利尿。治跌打损伤，风湿关节炎，妇女月经不调，黄疸水肿，肝脾肿大。用量：全株5钱~1两，水煎服；研末每次服5分~1钱。
428	虎掌	野根子芋，南星。	天南星科 植物形态：多年生草本，块茎球形，径2~3厘米。叶仅一片，掌状复叶，叶柄长3~60厘米，直立圆柱状，深褐色，小叶9~17片，几无柄，线状披针形或长圆状披针形，顶端小叶长10~25厘米，宽2~3厘米，其余小叶渐小。花深紫色或黄色，单性异株，肉穗花序自叶柄下部生出，高10~20厘米，佛焰苞片漏斗状，长5~6厘米，上部宽2厘米，苞片长圆披针形，边缘卷曲，遮蔽苞筒部上缘，上半部稍下垂，逐渐成为锐尖头，先端狭长成丝状，肉穗花序的延长部成丝状，无花被，雄蕊多数，雄蕊有短柄或无柄；雌花密集花序基部，子房卵状，1室。浆果球形，红色，聚成圆筒形的果穗。 生态分布：产我国南部各省；多生于山坡林下阴湿处或沟谷丛林下。 药用部分：7~8月采球茎入药。 用途：性味苦、温，有毒。为镇痉，镇痛，去痰药（未经炮制，不可内服）。外敷可治肿毒打伤。
429	虎耳草	挖耳草，佛耳草， 天荷叶，金线莲， 石荷叶，丝丝草。	虎耳草科 植物形态：多年生常绿肉质草本，高达40厘米。全草被长毛茸，具匍匐枝，紫红色或绿色，叶根生，肉质，圆形或心脏形，径4~12厘米，基部心形或截形，先端圆形，边缘有浅裂波状或疏生尖锐齿牙，表面绿色或具白色斑纹，被长刚毛，背面白色或淡紫色，密集细圆点，叶柄长8~12厘米。花白色，顶生圆锥花序，萼5深裂，花瓣5枚，雄蕊10枚，子房上位，2室。蒴果卵圆形，花柱宿存。 生态分布：产我国中部、南部至西南各省；多生于深谷林下阴湿处，岩石上或溪边丛林下。 药用部分：四季均可采叶及全草入药。 用途：性味微苦、辛、寒，有小毒。为解热消炎药。治痈肿、疮毒，中耳炎及吐血上喘之用。用量：3~5钱。
430	金丝草	黄毛草，金丝茅。	禾本科 植物形态：多年生小草。高达20厘米，秆丛生，直立或基部稍倾斜，具3~6节，节上具白色髯毛，少分枝。叶2列式互生，叶鞘短于或长于节间，口部或边缘被细长纤毛，余均无毛或下部者被短毛；叶舌甚短，纤毛状，叶片线形，扁平，稍可内卷或对折，长1.5~4厘米，宽1~3.5毫米，两面均生微毛。花乳黄色，具黄色细芒，顶生总状穗状花序，细弱而弯曲；

				<p>穗轴节间与小穗柄均压扁，两侧具长短不一的纤毛；无柄小穗含1两性花，第一颖背腹扁，具不明显的2脉，第二颖稍长于第一颖，具1脉，延伸而成细弱而弯曲的细芒，芒长15~18毫米，第二外稃稍短于第一颖，先端2裂，裂齿间伸出细弱而弯曲的芒，芒长18~24毫米，稍粗糙；有柄小穗与无柄小穗同形同性，但较小。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于山坡林边，溪边，山区村落墙缝以及旷野湿地。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味淡，凉。能清热，解暑，解毒药，利尿，止血，散热，感冒发热，中暑，尿血，肝炎黄疸，尿道感染，肾炎水肿，糖尿病，癌肿等。</p> <p>用量：5钱~1两。</p>
431	金丝桃	土连翘，夜来花树，金丝海棠，五心花，照明莲。	金丝桃科	<p>植物形态：半常绿灌木，高达70厘米，小枝圆柱形。叶对生，长椭圆形或狭长椭圆形，长4~9厘米，宽1.5~2.5厘米，基部楔形，抱茎无柄，先端钝尖，全缘，表面绿色，光滑，背面略现灰绿色。花黄色，顶生聚伞花序，萼片、花瓣均5枚，雄蕊多数，5束，子房上位，5室。蒴果圆卵形，室间5裂。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部各省；多生于山坡灌丛中或深谷丛林草地中。</p> <p>药用部分：秋季采根及果实入药。</p> <p>用途：根性味苦、涩，温。能祛风化痰止咳，治肝炎及腰痛。用量：根3~5钱。</p>
432	金线草	马蓼草，土三七，铁拳头，野蓼，一串红，大叶蓼辣。	蓼科	<p>植物形态：多年生草本。根茎粗短，茎直立，高达80厘米，节部膨大。叶互生，椭圆形至倒卵形，长7~20厘米，宽4~9厘米，基部渐狭成叶柄，先端尖锐，表面常具斑点，几无毛，叶鞘管状膜质，有短缘毛。花淡红色，顶生穗状花序，花被4裂，宿存，果时增大，雄蕊常5枚，子房上位，1室。瘦果卵形，包被于宿存花被内。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于林下阴湿处，溪谷边草丛中。</p> <p>药用部分：夏秋采全草入药。</p> <p>用途：性味辛、涩、微寒，无毒。能散瘀止血，解毒利气。治吐血，咳血，下血，血崩。用量：2.5钱~1两。</p>
433	金缕梅	木里仙，牛踏果。	金缕梅科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达10米。小枝幼时密生有绒毛。叶互生，椭圆状倒卵形至倒卵形，长8~10厘米，宽5~8厘米，基部狭心脏形，先端短而渐尖，往往一侧偏斜，边缘有波状齿牙，表面有短毛，背面有灰色绒毛，叶柄短而粗壮，长3~5毫米，亦被绒毛，托叶早落。花金黄色，数花丛生于叶腋，花萼4裂，花瓣4片，雄蕊4枚，子房上位，2室。蒴果2瓣裂。</p> <p>生态分布：产江西、湖北、湖南等省；多生于山坡、溪谷、阔叶林缘，灌丛中；为高山树种，垂直分布常在海拔1000米以上。</p> <p>药用部分：秋后采根入药。</p> <p>用途：治劳伤乏力。</p>
434	金鱼藻	软草，细草，松藻。	金鱼藻科	<p>植物形态：多年生沉水草本，全株绿色，茎细长，长达90厘米，有分枝。叶通常5~12片轮生，稠密，叶片数回叉状分裂，长1.5~2.5厘米，稍脆硬，有微小刺状锯齿，无柄。花带红色，单性，腋生，具8~12片总苞；雄花雄蕊多数；雌花子房长卵形，上位，1室。小坚果革质卵圆形，顶端有宿存的花柱，基部有刺。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：四季采全草入药。</p> <p>用途：性味淡、凉，无毒。治内伤吐血。用量：1~2钱。作散剂服。</p>
435	金锦香	装天罐，张天罐，七孔莲，金石榴。	野牡丹科	<p>植物形态：灌木状草本，高达70厘米。茎四棱形，被黄色平伏刚毛。叶对生，披针形或线状披针形，长3~5厘米，宽0.2~1厘米，基部圆钝，先端渐尖，全缘，被短毛，纵脉3~5条，背面叶脉明显，沿叶脉上着生短毛，叶柄短或近无柄。花淡紫红色，顶生头状花序，萼片、花瓣均5片，雄蕊8枚，子房下位，4室。蒴果椭圆形，萼宿存。</p>

			<p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于荒山草地。</p> <p>药用部分：全草入药，7~10月采。</p> <p>用途：性味微苦、温，气香，无毒。能去风散寒，化痰止咳，收敛止血，去腐。主治肺结核咯血，心胃气痛，白浊，闭经，小儿疳积，牙痛，痢疾，口腔炎，毒蛇咬伤等。用量：3钱~1两。</p>
436	金钱松	金松，水树。	<p>松科</p> <p>植物形态：落叶乔木，高可达40米。树干挺直，枝条轮生，平展，树皮幼时淡褐色，老时亦褐色并块状开裂；小枝光滑，有长短枝的区别，长枝上具叶痕，短枝呈棍棒状，表面有环纹密接。叶线形，稍作镰状弯曲，长枝上的叶作螺旋状着生，具叶柄，短枝上的叶丛生，每15~30片呈星状排列，叶片长2.5~6厘米，宽1~2毫米，基部渐狭，先端尖，中肋隆起，旁有灰色气孔线2条，黄绿色，质柔软，至秋后变成金黄色，故名“金钱松”。花单性，雄花成茅荑状，每花由20枚左右的雄蕊组成，雌花呈长椭圆形或圆柱形，生于着叶的短枝顶端，由多数长卵形的胚鳞组成，每个胚鳞腹面基部着生2个胚珠。多数种鳞聚生成为球形木质球果，每种鳞具2个种子，种子斜卵形，顶端附翅。</p> <p>生态分布：特产我国江西、湖南、安徽、浙江等省；全国各地城镇庭园中均有栽植。</p> <p>药用部分：立夏前后采收根皮和近根树皮供药用。</p> <p>用途：治顽癣，食积和黄胖病等。</p>
437	金钟花	黄藤，迎春柳，迎春条。	<p>木樨科</p> <p>植物形态：半常绿灌木，高达3米。枝细长，蔓延扩展，小枝略呈四棱状，有黄格状髓，平滑无毛。叶对生椭圆状长椭圆形至披针形稀为倒卵状披针形，长8~14厘米，宽约3.5厘米，基部楔形，先端尖，边缘在中部以上有锯齿，有时近于全缘，表面暗绿色，背面淡绿色，平滑无毛，叶柄长0.4~1.2厘米。花淡黄色，先叶开放，1~6朵腋生，萼4裂，花冠钟形，4裂，雄蕊2枚，子房上位，2室。蒴果卵形，先端嘴状。</p> <p>生态分布：产我国东部各省；多生于溪边丛林中，沟边，常与琴叶榕等一起生长。</p> <p>药用部分：全株供农药用，全年均可采收。</p> <p>用途：全植物体有剧毒，使用时要特别注意。能杀死水稻田中各种害虫，而且用这种农药处理的稻秆，用来饲养耕牛，不会使耕牛中毒。</p>
438	金银花	忍冬，银花藤，二宝花，双花。	<p>忍冬科</p> <p>植物形态：半常绿缠绕性木质藤本，长达9米。小枝青绿色，密被短柔毛，老枝无毛，皮层常呈剥裂状。叶对生，卵形至长椭圆形状卵形，长3~8厘米，基部圆形或近于心脏形，先端尖或渐尖，稀为钝形，全缘，边缘有短柔毛，表面绿色，背面淡绿色，幼时两面均有短柔毛，老叶表面无毛或仅叶柄上短残存短柔毛。花初开时白色后变黄色，2花腋生，萼5裂，花冠管状，上部分裂呈2唇形，向外反卷，雄蕊5枚，子房下位，2~3室。浆果球形，熟后黑色而有光泽。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于山坡灌丛中，溪谷，路边丛林中。</p> <p>药用部分：春采花，夏秋采茎、叶（藤）入药。</p> <p>用途：藤性味甘、辛，寒。花性味甘、苦，寒。能利尿，清热解毒，杀菌。治关节炎，肠炎，淋症，对肠痢及诸化脓性疾患都有效。用量：花3~5钱；藤1~2两。</p>
439	金荞麦	铁拳头，贼骨头，接骨莲，天荞麦，金锁银开，野荞麦，搭搭麦。	<p>蓼科</p> <p>植物形态：多年生草本。地下茎黑褐色，块状，有膝状突起，须根多。茎直立或微斜，高0.5~1.5米，中空而节间膨大，黄绿色或红褐色，光滑无毛。叶互生，三角形，基部箭状，先端尖，长3.5~8厘米，宽3~6厘米，全缘，微有波状突起，两面无毛，托叶鞘筒状，膜质，叶柄纤细，长2~5厘米。花白色，腋生或顶生圆锥花序，花被5裂，雄蕊8枚，红色，子房上位，1室，花柱3裂。瘦果三棱形，黑褐色。</p> <p>生态分布：产我国中部；多生于破房边和沟边等阴湿肥沃处，村落、城镇庭园中常有栽培。</p> <p>药用部分：根、叶、茎入药，夏秋采用。</p> <p>用途：根性味平、甘，微苦。治赤白痢，虫、蛇、犬咬伤，痈疽，毒疮。为跌打损伤要药。用量：根3~8钱。</p>

440	金樱子	糖罐子，鸡屁股，三叶勒，倒挂金钟，倒挂金钩，刺梨子，山鸡头子，山石榴	蔷薇科	<p>植物形态：缠绕性有刺灌木，长可达3米，新枝密布褐色细刺，刺端有红色腺点，老枝具粗壮倒钩刺。叶互生，常为3小叶，小叶椭圆状卵形至披针状卵形，长2~7厘米，宽1.2~3厘米，先端突尖，渐尖或钝，边缘有细锐锯齿；托叶线状披针形，叶脉网状于背面较明显。花白色，单生于新枝顶端，萼筒膨大成瓶状，有细刺，花萼、花瓣均5片，雄蕊多数；雌蕊线状，多数，分离，包藏于瓶状花托内，被有绒毛。花托成熟时红色，肉质浆果状，有细刺，内含有多数瘦果。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于山坡灌丛，荒山草地中。</p> <p>药用部分：秋冬采果，全年可挖根入药。</p> <p>用途：根性味微酸，平；果甘、平。根活血散瘀，止痛利水。治痢疾，肠炎，跌打，腰痛。果补血，固精，益肾。治神经衰弱，神经性头痛，高血压，遗精，慢性肾炎，叶外敷肿毒，溃疡，汤火伤。用量：果3~5钱，根5钱~1两。</p>
441	金毛狗尾草	狗尾草，狗尾巴，光明草。	禾本科	<p>植物形态：一年生草本。秆直立或基部略倾斜，高可达1米。叶二列式互生，线形，长达40厘米，宽0.2~0.9厘米，先端长尖，基部钝圆，表面粗糙，背面光滑，边缘略粗糙。花绿色或淡紫色，顶生圆柱状穗状花序，小穗椭圆形，先端尖，基部有刚毛，刚毛长约为小穗的1~3倍，金黄色或略为褐色。颖果长椭圆形，黄色或灰色，有细点状皱纹。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于荒山草地、林边、路边、溪边草丛中。</p> <p>药用部分：春夏采根及全草入药。</p> <p>用途：性味平淡，无毒。治牙痛，痈疮，狗咬伤等。用量：全草5钱~1两。</p>
442	柿	牛果，锁头迦，猴枣。	柿树科	<p>植物形态：落叶乔木，高达9米。小枝黄绿色，有黄褐色柔毛和少数白色皮孔。叶互生，椭圆形以至长椭圆形，长7~14厘米，宽4~8厘米，全缘或呈波状弯曲，基部圆形以至阔楔形，先端短尖，表面叶脉初有茸毛，后变光滑，深绿色，背面叶脉明显，有光泽，侧脉隆起，密生灰白色短柔毛。花黄白或黄绿色，单性或杂性同株，雄花2~3朵集生成聚伞状花序；雌花单生，萼4裂，花冠壶状4裂，雄蕊16枚，雌花有雌蕊1枚和8个不成熟的雄蕊，子房球形，密生白色毛，上位，8室。果实褐色稍呈压扁的球形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：根、树皮、果、果蒂入药。秋季采收。</p> <p>用途：蒂和根性味平、涩，无毒。果蒂下气止呃逆为祛痰及芳香开窍药，能开窍辟恶，行气血；治卒中暴厥，多痰，心腹痛，产后血晕等症。果有润肺，生津，宁咳之效，用为镇咳祛痰药。根能清热凉血，治吐血及痔疮。用量：果蒂2~3钱，根1~3钱。</p>
443	柚	朱栾，文旦，抛。	芸香科	<p>植物形态：常绿乔木，高达15米。树皮褐色平滑，小枝扁形，被柔毛，具棘刺。叶互生，单身复叶，革质，具油腺点，叶翅宽，成倒心脏形，叶片阔卵形至卵状椭圆形，长8~20厘米，宽2~5厘米，先端尖，全缘或微波状的锯齿。花白色，单生或丛生，小伞形花序，花萼4浅裂，花瓣4片，雄蕊多数，连合成束，子房上位，11~14室，着生于发达的花盘上。果为球形大柑果，果皮光滑，淡黄色，多油腺点。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省。</p> <p>药用部分：果皮入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、甘、温，无毒。消食化痰，及解酒毒。治肾脏肿，宿食停滞，湿痰咳逆及疝气等症。用量：2~3钱。</p>
444	柞木	凿树，刺凿，葫芦刺。	大风子科	<p>植物形态：常绿乔木，高可达20米。下部干枝有刺，树皮灰色，成片状剥落；小枝平滑或微被柔毛。叶互生，革质，卵形或椭圆状卵形，长3~7厘米，宽2~4.5厘米，先端渐尖，基部圆形或宽楔形，边缘有锯齿，两面无毛，叶柄长4~10毫米。花单性异株，黄色或黄绿色，腋生总状花序；萼片4片，无花瓣，雄蕊多数，子房上位，1室。浆果球形，熟时黑色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡、林边、溪边，村落附近。</p>

			药用部分：根、枝、叶、种子入药，除种子秋季采收外其他全年可采用。 用途：根性味苦、平，无毒。一说酸，涩。能催生利窍。治黄疸、瘰癧、鼠痿及难产。叶性味苦、涩、寒。能散瘀消肿。用量：根4~6钱。
445	柘树	穿破石，柘桑，野荔枝，文章树，七层皮，野梅子，奴柘，石刺。	桑科 植物形态：落叶乔木，高可达15米，树皮灰褐色，有不规则的薄片剥落，枝条细长，密生，嫩枝有细毛，细条纹和直刺。叶互生，卵形或倒卵形，长3~11厘米，宽2~7厘米，基部圆形或楔形，先端短尖或渐尖，全缘，表面深绿色，背面淡绿色，幼时稍有毛，渐次脱落，侧脉5~7对，叶柄长2~3厘米，托叶细小，侧生。花黄绿色，单性异株，腋生球形头状花序；花被4裂，雄蕊4枚，雌花4片花被包围着子房，子房上位，1室。果为多数瘦果，聚生成球形肉质复果，熟时桔红色或橙红色。 生态分布：产我国黄河流域以南至南部各省；多生于山坡及河岸丛林中，村落，城镇，旷野均有生长。 药用部分：木白皮，根或根白皮入药，全年均可采用。 用途：性味苦、微凉。能清热凉血，舒筋活络。治血瘀血崩，风虚耳聋，腰肾冷，梦遗，小儿鹅口。用量：根3钱~1两。
446	柘藤	野黄鳝藤，穿破石，山黄茛，金腰带，黄龙脱壳。	桑科 植物形态：直立或攀缘性落叶灌木，高可达5米。根鲜黄色，根皮薄片状，多达7层；树皮灰褐色，枝有粗壮锐刺。叶互生，革质，椭圆状卵形至长椭圆状卵形，长3~8厘米，基部楔尖或钝角形，先端钝或短尖，两面光滑无毛，叶脉8~10对。花黄绿色，单性异株，腋生球形头状花序，花被、雄蕊4枚，雌花4片花被，厚肉质，包埋着子房。多数瘦果聚生成肉质球形复果，熟时橙黄色。 生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于常绿阔叶林或沟谷丛林中。 药用部分：根皮入药，夏秋采收。 用途：性味微苦，微凉。能凉血散瘀，舒筋活络。治血丝虫病，肺结核，跌打肿痛，闭经及风湿性腰痛。用量：根3钱~1两。
447	柃木	吹木叶，细叶菜，钓茄子。	山茶科 植物形态：常绿灌木或小乔木，高达5米。枝干灰色，皮孔显著，叶二列式互生，薄革质，椭圆形或倒披针形，长4~7厘米，宽2~3厘米，基部楔形，先端钝或急尖，边缘有钝锯齿，两面光滑无毛，表面主脉凹陷，羽状侧脉明显。花白色，单性异株，单生或丛生于叶腋而下垂，萼及花瓣均5枚，雄蕊多数，子房上位，3室。浆果球形，熟时由红色变黑紫色。 生态分布：产我国长江流域至南部各省；生于常绿阔叶树林，杉竹林中。 药用部分：茎、叶入药，全年均可采用。 用途：性味涩，能清热消肿。
448	柏	松柏，扫帚柏，香扁柏，柏树。	柏科 植物形态：常绿乔木。小枝条细柔下垂，高约15米，树皮深褐色，平滑，有时成带状的薄片而脱落，枝向上或平斜伸展，小枝纤细，圆筒形，黄褐色，当年之枝绿色，四棱形，具齿状的小叶。叶交叠对生，成4行，绿色，鳞片状，长2毫米，复瓦状排列，先端尖锐成针状。花单性同株，着生于小枝的先端，雄花直立，长圆形，雌花绿色，略为圆球形，胚鳞钝形，具多数胚珠，胚珠位于鳞片之内面。由8种鳞合成扁球形的球果，种鳞的先端有尖头，种鳞之内侧生多数窄而具翅的种子。 生态分布：产我国长江流域、河南及西南各省；多生于向阳山坡疏林中，村落附近也多有栽植。 药用部分：根、叶及球果入药，根、叶全年可采用，球果于8~10月已长大而尚未裂开时采用。 用途：果实性味苦、涩、温，无毒。治风寒感冒，胃痛及虚弱吐血。用量：果3~5钱。
449	桤柳	西河柳，山川柳，钻天柳，观音柳。	桤柳科 植物形态：落叶灌木或小乔木，高达5米。有柔弱、扩展或倒垂的枝条。叶细小，鳞片状、卵状三角形，基部鞘状，先端锐尖，嫩绿色。花淡红色，为疏散，下垂状的圆锥花序；萼片5枚，花瓣5枚，雄蕊5枚，花盘十深裂，子房上位，1室。蒴果3瓣裂，种子先端有丛毛。 生态分布：产我国北部盐碱地带至长江南部、云南、福建等省。 药用部分：根、细嫩枝条及叶入药，7~8月间采集。

			用途：茎、叶性味甘、咸，平。能疏风解表，透疹，利尿，麻疹已透及汗多者忌。用量：1~3钱。
450	柳杉	宝树，沙罗树，孔雀松。	杉科 <p>植物形态：常绿大乔木，高可达60米，主干通直，树皮赤褐色，纵裂成细长鳞片状脱落。叶在枝上成螺旋状排列，叶片线状钻形，顶端呈镰状弯曲，长约1.2~2厘米，基部常展开。宽1.2~2毫米，在小枝近基部的叶较小，长仅4~6毫米，嫩绿色，幼时两面均具白色气孔线，中肋于两面隆起，横断面呈扁平菱形，近中心部分有一个小形树脂管。花单性，雄花圆筒状，黄褐色，顶生短总状花序，雄蕊4~5药室；雌花紫色，球状，单生枝稍；每胚鳞具3~5胚珠。种鳞盾状，球果圆形，种子有狭翅。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于海拔800米以上的山坡及山脊和阔叶树混交，以武夷山脉为最多。城镇庭园中多有栽培。</p> <p>药用部分：树皮入药，全年可采。</p> <p>用途：治癰疮。</p>
451	枸杞	地骨皮，枸杞菜。	茄科 <p>植物形态：落叶灌木，茎匍匐，或下垂，高约1米。有刺，小枝淡黄色或淡灰黄色，有棱，或狭翅状，无毛。叶互生，或在枝基上有2或3叶聚生，无毛，卵形至卵状披针形，长1~5厘米，宽4~13毫米，基部楔形，顶端尖或钝头，全缘。花紫色，多3~5花腋生，萼钟状，3~5裂，花冠5裂，雄蕊5枚，子房长卵形，上位，2室。浆果卵圆形，或长圆形，熟时红色或黄色。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于荒地、山坡、田边、村落、城镇庭园中有生长。</p> <p>药用部分：根、叶、果入药，夏秋采收。</p> <p>用途：根性味苦、寒，无毒。能清肝肾，降肺中伏火，治骨蒸劳热，及肺热喘咳，腰脚痿软，吐血，烦热消渴等。果性味甘、平。能补肝肾、明目。用量：枸杞子（果）、根皮1.5钱~3钱。</p>
452	枸骨	十大功劳，猫儿刺，老虎刺，八角刺，老鼠刺。	冬青科 <p>植物形态：常绿灌木或小乔木。树皮灰白色，平滑，枝广展密生，叶互生，有短柄，硬革质，暗绿色有光泽，叶片长椭圆状直方形，长4~7厘米，宽2~4厘米，基部截状，两边有1~2尖刺，先端平圆，有3硬刺尖，但生在老枝上叶基部浑圆无刺。花白色，杂性，腋生伞形花序，萼杯状4裂，花冠4裂，雄蕊4枚，子房上位，4室。核果球形，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国北部及中部各省；多生于平地、丘陵、林边、灌丛中，或村落，城镇附近。</p> <p>药用部分：根、树皮、枝、叶、果（功劳子）入药，全年可采。</p> <p>用途：根、皮、叶性味甘、微苦，凉。祛风，清热解毒，凉血，补肝肾，健腰膝。作滋养强壮药。果性味苦、涩、微温。固涩下焦。用量：果2~3钱，根1~1两5钱，叶5分~2钱。</p>
453	枳橘	转组子，鸡爪梨，拐枣。	鼠李科 <p>植物形态：落叶乔木，高可达10米。树皮灰黑色，一年生枝深褐色，皮孔明显。叶互生，革质，阔卵形或卵状椭圆形，长7~15厘米，先端锐尖或长尖，基部圆形或心脏形，边缘有小钝锯齿，基部主脉3出。花黄绿色，顶生或腋生，短聚伞花序，花萼、花瓣、雄蕊均5枚，子房上位，3室。核果近球形，灰褐色，果柄在花后肥大肉质，扭曲，平滑，红褐色，味甜。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于阔叶树林中。</p> <p>药用部分：果实、果梗、叶、树皮、木汁供药用，果一般在农历9~10月份采集。</p> <p>用途：果实性味甘、平，无毒。能止咳除烦，去膈上热，润五脏，利大小便，止呕逆，解酒毒，避蛊毒，补气血。治头风，小腹拘急。皮性味甘、温，无毒，能和五脏。治五痔。木汁性味甘，平。治腋下狐臭。树皮、种子及叶又可治牛胎衣不下。用量：果实1.5~3钱。</p>
454	结香	野蒙花，蒙花，雪花树，密蒙花，盘龙叶，白叉树。	瑞香科 <p>植物形态：落叶灌木，高可达2.5米。枝棕红色，柔软，易弯曲，通常叉状分枝，树皮有明显皮孔，皮部富纤维。叶互生，通常聚生于枝端，长椭圆形或长椭圆状披针形，长7~15厘米，宽2~4厘米，基部楔形，先端渐尖，全缘，表面绿色，背面绿白色，嫩时两面有短毛，背面尤密，渐次</p>

				<p>脱落，主脉隆起，侧脉12~14对。花黄色，顶生头状花序，花被4裂，外面密被长黄白色茸毛，雄蕊8枚，子房上位，1室。核果卵形，熟时黑色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至西南各省；多生于沟谷，溪边较阴湿的林下。</p> <p>药用部分：全株入药，夏秋采收。</p> <p>用途：舒筋接骨，消肿止痛，解毒，明目。主治跌打损伤，腰疼骨痛，喉痹，梅毒，慢性皮肤病，头风，早期血丝虫病。</p>
455	络石	耐冬，石血，石龙藤，悬石，云英，白花藤。	夹竹桃科	<p>植物形态：常绿攀缘藤本，长可达10米以上。茎圆柱形，节稍膨大。叶对生，椭圆形或卵状披针形，老时革质，长短宽狭频不一致，长5~8厘米，宽1.5~2.5厘米，基部楔形，先端尖或钝圆，全缘，具有短柄，表面深绿色，平滑无毛，背面淡绿色，有短柔毛，或近无毛。花白色，芳香，腋生，聚伞花序，萼5深裂，花冠高脚碟状，5裂，雄蕊5枚，子房上位，2室。果为双骨突果，种子顶端有白色细绒毛一束。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多攀缘于林边老树上，岩石上，村落城镇围墙，大树上也常有生长。</p> <p>药用部分：茎、叶入药，秋末冬初采用。</p> <p>用途：性味苦、微寒，无毒。为祛风止痛药，能通络舒节，消痈疮热毒。适用于关节痛，肌肉痹痛，腰膝酸痛等症。外用敷刀伤肿痛，并有预防流产之效。用量：1~4钱。</p>
456	珍珠莲	小木莲	桑科	<p>植物形态：常绿攀缘灌木，小枝具棕黄色柔毛。叶革质，卵形至长椭圆形，长4~12厘米，宽2.5~3.5厘米，基部圆形或楔形，先端长尖或尾状，全缘或略带微波状，表面深绿色，有光泽，无毛，背面乳绿色，具柔毛，叶脉通常6~8对，基部为3出脉，叶柄粗壮，长约2厘米，初有密毛，后渐光滑。花单性，隐头花序，雌雄花均着生于球形的花托内，花托单生或成对着生于叶腋，无梗，托下苞片4枚，不脱落。瘦果多数，藏于花托内，花托发育成卵圆形或球形假果称为“无花果”，或“隐花果”。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至广东等省；多生于山坡或溪谷林边，攀缘于灌丛或岩石上。</p> <p>药用部分：藤及根入药，全年可采。</p> <p>用途：治慢性关节炎及乳痈。</p>
457	珍珠菜	扯根菜，山地榆，山高粱，大红袍。	报春花科，樱草科。	<p>植物形态：多年生直立草本，高达90厘米，多少被黄褐色卷毛。叶互生，长椭圆形形成卵状披针形，长7~15厘米，两端均渐狭，全缘而稍向叶背反卷，两面疏被黄色卷毛，背面颜色较浅。花白色，顶生总状花序，常倾向于一方，萼5片，花冠5深裂，雄蕊5枚，子房上位，1室，特立中央胎座。蒴果球形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于林边，灌丛边湿地，荒山草地也偶有生长。</p> <p>药用部分：根、叶供药用，秋季采集。</p> <p>用途：性味辛、微温，微涩。能活血调经，消肿散瘀。治水肿及小儿疳积。</p>
458	钩栗	大叶锥栗，大叶青柴，青叶栲。	壳斗科，山毛榉科。	<p>植物形态：常绿大乔木，高可达25米。树皮暗灰色或红褐色，呈薄片状剥落，枝粗壮，向上斜展，无毛。叶互生，厚革质，长椭圆形，长15~28厘米，宽8~12厘米，基部楔形，顶端狭细呈短尾状，中部以上边缘有粗锯齿，齿端细尖，有时锯齿不明显，表面绿色，无毛而有光泽，背面密被黄褐色鳞片状绒毛。脱落后呈银灰色，侧脉15~17对，中脉和侧脉上面凹陷，在下面隆起，叶柄粗壮，长2~4厘米，无毛。花单性，黄绿色，穗状花序，雄花序直立，雌花序短而粗壮；萼5~6裂，雄蕊10~12枚，子房下位，3室。坚果单生或数个聚生于果穗上，扁圆形似板栗状，外包被有锐刺的扁球状总苞，直径3~4厘米，熟时总苞4瓣裂开。</p> <p>生态分布：产我国长江中下游至福建、广东各省。</p> <p>药用部分：果实入药，秋冬采收。</p> <p>用途：治痢疾。</p>
459	钩藤	勾勾，钩藤勾，孩	茜草科	<p>植物形态：常绿木质藤本。小枝圆方形，嫩枝具白色粉末，以叶腋生出</p>

		儿茶。	<p>的钩状卷须攀缘他物，钩长约1.2~2厘米，光滑。叶对生，椭圆形，长1~9厘米，宽3~6厘米，两端均渐狭，表面光亮，无毛，背面稍带粉白色，侧脉7~8对，脉腋内有丛毛，干时褐红色。花黄色，顶生球形头状花序，花萼、花冠、雄蕊均5枚，子房下位，2室。蒴果长形，种子有翅。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至福建、西广各省；多生于阔叶林中或沟谷林边。</p> <p>药用部分：根、茎、叶及带钩的茎枝入药，钩及茎枝3月采收，根全年可采。</p> <p>用途：带钩茎枝性味甘，寒。为镇静药，能清热，平肝熄风，镇痉，治小儿惊风，手足拘挛，角弓反张，头昏目眩；又可治带下，斑疹等，根治风湿筋骨痛，跌打损伤。用量：钩2~4钱，根1~2两。</p>
460	娃儿藤	七层楼，青鸡白，土细辛，三十六荡，双飞蝴蝶，卵叶娃儿藤，三十六根。	<p>萝摩科</p> <p>植物形态：多年生蔓性草本，长约2米许，有分枝，茎光滑或略具倒生细柔毛，有乳汁，须根多，呈圆柱形，近肉质，表面灰色，内面黄白色。叶对生，卵形或长卵形，基部心脏形，先端急尖，全缘，表面绿色，背面淡绿色，两面密被短柔毛或仅脉上有短柔毛，有叶柄。花紫色，腋生聚伞花序，萼5裂，里面有鳞片，花冠轮状，5裂，副花冠的鳞片5枚，肉质，与雄雌花柱合生，花粉块2，近球形，2心皮，分离，子房上位，各1室。骨突果2枚，顶端长尖。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；生于山坡林边或沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：根入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、温，有小毒。能祛风，止咳化痰，散瘀，催吐，治哮喘痰咳，咽喉肿痛，跌打损伤，风湿痛。用量：1~3钱。</p>
461	秋海棠	八月春，断肠草，相思草，断肠花。	<p>秋海棠科</p> <p>植物形态：多年生草本，高60厘米。地下块茎球形，茎直立，光滑无毛。叶互生，斜卵形，长7.5~15厘米，宽2.5~5厘米，先端锐尖，基部斜心脏形，边缘有细锯齿，表面被细刺毛，叶背、叶柄及茎节处都带紫红色，叶柄长，叶腋生珠芽，落地生新苗。花淡红色，单性，顶生聚伞花序，雄花被4枚，雄蕊多数，雌花被5枚，子房下位，3室。花柱3歧，蒴果具3翅。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部；各省广栽培。</p> <p>药用部分：块根入药。</p> <p>用途：性味酸、涩、辛、凉。能行气行血，消肿止痛，镇痉。治瘰癧。</p>
462	独角莲	白附子	<p>天南星科</p> <p>植物形态：多年生常绿草本，全体平滑无毛。地下球茎卵形至卵状椭圆形，大小不一，生长3~4个年的球茎较大，长5~6厘米，宽3~4厘米，外面密被暗色鳞片，有环状节6~8条，剥出鳞片后呈乳白色，上端周围生须根10~20条，鲜时白色，干后淡棕色，表面多皱纹，根四周生纤细支根，无地上茎。1~2年生的通常只有1叶，3~4年生的有2~4叶，叶片大小不等，戟状箭形，长10~45厘米，宽7~35厘米，基部箭形，先端渐尖，全缘或带波状，叶面暗绿色，背面淡绿色而光亮，叶柄肥大，长40厘米以上，近下部有紫色的纵条斑点，内侧开裂呈鞘状，并由此抽出新叶，叶初生时外围以苞片，苞片宽披针形，待叶长大后仍留在叶柄基部，呈干燥膜状。花为肉穗花序，佛焰苞叶状，花序梗肥厚，圆柱形，长约12厘米，内侧稍扁平，表面绿色有紫色的细纵条斑点，佛焰苞下部呈管形，上部呈片状，卵形；佛焰苞内穗轴为肉质，长约14厘米，雌花序着生于基部，雄花序着生于上部，两花序之间相隔约2.5厘米，其上有肉质条状的不发育的中性花，在雄花序上具有中轴延伸成棒状的附属物，长约8厘米，紫色，不伸于佛焰苞的外面。果为浆果。</p> <p>生态分布：产我国南部至西南部。</p> <p>药用部分：球茎入药，春秋季均可采挖。</p> <p>用途：性味甘、辛、大温，有毒。能镇痛，祛风痰。治面部病，中风失音，心痛血痹，偏正头痛，喉痹肿痛，破伤风等症。（有毒，须炮炙方能内服）。用量：1~3钱。</p>
463	独行菜	六月雪，大叶香芥菜。	<p>十字花科</p> <p>植物形态：一年生或二年生草本，高30~50厘米。主根瘦长，白色。茎直立，中部以上多分枝，光滑无毛，或有细毛。基生叶多数，丛生而平展，</p>

			<p>具长柄，羽状深裂至全裂，顶裂片广卵形，较侧裂片为大，至开花时多渐枯萎；茎生叶匙形，倒披针形至线形，长1.5~5厘米，宽2~10毫米，边缘有大小不等的锯齿。花白色，顶生总状花序，萼片、花瓣均4片，有时晚出的花无花瓣，雄蕊常2枚，有时4枚，雌蕊1个，子房上位。短角果，扁圆形。</p> <p>生态分布：归化植物，我国南北各省均有分布；多生于路旁，荒地，屋旁及田间。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：应用同芥菜。能截症退热，治感冒。</p>
464	狭叶韩信草	半枝莲，并头草，望江青，挖耳草，溪边黄芩。	<p>唇形科</p> <p>植物形态：多年生草本，茎直立，4棱，高可达40厘米。叶对生，卵形至披针形，基部截形或心脏形，先端钝形，边缘具疏锯齿，茎下部的叶有短柄，茎上部叶近于无柄。花唇形，淡蓝紫色，顶生穗状轮生花序，每轮有花2枚，萼钟形，顶端2唇形，在花萼管一边的背部常俯有盾片，花冠管状，顶端2唇裂，上唇盔状，3裂，两侧裂片齿形，中间裂片圆形，下唇肾形2裂，雄蕊4枚，2强，子房上位，4裂，花柱着生在子房底部。小坚果4枚，球形，横生，有1弯曲的柄。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于河岸，沟边，路旁湿地或田边。</p> <p>药用部分：全草及根入药，5~6月开花时采收。</p> <p>用途：性味辛、微苦、平，无毒。能清热，除湿，解毒，活血，行气，破血通经，治癌，肝炎，毒蛇咬伤，妇科病，代益母草用，据说疗效很好。成人量：5钱~1两。</p>
465	垅牛儿苗	老鹳草	<p>垅牛儿苗科</p> <p>植物形态：多年生草本，高30~50厘米。茎匍匐地上，或斜上有分枝，被有绵毛。叶对生，有长柄，掌状3~5分裂，裂片长2~4厘米，长椭圆形或倒卵形，先端钝，初时表面长有紫黑色的斑点。花白色或红紫色，2~3朵着生于腋生花梗上，萼片、花瓣均5片，雄蕊10枚，子房上位，5室。蒴果喙状，有毛，成熟时果瓣迅速向上卷裂以弹出种子。</p> <p>生态分布：产我国中部各省；多生于山野、路旁、荒山草丛中。</p> <p>药用部分：夏秋采全草入药。</p> <p>用途：性味苦、微辛，温，无毒。为收敛、止泻药，又能强筋骨、祛风湿。治肠炎及赤痢，关节痛、麻木，皮风及损伤痹症（无风湿者忌用）。用量：3~5钱。</p>
466	牯岭勾儿茶	紫青藤	<p>鼠李科</p> <p>植物形态：落叶缠绕性灌木，高约3米。小枝圆形，黄褐色至棕褐色，无毛。叶互生，卵形，至阔披针形，长2.5~5厘米，宽1.2~2.5厘米，基部圆形或微呈心形，先端尖锐有尖头，全缘或叶缘上半部有波状齿，表面绿色，背面灰绿色，两面均无毛，叶脉羽状平行，侧脉7~10对，通常为8~9对，在背面甚为明显，叶柄长约0.6~0.9厘米，无毛，基部有小托叶1对，呈披针形。花带绿色，聚伞花序，通常形成狭窄的圆锥形花丛，花萼、花瓣均5枚，子房与花盘分离，上位，2室。核果长椭圆形，紫黑色。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于山坡向阳灌丛中或林缘。</p> <p>药用部分：根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味温，微涩。祛风湿。治关节酸痛，小儿疳积，妇女闭经。</p>
467	牯岭野豌豆	大叶软粳地料梢	<p>豆科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达80厘米。茎直立，光滑无毛，质坚硬，具棱线。叶互生，偶数羽状复叶，卷须不发达而成刚毛状，叶轴长约1.5~3.5厘米，上面具沟，无毛，或幼时有极稀疏短毛，叶柄长4~10毫米，托叶斜卵形或半心形；小叶2对，卵状披针形，卵形或卵状椭圆形，长4.5~9.5厘米，宽1.3~1.5厘米，基部楔形，先端渐尖或长渐尖，两面均无毛，中脉于上面凹陷，下面隆起，网脉明显，全缘，纸质，小叶柄极短或几无柄。花紫红色，蝶形，由10朵以上排列成腋生总状花序。荚果斜长椭圆形或斜长方形，种子1~5粒。</p> <p>生态分布：产我国江苏、浙江、江西等省；多生于山谷疏林下或水沟边草丛中，山麓林边及路边也有生长。</p> <p>药用部分：根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：同假木蓝。</p>

468	射干	开喉剑，老君扇，扁竹，一扇风，上山虎，高按山，凤凰草，野姜，两面子。	鸢尾科	<p>植物形态：多年生草本，高达1米。根茎匍匐，鲜黄色，须根多数，叶片2列式互生，扁平，对折呈剑形，长20~50厘米，宽2~3厘米，先端渐尖，基部抱茎，全缘。花橙黄色，顶生2~3回羽状聚伞花序，花被6枚，2轮，散生橘红色斑点，雄蕊3枚，子房下位，3室。蒴果，倒卵形，有萎缩的花被宿存。</p> <p>生态分布：各地均有栽培。</p> <p>药用部分：根茎入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、寒，有微毒。散胸中热气，消瘀通经，消瘀破结，开胃下食，镇肝明目，利尿消肿，杀蛔虫。治气逆，喉痹咽痛，胸膈胀满，积痰疔毒，二使不通，水蛊腹大，乳痈初肿，疟疾，感冒，牙痛。用量：8分~1钱5分。</p>
469	胜红蓟	藿香蓟，咸虾花，臭垆草	菊科	<p>植物形态：一年生直立草本，高约60厘米，有分枝，稍有香味，全株被粗毛。叶对生，卵形，长5~13厘米，基部钝或浑圆，罕有心形，边缘有钝齿，两面粗糙。花蓝色或白色，顶生头状花序，呈伞房状，总苞片长椭圆形，突尖，花全为管状花，两性，5裂。瘦果具5棱，顶端有具芒的鳞片5枚。</p> <p>生态分布：归化植物，我国南部城镇村落附近有野生。</p> <p>药用部分：茎、叶入药，夏秋采集。</p> <p>用途：性味微苦、凉，微有异臭。能清热解毒，消肿止血。主治感冒发热；外伤出血，疮疖，湿疹，中耳炎。用量：5钱~1两，水煎服，外用鲜草捣烂敷患处，或用鲜草绞汁滴耳。用两不拘。</p>
470	肺形草	胡地莲，乌乌盖月，双蝴蝶。	龙胆科	<p>植物形态：多年生常绿蔓性草本。茎细弱，缠绕他物上升，长达1.5米，但幼时茎极短，叶4枚，平贴地面至秋季始生出蔓茎。叶对生，基生4叶近无柄，平铺地面，由于叶表具有网状脉纹，状似肺泡，故名“肺形草”或“双蝴蝶”，叶椭圆形或倒卵状椭圆形，长4~11厘米。宽2.5~7.5厘米，基部阔楔形，先端圆或具凸尖，具3主脉，全缘，表面深绿色，有淡绿色网纹，下面紫色，茎叶对生，披针形或卵状披针形，长4~10厘米，宽1~3.5厘米，先端渐尖，基部钝或圆形，叶柄长3~20毫米。花淡紫色，1或2朵生于叶腋，萼筒长约1厘米，萼齿5，花冠狭钟形，长约4厘米，5浅裂，雄蕊5枚，着生于花冠管上；子房有柄，上位，1室。蒴果长圆形，种子多数，有翅。</p> <p>生态分布：产我国中部、南部至西南各省；多生于山坡、沟谷、阴湿丛林下。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、甘，寒。有祛痰止咳，清热解毒之效。用于治肺病。用量：3~5钱。</p>
471	胡荽	元荽，香荽。	伞形科	<p>植物形态：一年生草本，全体无毛，有强烈芳香气味，高达60厘米。根细长纺锤形，多须根，茎直立，中空，有条纹。叶互生，羽状分裂，根生叶1~2回羽状分裂，小叶广卵形，基部楔形，茎上部叶2~3回羽状分裂，小叶线状，长2~15毫米，宽0.5~1.5毫米，钝头，全缘。花白色或淡紫色，顶生复伞形花序。无总苞片，萼、花瓣、雄蕊均5枚，子房下位，2室。双悬果近球形。</p> <p>生态分布：我国各地栽培。</p> <p>药用部分：全草和果实入药。</p> <p>用途：全草性味辛，温，无毒。发散透表。果性味辛，温，无毒。强壮健胃，治虚寒的胃痛及胃肠机能衰弱，对于间歇热亦有效。用量：全草1~3钱，果实1~2钱。</p>
472	胡桃楸	核桃，山核桃。	胡桃科	<p>植物形态：落叶乔木，高达10米，幼枝有腺质柔毛。叶互生，奇数羽状复叶，小叶9~17枚，长椭圆形或卵状长椭圆形，边缘有细锯齿，基部钝或近截形，先端尖，长5~15厘米，宽2~6厘米，小叶表面通常光滑无毛，背面脉上有细柔毛。花单性，雄花序细长，茅荑状，从上年生的枝节上的腋间抽出，下垂。雄花花被3~6裂，雄蕊8~40枚，雌花序由少数花合成穗状，直立，有花5~10朵与叶同时开放，花被4片，子房下位，柱头二裂。</p>

			<p>核果球形，先端尖，不易裂开。</p> <p>生态分布：产我国东北、华北各省。</p> <p>药用部分：皮、叶供药用，夏季采集。</p> <p>用途：胃痛及腹痛有效。</p>
473	胡颓子	鸡卵子树，卢都子，罗都树。	胡颓子科 <p>植物形态：常绿灌木，通常有棘针，高达3米；小枝褐色，叶互生，椭圆形以至长椭圆形，长5~10厘米。基部圆形，先端尖或钝形，边缘波状而常卷曲，表面初时被鳞片斑，后则平滑有光泽，背面被有银白色鳞片斑并杂有褐色鳞片。花白色，有芳香，腋生伞形花序，花被管状，4裂，雄蕊4枚，子房上位。核果椭圆形，被有灰色或铁锈色鳞片斑。</p> <p>生态发布：产我国长江流域各省；多生于山坡疏林下，林边灌丛中。</p> <p>药用部分：果实、根、叶均可入药。</p> <p>用途：性味酸、涩、平，无毒。根性味淡、涩、温，无毒。果实治水痢，根煎汤洗恶疮疥癣；叶治肺虚短气。用量：根3~8钱，叶5分~1钱，研末冲服。</p>
474	郁李	寿李，雀梅，常棣。	蔷薇科 <p>植物形态：落叶灌木，高达1.5米，小枝纤细，分枝多。叶互生，纸质，卵状披针形至狭卵形，长3~5.5厘米，宽1~1.5厘米，基部圆形或宽楔形，顶端渐尖，表面绿色，无毛，背面浅绿色，仅脉上被稀疏短柔毛，侧脉稀疏，4~5对，主脉于背面隆起，边缘具浅细重锯齿，齿端有红色腺状尖头，托叶狭披针形，常2裂，边缘具腺毛状锯齿。花淡红色或近于白色，2~3朵丛生，稍先于叶或与叶同时开放，萼筒杯状，5裂，花瓣5片，雄蕊多数，子房上位，1室。核果近球形。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于山坡林缘或路边灌丛中。</p> <p>药用部分：夏季后摘取种子和果实入药。</p> <p>用途：种仁性味苦、辛、甘、平。下气利水，润燥滑肠。治腹水肿及大便燥结。用量：1.5钱~3钱。</p>
475	郁金	玉金，白丝郁，姜黄。	穰荷科 <p>植物形态：多年生大草本，高达1米余。地下有肉质肥大的块茎，椭圆形或长椭圆形，有分枝，横切面呈黄色，周围生多数细根，根端膨大呈纺锤形。叶基生，2列式互生，有长柄，基部叶的叶柄短，柄的上部旁裂呈鞘状，叶片长椭圆形，长15~37厘米，宽7~15厘米，锐尖头，侧脉由主脉分出，向前斜伸，基部狭窄，成圆形或楔形，表面光滑，背面密被柔毛，后变光滑。花白色，穗状花序圆柱状，直立，具有鞘状叶，顶端苞片较狭，先端淡紫红色，腋内无花，基部苞片阔卵形淡绿色，每苞片腋内开小花数朵，萼筒状，三齿裂，花冠筒部长，3裂；雄蕊4枚，呈花瓣状，下半部连合，其中1枚雄蕊较大，为唇形，中央1枚为有距的角状花药，子房下位，3室。蒴果3室。</p> <p>生态分布：产我国南部、西南部及台湾。</p> <p>药用部分：块根，根茎，冬春间采取。</p> <p>用途：郁金性味辛、苦、甘寒，无毒。能行气解郁，破瘀，止痛。治胸胁腹痛，肝胃气痛，月经痛，月经倒行，食欲不振，癫痫惊狂，热病神昏，湿热黄疸等症。姜黄性味热，无毒。能温中祛寒，治呕吐腹痛，胃中寒冷，下血等。用量：郁金1.5~3钱，姜黄2~4钱。</p>
476	荆芥	假苏，姜芥，鼠冥	唇形科 <p>植物形态：一年生直立草本，高达1米，全体具香气，上部多分枝，茎方形带紫色，四侧微凹，被下倾白柔毛。叶对生，下部叶羽状深裂为5片，中部叶羽状深裂为3片，上部花序的苞叶不分裂而无柄，裂片均呈线形至线状披针形，基部稍渐狭，先端尖或钝，全缘，表面绿色，背面灰绿色且具下凹小腺点，两面均被柔毛。花淡紫红色，密集成轮而形成顶生穗状花序，萼5齿裂，花冠管细，上部扩大，缘部裂成2唇，雄蕊2枚，子房上位，4室，花柱着生于子房底部。小坚果4枚。</p> <p>生态分布：产我国各地；多种于土质肥厚，阳光充足的田圃边。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛，微温，无毒。能清热散风。治头目，利咽喉，外感风热，头痛牙痛，目眩，咽喉痛，产后血晕，吐血，疥疮，淋巴结核。用量：1~3钱。</p>

477	荆三棱	三棱草，京三棱，带皮三棱。	莎草科	<p>植物形态：多年生草本，高达1米，根茎横走，疏分枝，节膨大，末端具黑色块茎，两端略尖，质坚硬。秆粗大三棱状，直立，有光泽。叶互生，线形，长20~30厘米，宽0.6~1厘米，基部鞘状而抱茎，先端渐尖，全缘，绿色而光滑无毛。花绿色，顶生复穗状花序，下托以叶状苞叶，小穗长圆形，颖片膜质芒状，雄蕊3枚，雌蕊花柱长，柱头2裂。瘦果三角状倒卵圆形，褐色。</p> <p>生态分布：产我国中部至长江流域。</p> <p>药用部分：块茎入药，8月采收。</p> <p>用途：性味苦、平，无毒。有行气，消积及止痛的功效。主治恶阻，产后腹痛，消化不良，经闭等症。用量：1.5~3钱。</p>
478	茜草	小活血，血见愁，红茜草，九龙根，挂拉豆，过山龙。	茜草科	<p>植物形态：多年生蔓性草本，长达90厘米。茎细弱，具四棱，棱上有倒生刺，攀缘他物上升。叶4片轮生，有长柄，叶片卵状三角形或狭卵形，基部心形，5~7脉自基部伸出，叶柄和叶背面中脉上有倒刺，叶长约2~6厘米，宽1~4厘米。花淡黄色，腋生或顶生聚伞花序，花萼通常不明显，花冠5裂，雄蕊5枚，子房下位，2室。浆果球形，熟时呈黑色。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡、林边、或灌丛边阴湿处，村落丛林边或路边草丛也常见。</p> <p>药用部分：全草或根供药用，9~10月采收。</p> <p>用途：性味苦、寒、无毒。根通经活血，散瘀镇痛，利尿，对咯血、吐血、衄血、尿血及妇女月经困难、脱肛、水肿等有效，又为跌打损伤、止血、神经性皮炎要药。用量：根3~5钱。</p>
479	苘草	水红花子，天蓼，东方蓼。	蓼科	<p>植物形态：一年生草本，高可达3米。茎粗壮，中空，节部膨大，分枝多，遍体有粗毛。叶互生，广卵形或卵形，长10~25厘米，宽8~15厘米，基部圆形或近心形，先端长尖，全缘，两面密被灰白色粗长毛，叶柄长达12厘米，有沟槽，密生粗长毛，托叶鞘状，有灰白色粗长毛。花淡红色或白色，顶生或腋生总状花序，花被5片，雄蕊7~8枚，子房上位，花柱上部2裂。瘦果扁圆形，黑色。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：果实及全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：果实性味甘、微寒，无毒。能消渴去热，清肺化痰，治淋巴腺炎。茎、叶治疝气，去疔。叶可治恶疮及毒蛇咬伤。花可散血，消积止痛。</p> <p>用量：果实1.5钱~3钱。</p>
480	草棉	棉花	锦葵科	<p>植物形态：一年生栽培作物，高1~1.5米。茎强壮，有少数分枝，嫩枝及叶上均有毛，或变光滑。叶互生，3~7掌状分裂，深不及中部，裂片卵状三角形，上端渐尖，基部心形。花黄色，带淡红色，单生于叶腋，花下有苞片3枚，宿存，花萼杯状，5浅裂，花瓣5片，雄蕊多数，花丝连合成筒状，包围花柱，子房上位，5室。蒴果圆球形，3~4裂，种子通常被有两层毛，一层长棉毛及一层短茸毛。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：种子、根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：种子能促进母乳分泌。兽医以种子治牛脚软症。根治月经闭止及痛经等。</p>
481	草乌	华乌头	毛茛科	<p>植物形态：多年生草本。块根稍呈狭长纺锤形，向地直下。茎高达1米许。叶互生，掌状深3裂，中央裂片菱形再3裂，边缘有缺刻状粗齿，先端尖。花碧紫色，腋生或顶生圆锥形花序，萼5片，花瓣状，上萼片特大，盔状，中部2萼片圆形，侧出，下部2萼片长椭圆形，斜生，花瓣2片，常变形成为密槽状，上部反曲，下部成柄，包于上萼片内；雄蕊多数，子房3~5个，上位。果为骨突果。</p> <p>生态分布：产我国冬部；多生于山坡灌丛边或荒山草地中。</p> <p>药用部分：主根，侧根入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、甘、大热，有剧毒。生药不可内服，须经炮炙方可内服。</p>

				为镇痉、镇痛剂，治关节疼痛，风湿痹痛，手足抽挛，半身不遂，里寒腹痛，阴疽漫肿，溃不收口等症。亦为神经与心脏镇静剂。此外，治急性肺炎，关节炎等症；并有降低血压，发汗，利尿作用。用量：3~8分。
482	草石蚕	宝塔菜，甘露子，地蚕，土虫角。	唇形科	<p>植物形态：多年生草本。地下有匍匐枝，顶端膨大，呈螺旋形的块茎，茎高30~60厘米，直立，有毛，方形，四棱，上有倒生的刺毛。叶对生，卵形或长椭圆状卵形，长3~10厘米，宽1.5~6厘米，先端尖锐或钝，基部心形或近圆形，边缘有锯齿，两面均有毛，叶柄长1~5厘米，苞叶披针形，两面有细毛。花淡红紫色，轮生，每轮有3~6朵，成顶生间断的穗形总状花序，萼钟状，5裂，花冠唇形，上唇直立而略反折，下唇平展，5裂，雄蕊4枚，二强，子房上位，花柱顶端2裂。小坚果黑色。</p> <p>生态分布：产我国北部及冬部；多生于溪边冲积土上。</p> <p>药用部分：块茎入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。能除风破血，散血止痛；治溪毒，走注风。浸酒内服能除风破血。</p>
483	草木犀	铁扫把	豆科	<p>植物形态：一年生草本，全体疏生细白毛，有香气。植株割下后，香气逾时更浓。高达90厘米，直立，多分枝，绿色，有纵纹。叶互生，3小叶，叶柄长1~2厘米，托叶线形，绿色；小叶3片，中间1片有柄叶片长椭圆形至披针形，长2厘米，基部楔形，先端钝，边缘在中部以上有尖齿，下部全缘，叶脉伸至齿边缘，表面绿色，背面淡绿色，两面均疏生细毛。花黄色，蝶形，腋生总状花序，萼钟状，5裂，旗瓣长于翼瓣，雄蕊10枚，两体，雌蕊1枚。荚果倒卵形，下垂。</p> <p>生态分布：产我国东北、华北、内蒙、西北、冬部各地；常生于沟边或路旁较潮湿处。</p> <p>药用部分：全草入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、凉、淡，无毒。能清热解毒，杀虫利小便。治皮肤疤，丹风，赤白痢、淋病。用量：3~5钱。</p>
484	草木王	无	肉座菌科	<p>植物形态：为冬虫夏草真菌类寄生于一种虫体内所形成的菌座和虫体，幼虫长约5厘米左右，体柔软，能自由爬行，成虫冬季蛰居土壤时，被真菌侵入体内，最后菌丝体充满虫体，夏天由虫体抽出子座，露出体外，虫体形似蜈蚣，脚短而小，腹部有脚6~8对。表面灰褐色，常一节深黑，一节紫红相间。</p> <p>生态分布：多生于山坡油茶林下或疏林下草丛石砾夹土地带的土壤中。</p> <p>药用部分：菌座及虫体均入药，宜于秋冬季菌座生出后，大量采挖，采时一触菌座就有苞子似烟样散出，采取后用草纸或棉花包好备用。</p> <p>用途：性味有大毒。不能内服，孕妇忌用。主治各种毒蛇咬伤（如蕲蛇、眼镜蛇、蝮蛇、青竹蛇、红丝线蛇），伤口红肿，头眩，抽搐、复视、昏迷，不省人事。用量：外用不拘。</p>
485	威灵仙	老虎须，搜山虎，华中威灵仙，铁脚威灵仙，铁威灵仙，小木通。	毛茛科	<p>植物形态：常绿攀缘性藤本，长达5米。根多数丛生，细长，外皮黑褐色。茎干后黑色，上具明显条纹，幼时被白色细柔毛，老时脱落。叶对生，羽状复叶，小叶3~5片，下部有时为单叶，叶柄缠绕性，长2~9厘米，小叶卵形或卵状披针形，长3~7.5厘米，宽2.5~4厘米，基部楔形或广楔形，罕有浅心形者，先端尖，全缘，表面沿叶脉有细毛，背面光滑，主脉三条。花白色，圆锥花序腋生或顶生，萼片4片，有时5片，花瓣状，雄蕊多数，雌蕊4~6枚，心皮分离，子房及花柱上密生白色毛。瘦果扁平状卵形，略生细短毛。花柱宿存，延长成白色羽毛状。</p> <p>生态分布：产我国黄河流域至南部各省；多生山坡林边，沟边，丛林边，灌丛中；村落、城镇附近偶有生长。</p> <p>药用部分：根及藤入药，春冬采收。</p> <p>用途：根性味辛、咸温，有小毒。藤性味辛、微苦、咸温，无毒。能止痛，祛风湿，通经络。治风湿痹痛，腰酸冷痛，黄疸，浮肿及鱼骨哽喉，亦用于跌打损伤。用量：根3分~5钱；藤、叶3~4钱，作煎剂或酒剂。忌服用茶。</p>
486	茶	茶叶，茶树，家	山茶科	植物形态：常绿灌木或乔木，高可达5米，多分枝，嫩枝有茸毛。叶互生

		茶，吃树，茗。		<p>草质，椭圆状披针形至长椭圆形，或倒卵状披针形，长4~10厘米，宽2~4厘米，基部楔形，先端短尖，边缘有锯齿，表面光滑无毛，背面幼时有短柔毛，叶柄短。花白色，腋生1~3朵，微有芳香；花萼、花瓣均5枚，雄蕊多数，子房上位，3室。蒴果木质化，扁圆三角形，室背开裂。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省。</p> <p>药用部分：根、叶入药，全年可采。</p> <p>用途：叶性味苦、甘、微寒。茶子性苦味、寒、有毒。根性味苦、平，均无毒。能清热，解酒毒，兴奋，止泻，利小便。用量：叶1~3钱，根3~6钱，子2~3钱。</p>
487	茶芎	抚芎	伞形科	<p>植物形态：多年生草本，高约30厘米左右，地下根茎粗壮，略呈聚集扁球形的团块，上具数轮环状叶鞘痕，下面着生有多数须根；地上茎极短，中空，干枯后凹痕较川芎为浅；根茎干后呈棕褐色，有香味。叶互生，2回奇数羽状复叶，小叶2~3对，阔卵形至椭圆形，长9~15厘米，叶柄长5~8厘米，有沟纹，叶鞘抱茎，叶基部阔楔形，先端渐尖或短尖，边缘有重尖锯齿或为缺刻状，表面深绿色，脉上及叶缘有短毛，背面淡绿色，几无毛。花及果缺（本种每年均不开花）</p> <p>生态分布：具称本种是在清朝末年由湖南引种而来。</p> <p>药用部分：根茎入药。</p> <p>用途：有散风寒、燥温之效。</p>
488	茭白	茭笋，菰。	禾本科	<p>植物形态：水生多年生草本。有肥厚的地下茎，高可达2米。叶二列式互生，扁平，线状披针形，长30~100厘米，宽10~25厘米，基部收狭或渐狭，先端芒状渐尖，秃净，有时上面粗糙，边缘粗糙，中脉背面凸出。花绿色或紫色，顶生圆锥花序，雄小穗线状圆柱形或两侧稍压扁，紫色。雌小穗线状圆柱形。颖果圆锥形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：地下茎、根、叶、果实（菰米）入药，夏秋采收。</p> <p>用途：地下茎性味甘、寒、滑、无毒；即秆肥大部分可用以利五脏，去烦热，除目黄，解酒毒，利二便及通经发乳。根可治胃痞热，止渴，利尿。叶利五脏。菰米性味甘、冷、无毒。止渴，解烦热，润肠胃。菰根性味甘、大寒、无毒。能清热消渴，治汤伤，小儿风疮蛇伤。虚寒作泻者禁食。</p>
489	荞麦	花麦，三角麦。	蓼科	<p>植物形态：一年生草本，高40~70厘米，茎直立，中空，质软，多分枝，淡绿带红色。叶互生，三角形或戟形，长2~8厘米，宽1.5~6厘米，基部心脏形，先端锐尖，叶柄长3~7厘米，托叶鞘状膜质，抱茎，斜形破裂。花白色或淡红色，顶生或腋生短穗状花序，花被5深裂，雄蕊8枚，子房上位，1室。瘦果三棱状。</p> <p>生态分布：我国各地栽植。</p> <p>药用部分：种子、叶、秆入药，农历9~10月采收。</p> <p>用途：种子性味甘、平、寒，无毒；一说酸，微寒。能实肠胃、益气力、消积滞，压丹石毒，降气宽肠，消热肿风痛，止汗。叶下气，利耳目，多食即微泻。秆治痈疽，蚀恶肉，去医疮，辟壁虎蜈蚣等。</p>
490	荠菜	荠，地米柴，田儿菜。	十字花科	<p>植物形态：冬季一年生草本，高可达35厘米。茎绿色分枝，有白色细柔毛。根出叶丛生，平铺地上，羽状分裂，裂片浅裂或成不规则锯齿状，两面对有细毛；茎上部的叶箭形，先端渐尖，基部抱茎，边缘有缺刻或锯齿。花白色，顶生或腋生总状花序，花萼、花瓣均4片；雄蕊6枚，4强，子房上位，2室。短角果三角形或倒心脏形，扁平。</p> <p>生态分布：广布我国南北各地；多生于路边、沟旁、田园边，村落附近园庭中极常见。</p> <p>药用部分：全草入药，冬春采收。</p> <p>用途：性味甘、平。能消风退热，清肝明目，和胃止血利尿。治肺出血，子宫出血，流产出血，月经过多，肠炎及赤，白痢。又为利尿剂和解热剂。还有降低血压的作用及收子宫功能。用量：1.5~3钱。</p>
491	碎米荠	米花香荠菜	十字花科	<p>植物形态：冬季一年生草本，高达30厘米，全株具毛。由基部多分枝，</p>

			<p>先端左右连续弯曲，尤以总花梗最明显。叶互生，羽状全裂，小叶9~11枚，卵形至线形，全缘或1~2裂。花白色，顶生总状花序花萼、花瓣均4枚，4强雄蕊，子房上位，2心皮。长角果线形，斜上或直立，长约10~20毫米。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；常生长在田边，田间潮湿地，路边，荒野及村落城镇庭园中。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏采收。</p> <p>用途：大致同荠菜。</p>
492	革命菜	苦菜，一颗针，飞机菜，野苘蒿。	<p>菊科</p> <p>植物形态：一年生直立草本，高可达80厘米。茎秃净，有浅沟纹。叶互生，具长柄，长椭圆形至椭圆形，长7~12厘米，基部楔形，先端锐尖，边缘有不规则的齿缺或有时浅裂，两面近秃净。花黄色至粉红色，头状花序少数聚成为顶生狭圆锥花序，总苞圆柱形，苞片约20余枚，线状披针形，边缘膜质，顶端有小束毛；花为管状花。瘦果狭圆柱形，赤红色，有线条，被小毛，冠毛白色，丰富。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于山坡林边，沟谷灌丛边，山区公路边湿地多有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味微辛、苦、平。嫩苗及嫩叶用开水泡煮，再用冷水漂去其苦味后可供炒食，是土地革命时期一种常用的野菜，故名“革命菜”。能消肿行气，健脾胃，利尿。治消化不良、营养不良性水肿。用量：2~3两。</p>
493	苘芹	异叶苘芹，鹅脚板，铁铲头。	<p>伞形科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达1米。被柔毛，枝、叶有香气。叶互生，根生叶及下部叶圆卵形，茎生叶3~5小叶，或2回3裂叶，或为近2回羽状复叶，上部叶裂片较狭，，小叶片长2.5~5厘米，有锯齿，有时近羽状深裂，两面均被柔毛。花白绿色，顶生复伞形花序，苞片1~2枚或缺，小苞片3~8枚或缺，线形，萼、花瓣、雄蕊均5枚，子房下位，2室。双悬果侧向压扁，卵形，有乳凸状小毛，棱不明显。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于山坡林边草地，沟谷灌丛中。</p> <p>药用部分：根及全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、甘，微温，气香。能散瘀，消肿，解毒。主治毒蛇咬伤，蜂螫伤，疟疾，鼻咽癌，痢疾。用量：根3~5钱，水煎服。外用全草捣烂敷患处。</p>
494	茵陈蒿	绵茵陈，茵陈，西茵陈。	<p>菊科</p> <p>植物形态：多年生草本，高可达1米。茎直立，基部木质化，上部多分枝，幼嫩时被有褐色细丝状软毛，老则脱落。叶互生，2回羽状分裂，裂片线形，叶片长1.5~4厘米，小裂片宽约1毫米，密被白绵毛，幼枝上的叶有柄，叶柄长3~6厘米，幼枝向上生长后，下部叶逐渐枯萎；老枝上及花枝上的叶无毛，无叶柄，基部抱茎，羽状全裂，裂片呈细毛状，长1~2厘米，绿色。花黄绿色，小头状花序成密集的圆锥花丛，花均为管状花，头状花序周围为雌花，中央为两性花。瘦果长圆形，无冠毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于河岸沙砾地，山坡及路边。</p> <p>药用部分：全草入药，以嫩茎、叶为主，秋冬采收。</p> <p>用途：性味苦、平、微寒，无毒；一说苦、辛，有小毒。为清热利尿药，能清湿热、利水通淋。主治黄疸及胆道诸疾患；并有发汗，解热，驱虫功用。近年来用以治传染性肝炎，有良好效果。用量：3~4钱。</p>
495	美豆	直苎麻	<p>荨麻科</p> <p>植物形态：一年生软弱多汁草本，高达40厘米。茎直立，圆柱形，常分枝，光滑无毛，有时呈透明状，淡绿色。叶对生，具有长短不一的柄，菱状广卵形，长1.5~10厘米，宽1~7厘米，基部广楔行，先端短锐尖或稍锐头，深绿色，无毛或仅表面及边缘有散生毛，边缘具三角形粗锯齿，基出3主脉。花绿色，单性同株，成密集的腋生聚伞花序，雄花花萼2~5片，雄蕊同数，雌花花萼3~5裂，雌蕊1个，子房直立，上位，1室。柱头无柄。瘦果广卵形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡林下，或沟边。</p> <p>药用部分：根、茎入药，夏秋采收。</p> <p>用途：同苎麻根。</p>

496	美人蕉	洋芭蕉，破血红。	美人蕉科，昙华科。	<p>植物形态：多年生草本，全体无毛。茎直立，高约1.5米。叶互生，宽大，长椭圆形，长10~30厘米，基部阔楔形至圆形，先端尖，全缘，中脉显著。花红色，顶生总状花序，苞片绿色，卵形，萼片3片，红色或绿色，披针形，花冠管状，3裂，雄蕊5枚，其中1枚具花药，绿色或红色，外3枚退化雄蕊较花冠更大，呈花瓣状，鲜红色。蒴果长卵形有软刺。</p> <p>生态分布：我国南部广栽植。</p> <p>药用部分：根茎入药，夏秋均可采用。</p> <p>用途：性味苦涩、寒、无毒。健脾益气。主治红崩，白带。用量：1~4两。</p>
497	扁豆	羊眼睛，娥眉豆，白扁豆，鹊豆，肉豆。	豆科	<p>植物形态：一年生缠绕性草质藤木，茎无毛。叶互生，3小叶，两侧小叶斜菱状阔卵形，顶生小叶菱状阔卵形，基部阔楔形，先端渐尖，两面被很稀的短硬毛，长5.5~12.5厘米，宽4.5~11厘米，有托叶。花红紫色，有时白色，蝶形，顶生总状花序，萼钟形，5裂，旗瓣菱状阔卵形，顶端微凹，雄蕊10枚，两体。荚果扁平，镰形或近椭圆形，种子扁椭圆形，黑色或白色。</p> <p>生态分布：我国南北各地均有栽培。</p> <p>药用部分：种子、花及藤、根、叶入药，白露后，种子成熟时采用。</p> <p>用途：种子性味甘、微温，无毒。能和中化湿，消暑解毒。治暑湿霍乱，泻痢呕吐，烦渴带浊，并解酒毒，河豚鱼毒。食用为缓和滋养的食品，易消化。花性味甘，平。能和脾健胃，止血解毒。治白带下，泻痢，一切药毒。叶治吐利后转筋，蛇伤。藤治“霍乱”。用量：种子1.5~4钱，花1~2钱。</p>
498	扁担杆子	棉筋条，山络麻，狗麋子，扁担格子。	椴树科，田麻科。	<p>植物形态：落叶灌木，幼枝具黄色星状毛。叶互生，卵形或菱状卵圆形至卵状椭圆形，长4~12厘米，宽2~6.5厘米，基部楔形或宽楔形至圆形，先端渐尖或急尖，边缘具不规则的锯齿或重锯齿，基部3出脉，表面粗糙；背面沿叶脉疏生星状毛，脉腋有丛生毛，叶柄长约6~15毫米，具星状毛，托叶线形。花小，乳黄色，伞形花序与叶对生，花萼、花瓣均5片，雄蕊多数，分离，子房上位，4室。核果，橙黄色或红色，顶端2~4瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡稀疏的杂木林内和林缘，或郊野、溪边灌丛中。</p> <p>药用部分：枝、叶入药，夏秋采集。</p> <p>用途：性味甘、苦温，无毒。健脾养血。治小儿疳积及妇女崩带。用量：3~5钱。</p>
499	姜	干姜,均姜,白姜，生姜，川姜。	姜科	<p>植物形态：多年生草本。根茎肉质扁平多节，黄色有芳香及辛辣味，茎高达80厘米。叶二列式互生，披针形至线状披针形，基部狭无柄，先端渐尖，平滑无毛。花橙黄色，顶生穗状花序，（通常不开花）。花下有绿色的苞片，层层包围，萼、花冠均3裂，唇瓣长椭圆状倒卵形，淡紫色，有淡黄色细斑点；雄蕊1枚，子房下位，3室。蒴果3瓣裂。</p> <p>生态分布：我国各地广栽植。</p> <p>药用部分：根茎入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、微温，无毒。生姜能发表散寒，温中止呕，消疾行水，解南星、半夏毒。干姜性温，可祛寒温中；泡姜温中，止血，止痛。用量：1~3钱。</p>
500	姜黄	毛姜黄	穰荷科	<p>植物形态：多年生宿根草本，高约1米。根茎横走成块状，其上生出多数圆柱状或指状的侧生根茎，呈深黄色，有芳香，根粗壮，自根茎丛生，其末端往往膨大形成纺锤状。叶根出，二列式互生，长椭圆形，长约20~45厘米，宽约6~15厘米，有多数羽状的平行脉由主脉向上斜伸，基部渐狭，先端渐尖，表面绿色，背面浅绿色，光滑无毛；叶柄长，下部呈鞘状。花黄色，穗状花序为密生圆柱形，自叶丛中抽出，先叶或与叶同出，苞片绿色，萼筒有3裂齿；花冠下部筒状，上部漏斗状，3裂，雄蕊4枚，呈花瓣状，黄色，其中一枚较大，为唇瓣，药一个，着生在瓣中央，子房下位，3室。蒴果球形，熟时3瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国南部及西南部。</p> <p>药用部分：根茎（姜黄）块茎（黄丝郁金）入药，立春前后采收。</p>

			用途：性味辛、苦、温，无毒。能行气除痹，破瘀通经。治胸腹胀气，风寒湿痹，痈肿疮毒，跌打损伤及黄疸水肿。用量：1~2钱。
501	南瓜	番瓜，番蒲，北瓜，番南瓜。	葫芦科 植物形态：一年生草质藤本，茎长达10余米。全体被刚毛，茎成五角棱，中空，节略膨大。叶互生，阔卵形，近于圆形或肾状心脏形，长约16厘米，宽约18厘米，略具3~5角或5浅裂，先端尖，叶缘略呈波状弯曲，具不规则的小齿牙，叶基深心脏形，叶柄比叶片稍长，圆筒形，叶柄中空，叶腋侧边生一卷须，长与叶柄相等，上部5歧。花黄色，单性，腋生，雌花柄比雄花柄短粗，雄花萼筒短，5裂，花冠钟状漏斗形，5裂，雄蕊5枚，顶部连合，蜜腺盘肥厚；雌花萼筒在子房上部平出，花冠漏斗形，有假雄蕊三枚，蜜腺盘肥厚，子房下位，1室。瓜果大小，形状色泽等，因品种不同而异。 生态分布：我国各省普遍栽植。 药用部分：根、叶、花、种子、瓜瓢、瓜蒂入药，果秋季果实成熟时采集。 用途：种子性味甘、平，无毒。能清热，祛湿。种子驱虫，炒后煎服。治产后手脚浮肿，糖尿病。用量：种子1~2两，根3~5钱。
502	南烛	牛筋，饱饭花。	杜鹃科，石南科。 植物形态：落叶灌木或小乔木，树皮茶褐色，剥落，小枝赤褐色。叶互生，广卵形或卵状椭圆形。基部圆形或心脏形，先端锐尖，长6~16厘米，宽2~6厘米，表面暗绿色，秃净，背面淡褐绿色。花白色，腋生总状花序，萼5裂，花冠长卵形，5裂，雄蕊10枚，子房上位。蒴果球形。 生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于山坡或山谷灌木丛中或林边。 药用部分：茎、叶、果入药，茎、叶全年可采，果秋季采收。 用途：枝、叶为收敛药或强壮药。能强筋，益气。子为强壮剂，有固精，增强体力的功效。茎叶捣烂渍汁煮饭，名为“乌饭”或将其汁浸粳米，九浸、九蒸、九晒，米粒紧小，适合长途携带，食少许可不饥。用量：果1.5~3钱。
503	南天竹	黄行，山黄芩，剪架，天竹。	小蘗科 植物形态：常绿直立灌木，高可达2米。茎圆柱形，丛生，少分枝，幼嫩部分呈红色，光滑无毛。叶互生，大形，常集生于茎梢，3回羽状复叶，具有基部紫色，膨大成鞘状的总叶柄，小叶近于无柄，狭卵形及披针形，长3~7厘米，宽1~2.5厘米，基部阔楔形，先端锐尖，全缘，革质有光泽，无毛，小叶下方及叶柄基部有关节。花白色，腋生圆锥花序，萼片多数重叠，每3片为一轮，逐渐过渡为白色的花瓣，雄蕊6枚，雌蕊1枚，子房上位，1室。浆果球状，熟时红色，有时呈黄色。 生态分布：产我国长江中下游各省；常生于湿润的山谷，山坡杂木林中或栽培于庭园中。 药用部分：根、茎、叶、果入药，全年可采，但果实秋季采收。 用途：全株性味苦、寒、无毒。能止泻除肿，强筋益气力，通经活络，镇咳强筋骨，止泻清热，解毒，治一切风疾，手、齿肿痛，筋骨痛，痔出血，跌打损伤。果实性味酸、甘、平，有毒。能敛肺止咳；治咳嗽气喘，小儿百日咳。用量：果实8分~1钱5分，全株1钱~1两。
504	南蛇藤	钻山龙，地南蛇，大南蛇，过山风，南蛇风，黄藤，过山虎。	卫矛科 植物形态：落叶缠绕木质藤本，长可达5米。秃净，多分枝，表面灰褐色或暗褐色，皮孔小而明显。芽鳞片呈刺状，小枝无毛。叶互生，革质，近圆形，倒卵形或长椭圆状倒卵形，长5~10厘米，宽3~6厘米，基部楔形至近圆形，先端钝或急尖，边缘有细钝锯齿，叶柄长1~2厘米。花淡黄色，单性异株，腋生聚伞花序，花萼、花瓣均5枚，雄蕊5枚，着生花盘边，子房上位，3~4室。蒴果，熟时棕黄色，3~4瓣裂。 生态分布：产我国南北各地；多生于山坡林边，灌丛中或荒山草地。 药用部分：藤、皮、叶及根部入药，夏秋采收。 用途：藤性味平、温、无毒；一说辛；皮、叶、子性味微凉。能散血通经，祛风湿，强筋骨，解毒，消炎。治瘫痪，四肢麻木，腰腿痛。用量：3~5钱。
505	南岭茺花	石棉皮，假黄皮，	瑞香科 植物形态：半常绿小灌木，高达60厘米，有强韧纤维质的皮部。叶对生，

		小叶金腰带, 石谷皮, 了哥王, 地棉根, 山雁皮。		<p>近无柄, 倒卵形至长椭圆形, 长2~5厘米, 宽8~15毫米, 两端均钝或短尖, 全缘, 侧脉多数, 极纤细。花黄绿色, 顶生近无柄的丛生花序, 花被管状, 雄蕊8枚, 2裂, 着生花被管喉部, 子房上位, 1室。浆果, 卵形。</p> <p>生态分布: 产我国长江以南至广东、福建等省; 多生于荒山草地的草丛或灌木丛中。</p> <p>药用部分: 根、叶入药, 夏秋采收。</p> <p>用途: 性味苦、寒、微辛, 有大毒。能攻毒结肿及诸郁热, 郁湿, 顽痰怪症。</p>
506	垂柳	水杨柳, 吊杨柳, 线柳。	杨柳科	<p>植物形态: 落叶乔木, 高达15米。枝条广展, 小枝下垂。叶互生, 线状披针形至狭披针形, 长8~15厘米, 宽2.5~4厘米, 基部圆形至锐形, 先端渐尖, 边缘具腺状小锯齿, 表面浓绿色, 背面粉绿色, 老时光滑。花单性异株, 绿黄色, 腋生茅荑花序, 与叶同时开放, 花盘腺状, 无花被; 雄花含雄蕊2枚, 雌花具1子房, 2心皮。蒴果2瓣裂, 种子有毛。</p> <p>生态分布: 产我国长江流域至南部各省。</p> <p>药用部分: 须根、枝、树皮、叶、花、果入药, 除花果春季采外, 余四季均可采用。</p> <p>用途: 须根、枝性味苦、寒, 无毒。能祛风邪, 除湿热。治风湿拘挛, 筋骨疼痛, 湿热带下及牙龈肿痛。花治风水黄疸, 恶疮, 金疮, 吐血, 咯血, 湿痹, 四肢挛急, 走马牙疳, 脚多湿汗。叶能治恶疮, 马疥, 心腹内血, 骨蒸劳热, 汤火疮毒入腹, 白浊, 眉毛脱落, 痘烂生蛆。果实能治溃痈。用量: 须根、枝4~8钱。</p>
507	响叶杨	响朴叶, 白杨树, 山白杨。	杨柳科	<p>植物形态: 落叶乔木, 高可达23米。树皮灰色, 老树基部为暗黑色, 稍有开裂, 枝细长向上伸展, 嫩枝棕色, 具柔毛。叶互生, 长枝叶片卵形, 长7~10厘米以上, 基部圆形或心脏形, 有2腺体, 顶端突尖或长尖, 缘边锯齿钝圆形向内弯, 齿端具腺, 幼枝和嫩枝上的叶密生灰色柔毛, 老壮树及老枝上的叶无毛, 短枝上的叶较小, 卵形或卵圆形, 长5~8厘米, 花单性异株, 茅荑花序; 早春先叶开放, 长而下垂, 雄花序基部具苞, 苞片顶端具裂, 早落, 雄蕊7~9枚, 雌花开放较迟, 无柄, 无被, 外有细裂的苞片, 子房卵状长椭圆形, 附着于花盘基部。蒴果具短柄至叶发育完成后成熟, 熟时2瓣裂。</p> <p>生态分布: 产四川、湖北及长江下游各省; 多生于山坡疏林边, 砍伐迹地及幼松林地。</p> <p>药用部分: 根、叶入药, 叶夏季采收, 根秋季采收。</p> <p>用途: 能散瘀治疼痛。</p>
508	牵牛子	丑牛子, 白丑, 黑丑。	旋花科	<p>植物形态: 一年生缠绕性草质藤本, 长可达5米, 全株密被刚毛, 多分枝。叶互生, 有长柄, 叶片深裂, 全缘, 基部心形或戟形, 中裂片卵圆形, 先端突尖, 侧裂片斜卵形, 先端突尖或渐尖, 全缘, 两面均伏生刚毛。花淡紫色或蓝色, 腋生2~3朵, 朝开午闭, 萼片5枚, 花冠漏斗状, 5浅裂, 雄蕊5枚, 子房上位, 3室。蒴果球形, 3室, 每室含种子2枚。</p> <p>生态分布: 产我国南北各省; 多生于山坡, 灌丛中, 村落, 城镇, 围篱, 及墙上也极常见。</p> <p>药用部分: 种子入药, 8~10月采收。</p> <p>用途: 性味辛、热, 有小毒。能泻气分湿热, 逐痰消饮, 治大便闭结, 小便不利, 水肿喘满, 脚气食滞, 腹胀肠鸣, 肠风, 气秘及虫积等。用量: 1~2钱。凡气虚, 湿热在血份及孕妇均禁用。</p>
509	费菜	马三七, 铜打不死, 晒不干。	景天科	<p>植物形态: 多年生肉质常绿草本, 根茎丛生, 高可达25厘米。叶互生, 无柄, 长椭圆形, 倒卵形至匙形, 基部狭楔形, 先端钝, 边缘钝锯齿, 绿色, 厚肉质。花黄色, 顶生伞房状聚伞花序, 萼片、花瓣均5枚, 雄蕊10枚, 子房上位, 5心皮离生。果为5个骨突果聚生。</p> <p>生态分布: 产我国中部各省; 多生于林边岩石上或沟谷灌丛边草地上。</p> <p>药用部分: 全草入药, 全年可采。</p> <p>用途: 性味酸。能破血, 凉血, 活血。</p>
510	星宿菜	矮合子, 赤脚草,	报春花科, 樱草科	<p>植物形态: 一年生秃净草本, 高达60厘米。茎直立, 淡褐色, 基部近红</p>

		金鸡肚下王，泥鳅菜，矮挑草，大田基黄。	<p>色，少分枝。叶互生，长椭圆状披针形，长约5~8厘米，两端渐尖，全缘，略向背面反卷，背面颜色较淡。花白色，顶生总状花序，萼、花冠5裂，雄蕊5枚，子房上位，1室，特立中央胎座。蒴果椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于山坡、草溪谷灌丛边草丛中，路边、村落附近湿地也常有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、平、微苦，无毒。能利水消肿，解毒，止血。治胃炎，乳腺炎，黄疸，疝气，结合膜炎，痢疾，中耳炎，跌打损伤，妇女白带、月经不调。用量：5钱~1两。</p>
511	看麦娘	薏公草，牛头猛，山高粱。	禾本科 <p>植物形态：一年生草本。须根细弱，秆少数丛生，软弱，光滑，节处通常膝曲，高达40厘米。叶二列式互生，叶鞘光滑，常短于节间，叶舌薄膜质，叶片扁平线形，长3~10厘米，宽2~6毫米。花灰绿色，顶生圆柱状的穗状花序，长2~7厘米，小穗椭圆形或卵状长椭圆形，颖膜质，基部互相连合，具3脉，外稃膜质，近基背处具芒。颖果长约1毫米。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于水田中及水沟边湿地。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏采收。</p> <p>用途：其种子可作蛇药，全草能消水肿。</p>
512	香附	香附子，金香附，沙草，附米。	莎草科 <p>植物形态：多年生草本。根茎膨大呈纺锤形的块状，地上茎呈三棱形，高达60厘米。叶丛生根部，长线形，叶鞘闭锁包茎。花深茶褐色，穗状花序，总状或伞形排列，下有叶状苞片4~6。花两性，无花被，雄蕊3枚，雌蕊1枚，柱头3裂。瘦果倒卵状长圆形，具3棱。</p> <p>生态分布：广布我国南北各地；多生于平地，丘陵，盆地，田边，村落，城镇庭园湿地常有生长。</p> <p>药用部分：块茎入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、微苦，平。能理气开郁，调经止痛，治饮食积聚，诸气腹胀及痼疽等症。生用破血，酒炒补血。用量：1.5~3钱。妇科用量：3~5钱。</p>
513	香椿	椿芽树。	楝科 <p>植物形态：落叶乔木，高达25米。树皮灰褐色，纵裂或狭长条裂。叶互生，偶数羽状复叶，长达60厘米，小叶8~22对，对生，披针形或长椭圆状披针形，长6~12厘米，宽2~4厘米，基部不对称，圆形或阔楔形，先端长尖，边缘具疏齿或近全缘。花白色，顶生下垂圆锥花序，长达50厘米，萼3裂，花瓣5片，雄蕊5枚，退化雄蕊5枚，子房上位，5室。蒴果长椭圆形，木质，种子扁平，有膜翅。</p> <p>生态分布：产我国南北各省。</p> <p>药用部分：根皮、树皮、叶、花、果供药用，4~5月采根皮、干皮或树皮，夏末秋初采花（果实），夏秋采叶。</p> <p>用途：皮性味淡、温、无毒。能发表，透麻疹。治赤白泻痢，疗血崩及肠风下血等症。果实性味辛、苦、温，无毒。能祛风寒，治冷骨及风湿关节。用量：皮1~3钱，果2~3钱。</p>
514	香茶菜	熊胆草，风血草。	唇形科 <p>植物形态：多年生草本，高可达60厘米，茎方形，直立，多分枝，稍被短毛。叶对生，卵状披针形，长3~6厘米，宽2~3厘米，基部阔楔形，先端渐尖或钝，边缘有粗齿。花白色略带紫色，细小，腋生或顶生疏散圆锥花序，萼钟形，5裂，花冠唇形，4裂，雄蕊4枚，资方上位，4裂。小坚果4枚。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于溪谷湿地，村落附近田边或水沟边。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、苦，凉。能清热，利湿，退黄，主要用于急性黄疸型肝炎及急性胆囊炎。用量：5钱~1两。</p>
515	厚朴	重皮，亦朴，淡伯。	木兰科 <p>植物形态：落叶乔木，高7~15米。树皮紫褐色，枝开展，小枝粗壮，幼时绿棕色，被绢毛，老枝灰棕色，光滑，皮孔大而显著，圆形或椭圆形，叶痕大，半圆形或广椭圆形，有显著环状托叶痕。叶互生，密集于小枝顶端；叶柄粗壮，长2.4~4厘米，无毛；叶片倒卵形或长倒卵形，长22~40厘米，宽10~20厘米，革质，先端钝圆或具极短尖头，基部楔形或阔楔形，</p>

				<p>全缘，表面无毛，幼叶背面被灰白色短绒毛，老叶呈白粉状，叶背中脉明显凸出，侧脉20~30对。花与叶同时开放，白色有芳香，单生枝顶，花茎12厘米左右，花被9~12片，雄蕊、心皮均多数，分离，螺旋状排列于伸长的花托上。骨突果穗卵状椭圆形，长达12厘米。</p> <p>生态分布：产我国中部和长江流域各省。</p> <p>药用部分：树皮、花及果供药用，5~6月锯20年以上的大树，剥下皮，经加工后即成，4~5月采花，夏季采果。</p> <p>用途：皮性味苦、辛，温。能温中理气散满，燥湿消积，治胸腹胀满，反胃呕吐，宿食不消，泄泻痢疾，气逆作喘。花性味微苦，温。功同厚朴，力较弱，民间治感冒咳嗽。果实，消胃部膨胀及鼠痿。用量：皮1~3钱，花1~2钱。孕妇禁用。</p>
516	庐山厚朴	凹叶厚朴	木兰科	<p>植物形态：落叶乔木，高达9米。树皮灰白色，小枝黄绿色或淡绿色，枝上叶痕大而显著，皮孔圆形或椭圆形。叶互生，在新枝上为丛生状，革质，椭圆状倒卵形，长20~45厘米，宽12~24厘米，基部楔形至圆形，先端凹陷，成2圆裂，裂口深2~5厘米，全圆或微波状，表面深绿色，背面淡绿色，主脉在下面隆起，表面主脉基部有沟形下陷，羽状脉12~24对，于近叶缘处互相连接，网脉隆起，叶柄圆柱状，长3~5厘米，基部稍膨大。花白色，大形，有香味，单生于枝顶，与叶同时开放，花被9~12片，或更多，雄蕊多数，螺旋状排列于伸长的花托上，雄蕊多数，螺旋状排列于花托顶端。骨突果穗卵状长椭圆形，熟后木质。</p> <p>生态分布：产江西、浙江，安徽，福建，广西等省。</p> <p>药用部分：同厚朴。</p> <p>用途：同厚朴。</p>
517	贯众	贯仲，黑狗脊。	贯众科、叉蕨科	<p>植物形态：多年生常绿草本，高达80厘米。根状茎粗短，倾斜至直立，叶柄丛生，密被宽卵形或线形红棕色鳞片，鳞片边缘流苏状。叶片长椭圆形至披针形，长15~45厘米，宽10~17厘米，1回奇数羽状复叶，小叶10~20对，互生，镰刀形，纸质，无毛；小叶片长4~9厘米，宽1~3厘米，边缘有细锯齿，基部圆形或上侧成耳状，先端长渐尖，有短柄，叶轴被鳞状毛。孢子囊群圆形，多数，散生于小叶背面，囊群盖大形，盾状。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于山坡林边，溪边丛林下及岩石湿地。</p> <p>药用部分：根茎秋后采（连叶柄残茎）入药。</p> <p>用途：性味苦、寒，有小毒。能清热散瘀，止血解毒，杀虫，预防时疫。治金疮，血崩带下，产后血气胀痛，斑疹毒，子宫出血，衄血，痢疾等。</p> <p>用量：1.5~3钱。</p>
518	凉粉草	仙人冻，仙草。	唇形科	<p>植物形态：一年生草本，高达50厘米。茎下部伏地，上部直立，被疏生长毛。叶对生，卵形或卵状长圆形，长2~4厘米，基部渐收缩成柄，先端稍钝，边缘有小锯齿，两面均有疏生长毛；在花序上部的叶较小，呈苞片状，卵形至倒三角形，较花为短，基部常带淡紫色，结果时脱落。花淡红色，轮生，总状花序，柔弱；萼小，钟状，二唇形，上唇3裂，下唇全缘，果实成筒状，花冠唇形，4裂，雄蕊4枚，子房上位，4室。小坚果4枚，椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于山坡湿地，沟谷草丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏采收。</p> <p>用途：性味甘、淡，寒。能清热解毒，凉血利尿。主治中暑感冒，高血压，肌肉、关节疼痛，糖尿病。用量：5钱~1两。</p>
519	凌霄花	七九藤，红花倒水莲，九爪龙，凌霄，紫葳。	紫葳科	<p>植物形态：落叶木质藤本，茎上有攀缘小气根。叶对生，奇数羽状复叶，小叶7~9枚，叶柄上面有沟槽；小叶卵形至卵状披针形，长2~7厘米，宽1.5~3厘米，边缘有粗锯齿5~8个，基部阔楔形或稍带圆形，两面无毛。花唇形，橙红色，由三出的伞形花序组成稀疏顶生的圆锥花序；萼钟状，5裂，花冠漏斗状钟形，5裂，雄蕊4枚，2强，假雄蕊1枚，子房上位，2室，基部具一大花盘。蒴果，革质2瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国北部至长江流域一带；多生于山坡林缘，沟谷丛林中</p>

			<p>或村落附近也有生长。</p> <p>药用部分：花、叶、茎、根入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：花性味酸、微寒，无毒。能凉血去瘀，治经闭小腹胀痛，产后乳肿，崩中带下，有清血消炎之功效，孕妇忌服。根性味、功能与花相同，用于去瘀活血，通经祛风，治风湿痹痛。用量：花1.5~3钱，根3~5钱。</p>
520	海风沙	海风丝，丝带藓。	<p>平藓科</p> <p>植物形态：多年生绿色藓类植物。茎长丝状，匍匐或有鞭状枝，假根伸入树皮中，小枝略呈羽状。叶卵状线形，长而尖。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于阴湿处的树干或树基部的树皮上。</p> <p>药用部分：全草入药，全年均可采收。</p> <p>用途：刀伤止血。将全草洗净，去掉泥渣，研末包敷伤口。</p>
521	海金沙	邓山青，铁蜈蚣，罗纲藤，竹园菱，蛤蟆藤。	<p>海金沙科</p> <p>植物形态：多年生蔓性草本，缠绕茎长达3米。叶有两种，营养叶稍呈革质，2回羽状复叶，羽片对生，长10~20厘米，宽与长相等或略狭，外形略为三角形，叶州弯曲，上部有窄翅，小叶5~11枚，基部无节，在顶端及上部的小叶为单叶，线形至披针形，基部楔尖或近心形，先端钝，边缘有钝锯齿，或于下部分裂，中部的小叶戟状或近掌状分裂，最下部的羽片为1~2回羽状复叶，叶轴有翅，小叶的形状与上部及中部的小叶相同，但较小。孢子叶与营养叶相似而缩小，孢子囊单生，沿裂片中脉成行排列而形成穗状，穗长5~10毫米，每一孢子囊为一特殊的子囊群盖所被复，子囊群盖内向开裂，孢子具多数小疣。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部；多生于山坡林边灌丛中，荒山草地及溪谷丛林中。</p> <p>药用部分：全草及孢子入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、寒，无毒。通利小肠，解热毒气，调经接骨，补脾健胃。治伤寒狂热，湿热肿满，小便热淋，石淋，经痛，痘疮变黑，水肿，小儿食积，筋骨痛。孕妇忌服。用量：全草5钱~1两；孢子（海金沙）2~3钱。</p>
522	海州常山	矮桐子，臭牡丹，臭梧桐。	<p>马鞭草科</p> <p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达8米。茎直立，表面灰白色，茎中有白色的髓，髓中有淡黄色的分隔，幼枝圆形或带四方形，表面有褐色短毛。叶对生，叶柄长1~8厘米，密被淡褐色短柔毛，叶片广卵形至椭圆形，长4~15厘米，宽2~9厘米，基部楔形至截形，先端渐尖，全缘或有微波齿，表面深绿色，背面淡绿色，幼叶两面均具白色短柔毛。花红色及白色，顶生聚伞形花序，花萼带赤色，5深裂，花冠管状，白色，5裂，雄蕊4枚，子房上位，为不完全的4室。浆果状核果，扁球形，蓝色，外围有宿存的红褐色萼片。</p> <p>生态分布：产我国黄河流域至南部各省；多生于山坡林边，沟谷及溪边丛林中。</p> <p>药用部分：根或叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、平，无毒。治积食饱满，小便不利，跌打损伤及小儿疳疾，近用于降血压。用量：5钱~1两，作煎剂或炖肉服。</p>
523	倪藤	野番豆，小叶买麻藤，海风藤，麻骨风。	<p>倪藤科，买麻藤科。</p> <p>植物形态：常绿木质藤本，长达7米。茎枝圆形，皮灰褐色或暗褐色，皮孔明显。叶对生，椭圆形，狭椭圆形或倒卵形，革质，长4~12厘米，宽2.8~3.5厘米，基部楔形或稍圆，先端急尖或渐尖而具钝尖头，稀呈钝圆形，表面光绿色，侧脉细，在叶两面均隆起不达于叶缘即行弯曲，细脉在叶背相交形成明显的网眼，叶柄长5~8毫米。花单性异株，腋生穗状花序，雄花具环状总苞9~13轮，每轮有花40~70朵，花被管四棱状盾形；雌花序多生于老枝上，环状总苞较密，每轮有3~5朵雌花，珠被管短。成熟时总穗长达10~15厘米，种子长椭圆形，卵圆形或方状倒卵形，长15~20毫米，径约11毫米，近无柄，具小突尖，种子可炒食。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于沟谷常绿阔叶树林边，或沟边丛林中。</p> <p>药用部分：老藤及根入药，全年可采。</p> <p>用途：藤性味辛、温，无毒。驱风祛湿，解热，通利筋络，活血行血，治四肢麻木无力，扭伤，挫伤，骨折，腰腿痛，关节痛，筋骨酸软，疔</p>

			疾发热，生汁内服治毒蛇咬伤。用量：藤2~3钱。
524	徐长卿	逍遥竹，了刁竹。	<p>萝摩科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达80厘米。地下茎短，须根多，有香气。茎瘦长，圆柱形，无毛，有纵皱纹。叶对生，线状披针形，长2.5~8厘米，宽0.5~0.8厘米，基部楔形，先端锐尖，全缘，叶缘稍向背面卷曲，两面平滑无毛，叶柄长约5毫米。花淡黄绿色，顶生或腋生聚伞花序，萼5裂，花冠5裂，雄蕊5枚，花药聚生，包围着柱头，各药室有1枚花粉块，下垂，副花冠着生于雄蕊之上，呈鳞片状，子房2个，上位。骨突果，平滑。种子有毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于高丘陵山坡荒山草地。</p> <p>药用部分：根或全草供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：根性味辛、温，无毒。能发表，解毒止痛，行气活血，祛风胜湿，开胃。治风湿关节炎，急性胃肠炎，肝炎，肝硬化腹水，小儿疳积，跌打损伤，便秘，蛇咬伤，惊风。用量：根2~4钱。</p>
525	将军树	红将军，红面将军，胭脂木，白桂木，狗卵果，大红袍，乱枫荷。	<p>桑科</p> <p>植物形态：常绿乔木，高可达10米。树皮暗紫色或绣色，成薄片剥落，根鲜红色，小枝被紧贴的柔毛，植物体有乳汁。叶互生，椭圆形至倒卵状或椭圆状长椭圆形，长8~17厘米，宽4~8厘米，基部楔形，先端渐尖或短渐尖，全缘，但幼叶常为羽状浅裂，表面仅中脉被微柔毛，背面灰绿色或带白色，初时在脉上被紧贴微柔毛，后来脉腋间有粉末状的丛毛，侧脉每边7~8条，弯拱，干时表面带灰色，背面灰白色，主脉干时黑色，叶柄长10~15毫米，被毛，托叶线形或狭三角形，长约2毫米，被毛，脱落后疤痕不成环状。花单性同株，绿色或黄绿色，单生叶腋，雄花序倒卵形至棒状，萼片4片，雄蕊1枚；雌花序球形，花萼管4裂，子房上位，1室。复果球形，黄色或橙黄色，干时红褐色，直径3~4厘米。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于沟谷常绿阔叶林中。</p> <p>药用部分：根入药，秋冬采收，复果熟后味甜，可食。</p> <p>用途：能活血，通络，催乳，治头痛，风湿性关节炎和缺乳等症。用量：5钱~1两。</p>
526	桃	桃树，毛桃仁，扁桃仁，毛桃。	<p>蔷薇科</p> <p>植物形态：落叶小乔木，高达7米。树皮暗红色，皮孔横裂，新枝绿色，光滑，常带紫红色。叶互生，狭卵状披针形，长约8~15厘米，宽2~4厘米，基部楔形，先端渐尖，叶缘有锐锯齿，在叶柄上端的两旁各具一个腺点，有时在叶片基部的两旁也具腺体；托叶线形，羽毛状，早落。花粉红或白色，先叶开放，单生叶腋，花萼、花瓣均5片，雄蕊多数，子房上位，1室。核果，近圆形或卵圆形，密被短柔毛，有腹沟一条。</p> <p>生态分布：产我国北部及中部；多栽培于庭园中。</p> <p>药用部分：未成熟的干燥果实（桃干）、桃仁、叶、花、树皮及根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：桃干性味苦、微温。桃仁性味苦、甘、平，无毒；一说温。通脉，通润大便，破蓄血，杀三虫，辟瘴疠。桃毛（嫩果绒毛）性味辛、平，微毒；治血闭血瘀，寒热积聚，带下，崩中。花性味苦、平、无毒。除水气，利大小便，下三虫，消肿满。叶性味苦、平，无毒。去胃中热，解蛊毒，杀诸疮虫。桃胶性味苦、平，无毒。能行血，除胃中热，治沙气腹痛，腰痛，蛊毒以五痔。用量：桃干1.5~3钱，桃仁1.5~3钱，花3~8分，根3~5钱。</p>
527	桃金娘	岗稔，稔子，山稔，乌肚子，当梨了，当梨。	<p>桃金娘科</p> <p>植物形态：常绿灌木，高可达2米。外皮褐色，幼枝密被柔毛，小枝淡黄色，嫩苗红色。叶对生，薄革质，椭圆形或倒卵形，长3~6厘米，宽1.5~3.5厘米，基部阔楔形，先端钝，全缘，基部有主脉3条，很少5条，表面深绿色，无毛，背面灰绿色，密被茸毛，叶柄短，长4~6毫米，花玫瑰红色，1~3朵，腋生，萼钟形，4~5裂，多少与子房合生，花瓣4~5枚，雄蕊多数，分离，子房下位，2~6室。浆果，球形，熟时暗紫色，顶上有宿存的萼片。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于丘陵灌丛中及荒山草地中。</p> <p>药用部分：根、叶、茎、果实入药，秋冬季采根，叶全年可采，夏末秋初收果（果可食）。</p> <p>用途：性味甘、辛，微涩，平。茎叶有收敛作用，能止血止泻，止痛，</p>

			散热，拔脓生肌。根能活血通经，解久热不退，治心痛。果可食，能滋养补血，健大肠，治蛇伤。用量：根5钱~1两，果3~5钱，大便秘结者忌服。
528	桔	桔子，朱桔，金桔，三湖桔。	芸香科 植物形态：常绿灌木，高达3米。小枝纤弱，徒长枝有棘刺，叶互生，革质，具油腺点，叶片椭圆形，长6~10厘米，宽2.5~4厘米，两端渐尖，全缘或有波状锯齿，上面深绿色，下面淡绿色，中脉稍凸起；箭叶狭长。两性花，腋生，白色，芳香，花萼小，5裂，花瓣5片，质厚，雄蕊多数，花丝合生；子房上位，花柱粗大，早落，柱头头状。柑果扁圆形或圆形，直径约4厘米，顶端稍凹入，基部圆形，果皮朱红色；内瓢7瓣，果肉赤橙色，汁橙黄色。种子卵形，先端有短咀状突起。 生态分布：产我国南部各省。 药用部分：叶（桔叶）、果皮（陈皮）、种子及桔络均入药，秋季采收。 用途：叶性味苦，平；能行肝气，消肿毒，倒胸肋逆气，治乳痈，乳癌，乳痛等。皮性味辛、苦、温；能理气，健脾胃，燥湿化痰，治胸腹胀满，食欲不振，呕吐腹泻，咳嗽等症。核性味苦，平；能消肿止痛。桔络性味苦，平；能通络，顺气，活血，化痰。用量：核1~3钱；桔络5分~1钱，果皮1~3钱，叶1~2钱。
529	桔梗	白药，梗草。	桔梗科 植物形态：多年生草本，高可达1米，全株光滑无毛。根肉质，呈圆筒形，下部渐小，通常如指大，外面淡黄褐色，鲜时光滑，干后有深纵皱，折断面白色或淡黄色，味苦，茎通常直立，单一，有时基部倾斜生长并分枝。叶对生，互生或轮生，近于无柄，生于茎中下部的叶对生或3~4叶轮生，卵形，长椭圆形以至卵状披针形，长3~6厘米，宽1~2.5厘米，边缘有锐锯齿，基部渐狭，先端短尖，表面深绿色，背面白绿色，茎上部的叶渐小，呈狭披针形，互生。花紫色或白色单生于茎顶，通常二、三朵成疏生的总状花序，花萼钟状，5裂，花冠钟状，5裂，雄蕊5枚，子房下位，5室。蒴果椭圆形，熟时盖裂。 生态分布：产我国南北各地；多生于山坡灌丛中，砍伐迹地及荒山草地中。 药用部分：根供药用，在秋春二季采收，但以秋季为佳。 用途：性味苦、辛，微温。为镇咳平喘药，能宣肺气，散风寒，镇咳祛痰，除壅排脓。治外感咳嗽，喉痹咽痛，胸满肋痛，肺病咳吐脓血。用量：1~3钱。
530	桂花	银桂，木樨，九里香，丹桂，金桂。	木犀科 植物形态：常绿灌木或小乔木，高可达12米。叶对生，椭圆形，卵形或椭圆状披针形，长3~8厘米，宽2.5~5厘米，基部楔形，先端渐尖锐，全缘或上半部细锯齿，叶脉6~8对向叶背突出，叶柄长0.5~1.5厘米。花黄色，有芳香，单生叶腋，单性异株，具细弱花梗，长3~4.5毫米，萼具4长齿，花冠4裂，分裂几达基部，雄花具雄蕊2枚，隐藏于花冠内；雌花有雌蕊1枚，子房上位，2室。核果长椭圆形，熟时紫色，有白粉，含种子一枚。 生态分布：原产我国西部，现我国中南部广栽植。 药用部分：花、根、树皮、桂花寄生及种子（果实）入药，9~10月采收。 用途：花性味辛，温；可散寒破结，化痰生津；治风虫牙痛，痰饮喘咳，经闭腹痛等。子（果实）性味辛、甘、温；能暖胃，平肝，益肾，散寒。根性味甘、平、微涩，无毒；治筋骨疼痛，风湿麻木及肾虚牙痛等。桂花寄生治吐血，肿毒。花露味微苦；能明目疏肝，除口臭。用量：花1~4钱，根2~3两，果实2~4钱。
531	铁苋	撮箕装珍珠，海蚌含珠，人苋，凤眼草，叶里藏株，血皮袋，布口袋，野麻草，铁苋菜。	大戟科 植物形态：一年生草本，茎直立，分枝，高30~50厘米。叶互生，膜质，卵状菱形，或椭圆状圆形，长2~7.5厘米，宽1.5~3厘米，基部楔形或圆形，基出三主脉，先端渐尖，边缘有锯齿，两面均粗糙无毛，叶柄长1~3厘米。花单性，雄花小，紫红色，密生成短穗状花序，花被4片，雄蕊多数，雌花1~3朵生于肾形叶状苞片内，苞开展，边缘有锯齿，基部心脏形，子房上位，3室。蒴果包于叶状苞片内。 生态分布：产我国南北各地；多生于村落、城镇庭园中，田野、路旁也

			<p>常有生长。</p> <p>药用部分：全草供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、涩、平，无毒。能清热，利水，消痈肿；治痢疾有效。</p> <p>用量：8钱~1两。</p>
532	铁树	苏铁,梭罗花,铁甲松,凤尾松,凤尾焦。	<p>苏铁科</p> <p>植物形态：常绿灌木状或乔木，高达2米以上。干粗壮圆柱形，常部分枝，有极明显的叶痕。叶螺旋状排列，一回羽状复叶，多聚生于干顶端，革质，长0.5~1米，小叶线状披针形，长15~18厘米，宽约6毫米，愈接近茎部愈短，先端坚硬呈刺状，基部数枚小叶，退化为利刺，表面秃净，亮绿色，边缘反卷极为显著。花单性异株，雄花序呈圆柱形或长卵状圆形，长28~40厘米，有短梗，小孢子叶（或雄蕊）披针形，顶端三角形，长4厘米；雌花序呈球形，直径约20厘米；大孢子叶（雌蕊）长14~20厘米，上部卵圆形，有羽状裂片，密被黄色毡毛，下端两侧各有2~3个大孢子囊（胚珠）。种子微扁，长圆形，橙红色，长约3厘米。</p> <p>生态分布：产我国南部。</p> <p>药用部分：叶、花、种子及根入药，夏季采收。</p> <p>用途：花性味甘、平，无毒。根性味甘、平、微涩，无毒；治筋骨疼痛，风湿麻木及肾虚牙痛。种子有毒；治男子遗精及妇女白带，腰疼，腿痛，跌打损伤。叶为收敛药，用于各种出血及下痢。用量：花1~2两，叶、根3~5钱，果1~2个。</p>
533	铁线蕨	石中珠,猪毛漆,猪鬃草,铁线草。	<p>铁线蕨科</p> <p>植物形态：多年生常绿草本。根茎黄褐色，密被淡褐色鳞片，鳞片线形或披针形，膜质，脉纹明显，根茎密生淡褐色长毛。叶疏生，叶柄有鳞片，全体无毛，长达70厘米，叶柄细劲，紫黑色有光泽，与叶片约等长，叶鲜绿色，卵形或长方状卵形，1至3回羽状复叶，羽片互生，小叶形态大小不一，多为倒卵形或斜方形，或扇形，基部楔形，顶端几乎截形而中间凹入，或2~5裂，裂片长短不一，具尖齿，叶脉自基部向边缘放射，细而又形分枝。孢子囊群盖由小叶顶端的叶缘向下面反折而成，每个小叶的孢子囊群多至十余个，通常长方形，横行，折边稍向内，呈弧形，弯曲，褐色，边白色，膜质。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于沟谷或岩石湿地。</p> <p>药用部分：全草入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味凉、涩，无毒。清热，利尿药；治淋浊，又能镇咳。用量：1~2两。</p>
534	铁线莲	大蓼,光板银。	<p>毛茛科</p> <p>植物形态：落叶或半常绿性木质藤本，长可达4米。须根黄褐色，新鲜时微带辣味，茎细长，具纵棱，带褐色，疏生白色卷毛。叶对生，3~5小叶或2回3出复叶，小叶卵形或卵状披针形，长3~6厘米，宽2~3厘米，基部圆或宽楔形，先端短尖或长尖，表面暗绿色，脉上有白色短卷毛，背面淡绿色，贴生白色长毛，或近无毛有3出脉或支脉形成网状，全缘，偶有1~3裂或粗及浅的齿牙，总叶柄长3.5~5.5厘米，疏生白色细长毛，小叶柄上部扭曲，借以攀缘于他物上，顶生小叶柄长1~1.5厘米，侧生小叶柄在1厘米以内或几无柄，也有白色长毛疏生。花白色带青紫色条纹，单生于叶腋，花被通常6片，偶有4~5片的，雄蕊多数，雌蕊多数，分离心皮，子房被白色绢毛。瘦果短椭圆形，表面被白色短细毛，顶端延伸的宿存花柱长4~5.5厘米，羽毛状。</p> <p>生态分布：产我国中部及东部各省；多生于山谷溪边和疏林内灌丛中或丘陵山坡草地中。</p> <p>药用部分：根入药，秋冬采收。</p> <p>用途：能解毒，利尿，祛瘀；治虫蛇咬伤。</p>
535	铁马鞭	金线藤,野花草。	<p>豆科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高达80厘米。茎及小枝均细长，分枝少，平卧地面，茎被棕黄色粗毛。叶互生，3小叶，总叶柄长0.5~2厘米，茎上部的总叶柄较短，被黄色粗毛；小叶广椭圆形，广倒卵形或卵圆形，长8~20毫米，宽5~15毫米，先端圆或截形，微凹，具短针头，两面均密被淡黄色粗毛，全缘，无小叶柄。花蝶形，黄白色，腋生总状花序，花萼深5裂，旗瓣基部带紫纹，倒卵形，顶端圆而微缺，雄蕊10枚，两体。荚果卵圆</p>

			<p>形，扁平，表面被白色长毛，熟时赭褐色，光滑无毛。</p> <p>生态分布：产我国长江南部各省；多生于向阳山坡疏林下或林缘草丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：民间用于体虚长热不退，并有行水消肿功能。</p>
536	铁扫帚	夜合锁，三叶公母草，蛤蟆串子，绢毛胡枝子，老牛筋，蛇倒草，蛇退草。	<p>豆科</p> <p>植物形态：落叶亚灌木，高达1米，有长而纤弱的枝，薄被微柔毛。叶互生，叶短柄，3小叶，小叶常为线状楔形，长1~2.5厘米，宽2~4毫米，边缘平直，在中部以下渐狭，先端钝或稍有微缺，具短尖，表面无毛，背面被短丝毛，有时小叶表面被短伏柔毛，背面密被白色长柔毛。花黄白色，蝶形，腋生总状花序，萼深5裂，旗瓣中央紫红色，雄蕊10枚，两体，子房上位，1室。荚果斜卵形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡灌丛边，荒山草地中，路边，田边也有生长。</p> <p>药用部分：全草或根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味淡、平，无毒。能解热，利尿，通乳汁，除积消胀。茎叶治小儿白口疮，眼病及肾脏病等。用量：7钱~1两5钱；根4~8钱。</p>
537	铁冬青	冬青仔，救必应。	<p>冬青科</p> <p>植物形态：常绿乔木，高达10米。枝灰色，圆柱形，小枝多少有棱，红褐色。叶互生，卵圆形至椭圆形，长4~10厘米，宽2~4厘米，两端均短尖，表面绿色，光泽，背面浅绿色，全缘，侧脉约8对，两面均明显，叶柄长7~12毫米。花白绿色，单性，腋生伞形花序，萼6裂，花瓣6枚，雌蕊5枚，子房上位，3室。核果球形至椭圆形，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南至南部各省；多生于山坡疏林中，河边或村落附近。</p> <p>药用部分：树皮、叶入药，全年均可采。</p> <p>用途：性味苦，寒。能清热利湿，消肿止痛，治感冒发热，扁桃体炎。咽喉肿痛，急性胃肠炎，胃及十二指肠溃疡，跌打损伤，风湿病。用量：皮1~3钱。</p>
538	铁角蕨	蜈蚣赶蛇，铁角凤尾草，石上蜈蚣赶蛇。	<p>铁角蕨科</p> <p>植物形态：常绿多年生小草本，根茎短，密生细根和鳞片。有少数残存老叶柄，叶丛生于根茎上，斜上和展开，一回羽状复叶，主叶柄在上面凹陷，长10~25厘米，宽1.2~1.5厘米；小叶无柄或近于无柄，小叶22对以上，斜卵形或扇状椭圆形，长5~6毫米，基部阔楔形，先端钝，边缘近中部以上有钝齿，叶表深绿色，两面均无毛，背面并列有6~8线形孢子囊群，沿侧脉着生，与中脉略成斜交，子囊群盖与子囊群同形，苞膜侧面开裂。</p> <p>生态分布：产我国中部；多生于阔叶树林下岩石上，溪谷悬崖上，山区村落附近岩石上常有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，全年采。</p> <p>用途：治毒蛇咬伤，疔疮，热疖等。</p>
539	钻地风	全叶钻地风，桐叶藤。	<p>八仙花科，虎耳草科。</p> <p>植物形态：落叶木质藤本，籍气根攀缘，长可达5米。小枝带紫褐色，无毛。叶对生，宽卵圆形至卵圆形，长8~15厘米，宽6~1哦厘米，基部圆或浅心形，先端渐尖，表面深绿色，无毛，背面淡绿色，沿主脉疏生短硬毛或近无毛，侧脉6对左右，叶脉在表面凹陷，背面隆起，细脉网状密结，全缘或中部以上疏生细锯齿，叶柄长3~8厘米，无毛，或极疏生短硬毛。花白色，顶生伞房花序，花序周围不孕性花，萼片呈花瓣状，白色，大形；孕性花小形，萼筒倒圆锥形，顶端5裂，花瓣5片，雄蕊常10枚，子房下位，柱头4~5裂。蒴果倒圆锥形，室间开裂。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于山坡疏林内或林缘，以及裸岩旁，常蔓延岩石上及攀缘于树干或树枝上。</p> <p>药用部分：根及藤入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味淡，凉。能利筋骨，疗脚气，近作驱风活血药。又治丝虫病。</p>
540	蚊母草	仙桃草，接骨仙桃草。	<p>玄参科</p> <p>植物形态：一年或二年生草本，无毛或具绒毛，高12~18厘米。茎直立，基部分枝，呈丛生状。叶对生，倒披针形，长1.5~2厘米，宽2~4毫米，下部叶具短柄，上部叶无柄，全缘或具细微疏锯齿。花白色或淡红色，单生于苞腋，苞片线状倒披针形，萼4裂，花冠4深裂，雄蕊2枚，子房上</p>

			<p>位，2室。蒴果扁圆形，先端微凹，果内常有小虫寄生。种子长圆形，扁平，无毛。</p> <p>生态分布：产我国中部和东部各省；多生于水田和沟边湿地，或溪边草地中。</p> <p>药用部分：全草，春夏间（小虫未逸出前）采收，焙干研末，备用。</p> <p>用途：性味苦、温，无毒。有收敛止血作用，多用于治咯血，伤后慢性吐血，下血，便后见血（除痔、痢、肠痈等症外），跌打损伤，损及内脏的吐血下血等症。治疮伤及出血症。用量3~7钱。</p>
541	瓶尔小草	一支箭，蛇舌草，单枪一支箭。	<p>瓶尔小草科</p> <p>植物形态：多年生小草本，高达20厘米，地下根茎直立，由根茎生出多枝黄色细长根。营养叶一片，卵圆形或卵状长圆形，稍为肉质，基部短楔形，先端较尖或钝圆，全缘，叶脉网状，通常不明显，孢子叶由营养叶腋间抽出，顶端着生柱状孢子囊穗，淡黄色，长出于营养叶之上。孢子囊之间紧接，排成二列，熟时横裂为二瓣，无孢子囊环，无盖。孢子球状四面体，具小突起。</p> <p>生态分布：产我国西北、中部、西南及长江南部；多生于山林下阴湿处。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味凉、微甘、酸，无毒。外敷治蛇咬伤，消痈肿、疮毒；治脱肛，小儿疳积和水肿泻后的补剂及癫痫的镇静剂。用量：1~3钱。</p>
542	粉条儿菜	天灯草，金线吊白米，牙虫草，肺筋草。	<p>百合科</p> <p>植物形态：多年生草本。根茎短，须根细长，着生无数细块根，弯曲，白色似蛆。根生叶丛生，线形，长15~30厘米，宽0.3~0.4厘米，先端渐尖，淡绿色。花白色或淡红色，穗状花序生于花茎顶端，花茎长40~60厘米，被短毛，花被短筒状，上端6裂，雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果，椭圆形，顶端有残存花被。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡、灌丛边草地及荒山草地中。</p> <p>药用部分：块根、全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。能治喘息，膀胱疝气，疳积，夜盲，肺痈脓血，并利尿及通经杀蛔虫。用量：根5钱~1两。</p>
543	积雪草	边铜钱，马蹄草，落得打，大铜钱，崩大碗，雷公根，老公根。	<p>伞形科</p> <p>植物形态：多年生蔓性草本。茎匍匐，淡绿色，光滑无毛，节处生不定根。叶有长柄，长2~7厘米，常3~4叶丛生于节上，叶片肾形，长2~3厘米，宽2~4厘米，表面绿色，背面淡绿色，边缘具钝锯齿。花淡紫色，腋生，伞形花序细小不易见。萼片、花瓣、雄蕊均5数，子房下位，2室。双悬果圆形，两侧压扁，有网纹，花柱宿存。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于山坡湿地，沟谷草地中，村落，城镇庭园和路边极常见。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏秋均可采收。</p> <p>用途：性味平、温，无毒。能祛风散寒。治肺热咳嗽，消癭瘤，除痈疮肿毒，消食积饱胀，行气活血，生肌。用量：5钱~1两。</p>
544	破骨风	破风藤，光清香藤。	<p>木犀科</p> <p>植物形态：常绿木质藤本，长达5米。幼枝有短柔毛，老枝平滑。叶对生，厚革质，叶柄缠绕性，叶常为3小叶，侧生1对较小，椭圆形，卵圆形，或披针形，长5~10厘米，宽3~5厘米，基部圆形至阔楔形，先端短尖，全缘，叶面深绿，略有光泽，叶背淡绿色，有小斑点。花白色，芳香，顶生聚伞花序，花萼杯状，5裂，花冠筒较长，先端5裂，雄蕊2枚，子房上位，2室。浆果球形。</p> <p>生态分布：产我国南部至长江南部各省；多生于沟谷阔叶林边，或灌丛中。</p> <p>药用部分：藤，梗入药，10~11月采收。</p> <p>用途：性味苦，温，无毒。能除骨中风湿，治跌打损伤，风湿筋骨痛，腰痛，散骨破后的积血，并治头风。用量：3~5钱，泡酒服。</p>
545	骨碎补	石姜，石岩姜，槲蕨，毛姜，猴姜。	<p>水龙骨科</p> <p>植物形态：附生于树皮或岩石上常绿多年生草本。根茎横走，肉质，肥厚，如生姜状，密被金黄色的卷曲狭长鳞片，叶两种形状，下部不生孢子囊群的叶为圆卵形，无柄，彼此复瓦状重叠，长约7厘米，宽3~6厘米，灰褐色，厚革质，边缘浅裂，叶脉显凸，网状。上部生孢子囊群的叶为绿色，长25~40厘米，宽14~18厘米，长椭圆形，叶柄短，有翼，叶片向</p>

			<p>基部渐狭，厚纸质，两面光滑，羽状深裂，裂片7~13对，基部2~3对缩为耳状，先端渐尖，边缘具浅疏缺刻，叶脉网状先凸。孢子囊群着生于上部叶片背面近上端，每二侧脉间有孢子囊群1~2个，成为一列，无子囊群盖。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南至南部和西南各省；多附生于大树皮上，或山林岩石上。</p> <p>药用部分：根茎入药，秋末春初采集。</p> <p>用途：性味苦、温、无毒。能补肾治骨伤，破血疗风疼。治关节炎，腰膝痛，跌打损伤，神经衰弱，小儿疳积等症。用量：3~6钱。</p>
546	鸭儿芹	鸭脚板草。	<p>伞形科</p> <p>植物形态：多年生草本，高70厘米，平滑无毛，全体有香气。叶互生，3小叶，叶柄长5~10厘米，叶基扩展，边缘膜质而抱茎，小叶无柄，卵状椭圆形或阔卵状椭圆形，边缘有锐锯齿，基部狭楔形或楔形，先端尖。花白色，有时带紫红色，顶生或腋生复伞形花序，花萼5片，花瓣5瓣，雄蕊5枚，子房下位，2室。双悬果长椭圆形，稍压扁5棱形，主棱发达，次棱不显。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部；多生于山坡林边，湿地或沟谷草丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味微甘、酸、温，无毒。能消炎，理气。治虚弱劳累，膀胱疝气，五淋尿闭及无名肿毒。日量5钱~1两，作煎剂或炖肉服，也可捣烂外涂。</p>
547	鸭跖草	竹鸡菟，竹叶菜，竹节菜。	<p>鸭跖草科</p> <p>植物形态：一年生草本。高达60厘米，茎圆柱形，多分枝，下部匍匐状，上部近直立，节稍膨大，绿色或带暗紫色，有纵细纹，有时具散生的细柔毛。叶互生卵状披针形至长圆状披针形，长4~10厘米，宽1.5~2厘米，基部狭或圆形，先端尖，全缘，叶脉平行，叶鞘膜质，鞘口有时具须毛。花深蓝色，腋生聚伞花序，具心形佛锤苞片，花被6片，2轮，外轮3片带白色，萼片状，内轮3片中，后方2片成花瓣状，深蓝色，前方1片白色，雄蕊6枚，3枚发育，3枚退化，子房上位，2室。蒴果椭圆形，稍扁。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于溪边，山坡湿地，田边，路边。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、大寒，无毒。茎叶为清凉性解毒、利尿、退热药；治丹毒、疔疽、脚气、心脏病、热痢、发热狂燥、喉肿痛及蛇、蝎、毒虫咬伤等症。用量：5钱~1两。</p>
548	鸭舌草	鸭仔草，肥猪草。	<p>雨久花科</p> <p>植物形态：浅水生一年生草本，高约17厘米。根茎短，叶丛生根茎上，具长叶柄，叶柄基部有膜质叶鞘，抱茎，叶片卵形或卵圆形，长约5厘米，宽约4厘米，基部圆形或浅心脏形，先端短尖，全缘，表面深绿色，背面铅绿色，两面均无毛。花紫色，腋生总状花序，苞片鞘状，花被钟状，6裂，雄蕊6枚，其中一枚最大，有一边具齿裂的花丝，花药基生，顶裂，子房上位，3室。果为蒴果。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于水田，水沟中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收，鲜用或晒干备用。</p> <p>用途：性味苦，寒。能退热消肿，清热解毒，利尿。治痢疾，肠炎，齿龈脓肿，急性扁桃体炎，喉痛。用量：1~2两，水煎服。</p>
549	狼尾草	光明草，老鼠狼。	<p>禾本科</p> <p>植物形态：多年生丛生草本，高达60厘米，秆近扁平，秃净。叶2列式互生，叶片线形，内卷，长15~50厘米，宽3~7毫米，基部截形，先端锥尖，边缘在表面粗糙，背面光滑，叶扁平，无毛或被纤毛。花暗绿色，顶生圆锥形穗状花序，长6~14厘米，宽1~2厘米，小穗多数单生，基部刚毛在外面短而细，内层的较粗而长，第一颖微小，第二颖卵状披针形，1脉，不孕性小花外稃与结实小花等长，7~11脉，内稃缺，结实花外稃披针形，5~7脉，内稃具等长的2脉，雄蕊3枚，子房上位，1室。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于山坡荒地草丛中，路边，田边。</p> <p>药用部分：根、根茎或全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。明目散血，能清肺热，止咳，通经络，治疮毒。用量：根及根茎1~2两。</p>

550	狼把草	针包草，引线包。	菊科	<p>植物形态：一年生草本，高达1.5米。茎直立，基部略匍匐，近地面节上长生根，无毛。叶对生，中部及下部的叶长椭圆形，长4~10厘米，宽1.5~2厘米，通常3~5羽状深裂，顶端裂片较大，裂片卵状披针形，锐尖头，边缘具不整齐的牙齿，上部叶三深裂或不裂，长椭圆状披针形，边缘有锯齿。花黄色，头状花序顶生或腋生，总苞杯状，总苞片2层，裂片先端三角形，具腺状毛，花全部管状，4~5裂，雌花5枚，子房下位，1室。瘦果倒卵状楔形，扁平，瘦果上生向后的刺毛，冠毛呈芒状，通常2枚，上生倒生的刺毛。</p> <p>生态分布：产我国中部；多生于水沟或水田边。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、平，无毒。为强壮剂，活血，通经。治感冒，百日咳，赤白痢，盗汗及脑漏等症。用量：5~6钱。</p>
551	莲	荷，芙蕖	睡莲科	<p>植物形态：水生多年生草本。根茎肥厚，即俗称“莲藕”，横走，外皮黄白色，节部缢缩，生有鳞叶与不定根，节间膨大，内白色，中空有许多条纵行管道。叶根生，圆盾形，高出水面，直径30~90厘米，全缘或稍呈波状，表面暗绿色，光滑具白霜，背面浅绿色，叶柄着生于叶背中央，圆柱形，中空，高达1~2米，表面散生刺毛。花粉红色或白色，有芳香，花柄与叶柄等长或略高，单一，顶生，花径12~23厘米，萼片4~5片。绿色，早落，花瓣多数，由外向内逐渐变小；雄蕊多数，心皮多数，埋藏于膨大倒锥形的花托内，子房椭圆形，花柱短，花托倒锥形，顶部平，有小孔20~30个，每个小孔内有1子房。果期花托逐渐增大，内呈海绵状，俗称“莲蓬”，坚果椭圆形或卵形，果皮坚硬，革质，内有种子1枚，俗称“莲子”。</p> <p>生态分布：我国南北各省均有在植。</p> <p>药用部分：根茎、藕节、叶、花、果实及石莲子均入药，夏季采叶，夏秋采莲子，秋冬季采藕，夏季采花。</p> <p>用途：荷叶性味苦，平；能清热，解毒，散瘀；治暑热，烧灰吞服治产后烦渴，瘀血不止，胎衣不干，治吐血。荷花性味甘，平；能调气，止血，散瘀；治吐血，白带，外伤。莲房苦、涩、温；能止血，破血；治血崩腹胀痛。藕节性味甘、涩、平；能止血化痰。莲心性味苦，寒；能清心去火，解烦渴。荷蒂与荷叶效相同；荷叶梗清热毒，解酒。莲子性味甘、涩、平，无毒；能安神，补中。莲须性味甘、涩、微温，无毒；功用同莲子。石莲子性味甘，温；能补脾，涩肠，固精。用量：（叶、藕节、荷叶、莲房）1.5~3钱，蒂3~7枚，莲子3~3钱，莲心1~2钱，莲须8分~1钱5分，荷梗1尺许，石莲子1~3钱。</p>
552	通草	通脱木，花草，寇脱，离南。	五加科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，杆粗壮，高可达6米。茎木质而不坚，中央含有白色纸质的髓，幼时具有隔室，老时则渐次充实。叶大，互生，通常丛生于茎顶部，掌状分裂，长可达1米，直径约50厘米，基部心脏形，叶片7~12裂，边缘具有细锯齿，表面近于无毛，背面有残留的颤毛；叶柄粗而长，圆柱状，长达50厘米以上，托叶二，大膜质，披针状蕾形，基部鞘状抱茎。花黄白色，腋生多数球状，伞形花序，更聚集而成大形圆锥花丛，全部密生柔毛；花小，萼不明显，花瓣4~5片，雄蕊4~5枚，子房下位，2室。核果近球形而扁。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡阔叶林下或灌丛中。</p> <p>药用部分：茎髓入药，中秋后采收。</p> <p>用途：性味甘、淡、寒，无毒。能利尿，清热，通乳；治水肿，淋病，癯闭，少乳等症。用量：1~2钱。</p>
553	通泉草	黄花草，野田菜，鹅肠草，痲子草	玄参科	<p>植物形态：一年生匍匐性草本，长达2~15厘米。茎倾斜，基部多分枝，被短柔毛或无毛。叶下部对生，上部互生，倒卵形至长椭圆形，长2~6厘米，宽1~1.5厘米，基部渐狭呈翅状，先端钝，边缘粗锯齿，大小不一。花唇形，淡紫色或蓝色，顶生总状花序，萼钟状，5裂，花冠唇形，5裂，雄蕊4枚，子房上位，2室。蒴果球形。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部；多生于水田边、溪边、湖边湿地。</p>

			<p>药用部分：全草入药，春夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦，能健胃，治烫伤，疔疮，黄疸。</p>
554	透骨草	蝇毒草，粘人裙，老婆子针线。	<p>透骨草科</p> <p>植物形态：多年生草本，直立，高达80厘米。茎分枝少，有四棱，密生微毛，节间较长，节部膨大，表面有纵条纹，茎下部木质化，有时带淡紫色，上部为淡绿色。叶对生，下部叶有长柄，上部叶几无柄，叶片卵形，基部截形至楔形，先端尖或渐尖，边缘有粗锯齿，长3.5~8厘米，宽2~4厘米，两面疏生细柔毛。花白色，顶生或腋生长穗状的总状花序，花初开时向上，开后则渐转向下。萼筒状5裂，花冠筒状二唇形，5裂，雄蕊4枚，2强，子房上位，1室。蒴果在宿存萼中，成熟时下垂。</p> <p>生态分布：产我国东北；多生于山坡林边，沟谷丛林草丛中。</p> <p>药用部分：全草及根有毒，供药用，7~10月份采。</p> <p>用途：性味涩、凉，无毒。能清热，治黄水疮，疥癣及虫疮毒。根可杀蝇蛆，全草能杀灭蔬菜青虫。用量：2~3钱。</p>
555	桑	桑叶，家桑，伏桑，桑树。	<p>桑科</p> <p>植物形态：落叶乔木或灌木，高达7米，树皮灰色，纵裂。叶互生，圆形或广卵状圆形，长5~15厘米，基部心脏形，先端尖，边缘有粗锯齿，或呈不规则的分裂，表面粗糙，叶脉在背面显著，叶柄长1~2.5厘米。花单性异株，雄花为腋生茅荑花序，花被与雄蕊均5数；雌花为腋生穗状花序，花被4片，子房上位，柱头2裂，果为聚合瘦果，由花被发育成肉质的假果称为“桑椹”熟时紫黑色或白色。</p> <p>生态分布：产我国中部各省；各地广栽植。</p> <p>药用部分：冬桑叶、树皮、枝，夏秋采收，果实5~8月采集。</p> <p>用途：根皮性味甘、寒。能泻肺行水，止咳平喘；治肺热喘咳吐血，水肿，腹胀等症。桑枝性味平、苦，无毒。治风寒湿痹诸痛。叶性味苦、甘，寒；祛风清热，凉血明目。用量：叶、桑白皮、桑枝1.5~3钱；桑椹3~5钱。</p>
556	桑寄生	栗树寄生，寄生，桑上寄生。	<p>桑寄生科</p> <p>植物形态：寄生于树枝上的常绿半寄生灌木，高达1米。树皮灰色至黑色，茎上有凸起的皮孔，小枝嫩时被铁锈色短毛。叶革质，近于对生或互生，广椭圆形、卵形或倒卵形，长3~9厘米，宽2~3厘米，基部圆或楔形，先端钝或尖，全缘，表面绿色，背面铁锈色，有短毛，叶柄长约1厘米。花紫红色，1~3朵生于叶腋，花柄、花萼、花冠皆被褐红色粉状星状小柔毛，小苞片1枚，花萼近球形，4裂，花冠管状，4裂，雄蕊4枚，子房下位，1室。浆果，广椭圆形，赤褐色；果肉有粘性，籍鸟类进行传播。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多寄生于阔叶树的枝桠上，村落、城镇庭园树或果树上也常有生长。</p> <p>药用部分：秋季采成熟的果实，6~9月采茎叶入药。</p> <p>用途：茎叶性味苦、平、无毒。能强壮安胎，并有消肿，催乳作用。治腰膝神经痛，高血压，血管硬化性四肢麻木，对怀孕之腰痛有效。果实性味甘、平，无毒；能明目。治膈气，胎动腹痛，毒痢脓血，下血后虚，肝风昏眩，四肢麻木，内伤咳嗽，小儿抽搐等。茎叶用量：5钱~1两。</p>
557	萍	田字草，四叶萍，萍。	<p>萍科</p> <p>植物形态：水生多年生草本。根茎细长横走，稀疏分枝，由根茎向下生出的叶变形为须状的根状体。叶远生，叶柄长5~20厘米，叶片由四小叶形成，两对相接近，对生成十字形，在叶柄顶端平展；小叶倒三角形，长10~20毫米，无柄，全缘，无毛，叶脉纤细，由基部作扇状射出，再叉状分枝而互相联合成网。孢子囊群与孢子叶形成孢子果，常2~4个孢子果聚生；孢子果长椭圆状肾形，坚硬，外披毛。孢子囊群多数，着生于胶质的囊托上，其末端着生在孢子果的壁上，孢子囊2型，大小孢子囊均同生于一个孢子果中。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于水田、水泽、沟边、池塘边。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、寒，无毒。能清热解毒，利小便；治神经衰弱，蛇咬伤及外伤腰痛。用量：5~8钱。</p>
558	商麻	桐麻皮，白麻，青麻，磨盘草，车轮	<p>锦葵科</p> <p>植物形态：一年生大形草本，高达2米，栽培的高达3~4米，全体被星状毛。叶互生，圆心心脏形，长8~18厘米，宽7~16厘米，基部心脏形，先端</p>

		草。		<p>急尖，边缘为圆齿状锯齿，两面密生灰白色柔毛，主脉7条，侧脉约3条，两面均隆起，叶柄长8~18厘米，也密生灰色柔毛，托叶早落，披针形。花黄色，单生于叶腋，花萼杯状，深5裂，花瓣5片，雄蕊多数，雌蕊心皮15~20个，合生，扁圆形，外面密生粗毛。蒴果椭圆形，顶端平截。生态分布：产我国南北各地；多生于旷野、堤岸、田边及路边。</p> <p>药用部分：种子、根或全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、平，无毒。治劳动过度，腰脊酸麻，赤白冷热痢，痈肿无头，眼翳瘀肉。根亦治痢。用量：种子2~4钱；根1~3钱。</p>
559	荸荠	通天草，马蹄，地栗，荸荠。	沙草科	<p>植物形态：水生多年生草本。地下匍匐茎先端膨大成扁球形即俗称“荸荠”；地上茎圆筒形，中空，丛生直立，高约75厘米，绿色，表面平滑，有纵纹。叶片退化，叶鞘薄膜质，上部斜截形易脱落。花淡绿色，顶生圆柱形的穗状花序，颖片螺旋式复瓦状排列，花被6枚，呈刚毛状，与小坚果等长或较长，雄蕊2枚，子房上位，1室，柱头2歧。小坚果呈双凸镜形。生态分布：产我国南北各地；多栽植于水田中。</p> <p>药用部分：球茎及地上部分药用，一般以10月采制为宜，采时用镰刀割取，摊开晒干。</p> <p>用途：地上部分性味苦，平；能除湿热，通淋，利尿。球茎性味甘，寒，无毒；能化痰，解热，健胃，明目；治黄疸，消渴，便秘，高血压，并有抑制绿脓杆菌的作用。又治小儿食积，发热小便不利，淋病。用量：地上部分8分~1钱，球茎2~4枚，作煎剂，凡阳虚懈怠者慎用。</p>
560	君达菜	猪婆菜，忝菜。	藜科	<p>植物形态：二年生草本，高达80厘米。根纺锤形或分枝，肥厚多汁，根生叶丛生，长椭圆形或圆卵形，基部楔形至截形，先端钝，全缘；茎生叶较小，卵形或长椭圆状披针形，叶面淡绿或暗绿，光滑，皱缩不平，叶脉呈紫红色，粗大，叶柄肥厚多汁。花黄绿色，腋生穗状花序，常多数结合成球形，苞片小，叶状，花萼5裂，质厚宿存，无花瓣，子房上位，1室，藏于花盘内，果实成熟或变硬。</p> <p>生态分布：产我国南部。</p> <p>药用部分：全草、根及种子入药，春季采收。</p> <p>用途：性味甘、苦、大寒、滑，无毒。解风热毒，止血生肌，开胃通心膈，补中下气，理脾气，去头风，利五脏，治热毒痢。根甘、平，无毒。通经脉，下气，开胸膈；子主治小儿热，痔漏下血。</p>
561	夏枯草	棒槌草，虾公草，牛牯草，铁色草，棒柱头花，灯笼草，紫花草。	唇形科	<p>植物形态：多年生草本，高达40厘米。有匍匐根茎，茎方形，直立或斜上，多分枝，红紫色或绿色，贴生毛茸。叶对生，卵形或长椭圆状披针形，长2.5~5厘米，宽1~2厘米，基部楔形，先端尖，边缘微波状齿或全缘，两面被毛，侧脉3~4对，叶柄长1~3厘米。花唇形，紫色，稀为白色，顶生短轮生穗状花序，苞片及花萼均被白色茸毛，萼唇状，5裂，花冠5裂，雄蕊4枚，子房上位，4室。小坚果褐色，倒卵形或圆形。</p> <p>生态分布：产我国山东至南部各省；多生于山坡草地、溪边、路边，以及村落城镇矿地上。</p> <p>药用部分：花穗、果及全草入药，农历4~5月花球呈枯黄色时采取。</p> <p>用途：性味苦、辛、寒，无毒。能明目清肝，利尿，消炎，散郁，消癭瘤，瘰癧，生肌止痛。治高血压，淋巴结核，乳痈，目赤痛，头疮，脚肿湿痹，赤白带下，血崩不止，产后血晕，扑伤金疮，汗斑，白点，疔疮，火伤，小儿脐风，阴疮。用量：茎叶1.5~3钱；花穗、果1~3钱。</p>
562	益母草	茺蔚，益明，贞蔚，红花艾，野天麻。	唇形科	<p>植物形态：一年生草本，高约1米。茎直立，有分枝，方形，四棱状，密被毛茸，在棱及节上更明显。叶对生，大小形态多变化，基生叶最大，略呈圆形，5~7浅裂，有钝齿，下部的叶椭圆形，掌状三裂，顶部的叶不分裂，呈线状，全部叶片有钝齿，密被软毛。花唇形，淡红或紫红色，轮生在上部的叶腋间，苞刺状，线形，花萼钟状，5裂，花冠唇形5裂，雄蕊4枚，2强，子房上位，4裂。小坚果褐色，有三棱。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于路边荒地、村落、城镇庭园中及常见。</p> <p>药用部分：带花叶的枝及枝梢（益母草），果实（茺蔚子、小胡麻）入</p>

			<p>药，5~6月采全草，8月采果实。</p> <p>用途：益母草性味苦，微温；能行血通经，去瘀生新，活血调经。茺蔚子性味辛、甘，微温；能活血调经，明目；治月经不调，产后血晕，腹痛，崩漏带下，下痢痔血，疔疮痈肿及眼目昏花等症。用量：全草及果实1.5~3钱。</p>
563	盐肤木	园东白，南风柴，五倍子树，淋朴，女木，五倍柴，羊风，山盐箐。	<p>漆树科</p> <p>植物形态：落叶乔木，高达9米。树皮灰褐色，有赤褐色斑点；小枝上有三角形叶痕。叶互生，奇数羽状复叶，长12~20厘米，总叶柄基部膨大，叶轴生有灰褐色细毛，两侧有3~6对箭叶，初有短毛，后渐脱落，小叶7~13枚，无柄，顶部小叶广卵形或卵状广椭圆形，基部圆形而渐尖，先端急尖，长5.5~9.5厘米，宽3.5~5厘米，侧方小叶卵状长椭圆形以至卵形，稍有偏斜，长约13厘米，宽约6.5厘米，除基部外，边缘有波状钝齿，表面有疏毛，背面密生绒毛，羽状脉10~17对，幼芽或叶柄常受五倍子虫的刺伤而生成囊状的虫瘿，似茶泡状，称为“五倍子”。花杂性，白色，顶生圆锥花丛，萼5裂，花瓣5片，雄蕊5枚，子房上位，1室。核果扁圆形，外面有灰白色短软毛密生。</p> <p>生态分布：产我国中部及长江流域南部各省；多生于山坡林边，溪边，砍伐迹地及公路边。</p> <p>药用部分：根、叶、花、果及五倍子均供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：果、根性味酸、咸、微寒，无毒。能化积滞，消骨硬，解毒，退目翳。五倍子性味平，酸。收敛止血，敛肺降火，敛汗涩肠。治肺虚咳嗽，多汗，水肿，泻痢，下血，脱肛，痔疾等。外用于烫伤及局部出血。</p> <p>用量：根3钱~1两，五倍子5分~2钱，花、叶外用不拘。</p>
564	望江南	凤凰草，金角子，金角兜，金角儿树，喉百草，假槐花。	<p>云实科，豆科。</p> <p>植物形态：一年生或多年生亚灌木状草本，高1~2米。茎直立，上部多分枝。叶互生，为一回偶数羽状复叶，小叶3~5对，卵形或卵状披针形，在叶柄上面近基部有突起的腺点1个，托叶早落，小叶柄极短。花黄色，假蝶形，腋生或顶生伞房状总状花序，萼片及花瓣均为5片，雄蕊10个分离，3个为退化雄蕊，子房上位，1室。荚果圆柱形带状。</p> <p>生态分布：我国南部有栽培。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收，10~11月收果实药用。</p> <p>用途：性味苦、平，有小毒。种子治下痢腹痛，慢性胃肠炎，高血压引起头胀痛，习惯性便秘，能健胃整肠，又治头胀，炒后治疟。叶茎绞汁，治毒蛇或毒虫螫伤，并称为治咳嗽，初引起肺病，胃病，气块，气胀等功效。用量：茎叶、种子均2~3钱。</p>
565	窃衣	鹤虱，家子草。	<p>伞形科</p> <p>植物形态：一年生草本。茎直立，高达60厘米，被短毛茸，疏分枝。叶互生，1~2回奇数羽状复叶，长4~9厘米；小叶片披针形，长达2厘米，羽状分裂，顶端裂片为披针形至长圆形，边缘有锯齿或深裂，表面绿色，背面淡绿色，两面有紧贴的粗毛，叶柄基部成鞘而抱茎，长短不一。花白色或淡紫色，顶生或近腋生复伞形花序，总苞4~12枚，线形，小苞片数枚，萼齿小5枚，花瓣5片，雄蕊5枚。子房下位，2室。双悬果卵状椭圆形，表面有密生的钩状刚毛，借以传播果实。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于村落，城镇附近荒地和路边。</p> <p>药用部分：果实、根入药，秋季采收。</p> <p>用途：根能解毒，果实性味苦、辣，有小毒，能杀虫；治虫积腹痛。用量：果实8分~1钱5分。</p>
566	蚕豆	胡豆	<p>豆科</p> <p>植物形态：二年生草本。茎直立，略具棱，少分枝，灰褐色，秃净，高达1米。叶互生，偶数羽状复叶，顶端常有不发达的卷须，小叶2~6片，椭圆形或卵形至长椭圆形，长3.5~8厘米，宽2.3~4厘米，基部楔形，先端钝而有小锐尖，全缘，青绿色，两面光滑无毛，托叶半箭状。花蝶形，白色带紫斑，腋生总状花序，萼钟形5裂，花瓣5片，雄蕊10枚，两体，子房上位，1室，荚果肥厚。</p> <p>生态分布：我国南北各地广栽植。</p> <p>药用部分：花、叶、种子及荚果药用，2~3月采花，叶、种子4~5月采收。</p>

				用途：豆性味甘、微辛、平，无毒。快胃和脏腑，健脾，止血，利尿。苗性味苦、温，无毒；治酒醉不醒。豆荚壳及叶为止血剂。花性味涩、平，无毒；能降血压，治白带及劳伤吐血。红胡豆治吐血；白胡豆亦能入药，用者不多。一日量：叶1~2两。
567	豇豆	姜豆	豆科	植物形态：一年生缠绕性草本，全体无毛。叶互生，3小叶，侧生小叶歪卵形，具短柄。顶生小叶菱状卵形，长8~15厘米，宽3.8~4.5厘米。花蝶形，淡紫色，腋生总状花序，萼钟形，4裂，旗瓣宽而大，超过翼瓣；雄蕊10枚，两体，子房无柄。荚果细长，可达50厘米，下垂。 生态分布：我国南北各地均有栽培。 药用部分：种子入药，夏秋采收。 用途：性味甘、平，无毒。能滋阴补肾，健脾胃，止痢，消食。治白带，白浊及肾虚遗精，痔疮出血，脓疮，疔疮，蛇咬伤。用量：种子5钱~1两。
568	高粱	粟米	禾本科	植物形态：一年生草本，秆直立，高达3米。叶2列式互生，狭披针形，长达50厘米，宽约4厘米，叶鞘抱茎，无毛或被白粉，叶舌硬膜质，先端圆，边缘生纤毛。花绿色，顶生圆锥状穗状花序，无柄小穗卵状椭圆形。颖果倒卵形，成熟后露出于颖外，有柄小穗雄性。 生态分布：我国南北各地均有栽植。 药用部分：根、颖果及佛焰苞供药用，7~8月采收。 用途：性味甘、平、微寒，无毒。子和胃健脾，治食积；佛焰苞止血。治吐血，红痢，白痢。用量：种子1~2两。
569	留兰香	绿薄荷，鱼香。	唇形科	植物形态：多年生草本，高可达70厘米，全株疏被短毛。地下根茎蔓延，呈四棱形，细长，直立或斜生，略分枝。叶对生，椭圆形或卵状长椭圆形，长3~10厘米，边缘具锯齿，两面均疏被短毛，基部近于心脏形或钝形，无柄或近于无柄。花唇形，白色略带淡紫色，顶生穗状轮生花序，花萼5齿裂，花冠4裂，雄蕊4枚，子房上位，4室。小坚果卵球形。 生态分布：我国各地有栽培。 药用部分：6日间采摘茎叶或嫩枝端，鲜时入药。 用途：性味辛、微温，无毒。气芳香，祛风散寒，能健胃止呕；治胃痛，脚生皲裂。用量：鲜草5钱~1两。
570	鬼针草	纲叉草，婆婆针，一包针，鬼蒺藜，盲肠草。	菊科	植物形态：一年生草本，高达85厘米。茎直立，黄绿色，呈四棱形，无毛，或于上部枝上略具细毛。中部及下部叶对生，2回羽状复叶，长11~19厘米，两面略具短毛；小叶卵形，先端尖，边缘具不规则的细尖齿或钝齿，有长柄；上部叶互生，较小，羽状分裂。花黄色，顶生头状花序，总苞杯状，花托椭圆形，先端钝；花序周围为舌状花，中央为管状花，花冠裂片5枚。瘦果长线形，具3~4枚有倒毛的硬针刺，顶端冠毛芒状3~4枚。 生态分布：产我国南北各地；多生于山坡草地中，路边，或村落附近矿地上。 药用部分：全草入药，夏秋采收。 用途：性味苦、平。有解毒，止泻解热的功效。治痢疾，咽喉肿痛，噎膈反胃，贲门痉挛及食道扩张等症。又治蝎和蜘蛛、蛇咬伤。近用治盲肠炎有效。用量：3~5钱。
571	臭椿	樗树，木砮树，恶木。	苦木科	植物形态：落叶乔木，高达28厘米。枝条向上，树皮灰白色，平滑有纹，幼枝黄褐色，无毛或有毛，叶痕明显，倒心脏形。叶互生，为奇数羽状复叶，长45~60厘米，总柄及小叶柄无毛或微有毛，小叶通常13~25片，互生，卵状披针形，稍不对称，长7~13厘米，宽2.5~5厘米，边缘上部全缘，近基部两边各具1~3锯齿，背面齿端有大腺点，基部广楔形，或呈不整齐的圆形，先端长尖，叶面深绿色，叶背灰绿色微带粉白色，叶柄长约1厘米。花绿色，杂性，顶生或腋生，圆锥花序，花萼、花瓣均5片，雄蕊10枚，子房上位，由5心皮组成。翅果长椭圆形，种子扁平，位于翅的中央。 生态分布：产我国北部至南部；多生于村落、城镇附近旷野路边。 药用部分：根皮、树皮入药，夏秋采收。

			用途：性味苦、涩、寒。能燥湿清热，收涩固肠。治赤白久痢，肠风下血，带下血崩，梦遗滑精等症。用量：1.5~3钱。
572	臭茉莉	臭尿茉莉、大鬘婆。	马鞭草科 植物形态：直立，分枝亚灌木，高可达1.5米，稍被毛。叶对生，阔卵形，长11~15厘米或更长，基部截头形或心形，先端渐尖，有粗锯齿，被毛或近于秃净，揉之有臭味。花红紫色，有芳香，顶生聚伞花序，密集呈大头状，萼钟形，5~6裂，宿存，果时扩大而呈红紫色，花冠白色或淡粉红色，有时为重瓣，雄蕊4枚，子房上位，为不完全的4室。肉质核果包藏于宿萼内。 生态分布：产我国长江流域至南部各省。 药用部分根、叶入药，全年可采。 用途：性味淡、平，微臭。能祛风活血，消肿降压。主治风湿性关节炎，腰腿痛，瘫痪，脚气水肿，痔疮，脱肛，高血压。用量：5钱~1两，水煎服。
573	臭辣树	刁近树，臭桐子树。	芸香科 植物形态：落叶乔木，高15米。树皮平滑，淡灰色至暗灰色，枝条紫褐色至灰褐色，皮孔圆或长圆形。叶对生，奇数羽状复叶，小叶通常为7片，稀为5或11片，椭圆状披针形或卵状长椭圆形至披针形，长6~11厘米，宽2~6厘米，基部圆或宽楔形，常便斜，顶端渐尖，稀短尖，表面绿色，无毛或有时疏被短毛，背面灰白色，沿主脉疏被长柔毛或常脱落，但脉腋间及主脉的基部二侧毛常密生成丛，无油腺点，叶轴顶端的小叶柄长1.5~2.5厘米，侧生小叶柄长2~6毫米。花白色，顶生伞房花序，萼片5浅裂，花瓣5片，雄蕊5枚，子房上位，4~5室。骨突果4~5裂，稀为3裂。 生态分布：产我国长江中下游各省；多生于向阳的坡地上，山溪边湿润树丛中。 药用部分：果入药，秋季采收。 用途：治麻疹后咳嗽。
574	臭牡丹	臭枫根，臭八宝，大红袍，矮桐子。	马鞭草科 植物形态：落叶灌木，高达2米。叶对生，广卵形，长10~20厘米，宽8~18厘米，基部心脏形或近于截形，先端尖，边缘有锯齿而带波状，表面深绿色，粗糙，具密接短毛，背面淡绿色而近于光滑，仅脉上有短柔毛，触之有臭气，叶柄长约8厘米。花粉红色，有香气，顶生头状聚伞花序，萼5裂，花冠管状5裂，雄蕊4枚，子房上位，不完全的4室。核果球形。 生态分布：产我国南北各地；多生于沟谷丛林边湿地，村落附近常见。 药用部分：根供药用，夏季采收。茎、叶亦入药。 用途：性味辛、苦、微温，无毒。能消肿，止痛，去毒，散结；治痔疮，一切痈疽，脚气，脱肛。叶有降压作用。用量：3~6钱。
575	秤钩风	穿墙风，苍白秤钩风。	防己科 植物形态：半常绿木质藤本，长达15米，茎褐黑色，具条纹和皮孔，横切面有5条半环纹，层间易剥离。叶互生，菱状阔卵形，长3.5~6厘米，宽4~6.5厘米，基部心脏形，先端短尖，全缘，表面绿色，光滑，背面粉绿色，基出脉5条。花绿色或黄绿色，单性。萼片、花瓣、雄蕊均6枚，花药球形，4裂，雌花具6退化雄蕊，心皮3枚，分离，子房上位，各1室。核果3枚，或退化为1枚，倒卵状长圆形，扁平，中间凹陷，被白粉。 生态分布：产我国东部至西南部；多生于沟谷疏林或山坡灌丛中。 药用部分：茎、叶入药，全年均可采收。 用途：性味微苦、寒。能清热解毒，祛风除湿。主治毒蛇咬伤，风湿骨痛，尿路感染。用量：藤、茎5钱~1两。
576	淡竹	水竹，金竹花，甘竹，钓鱼竹，白夹竹，春花小竹。	禾本科 植物形态：常绿乔木，地下茎单轴散生，秆高7~18米，绿色或淡绿色，最后变为带黄色，稍被白粉，上部节长可达34厘米，每节生2大枝。秆箨通常长于节间，硬纸质，禾草色而具有灰黑色的斑点及带纹，顶端有须毛；箨叶长披针形而波曲。叶1~5枚，2列式互生，披针形，长7.5~16厘米，宽1~2厘米，基部收缩为一长约5毫米的叶柄，先端渐尖，表面深绿色，无毛，背面被白霜，下部有细毛，叶舌短；叶鞘无毛，鞘口最初有须毛。花枝具叶，小穗丛生呈穗形或扇形，长2.5~4厘米；小穗含2~3小花。 生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡林缘，或溪边，村落附近

				<p>也有栽植。</p> <p>药用部分：根、叶、及秆皮（竹茹）或竹汁（竹沥）均入药，全年可采收。</p> <p>用途：竹沥性味甘、大寒，无毒。能豁痰清热，润肺止渴；治中风口禁，痰鸣，身大热，四肢顽麻，癫痫惊狂，消渴和反胃等症。竹茹甘、微寒，无毒。能清热化痰，清热凉血，除烦止呕；治胃热呕逆，上焦烦热，吐衄，崩中及胎动不安。用量：竹沥1~3两，竹茹1.5~3钱。</p>
577	淡竹叶	金鸡米，淡竹米，山鸡米，竹叶麦冬。	禾本科	<p>植物形态：多年生常绿草本，高可达1米，地下有木质缩短的根茎，须根中部常膨大为纺锤形，似麦冬状。秆直立，常丛生。叶2列式互生，披针形，长5~20厘米，宽2~3米，基部狭缩成短柄，先端渐尖，全缘，两面光滑或有小刺毛，有明显小横脉。花绿色，顶生圆锥状穗状花序，小穗披针形，颖钝头，常具5脉第一外颖顶端具小尖头，内稃较短，不孕性外稃顶端具有短芒。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡林下，灌丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，6~7月采收。</p> <p>用途：性味甘、淡、寒、无毒。能去烦热，利小便，清心火，堕胎催生，生津止渴；治胃痛，喉痛，肺癆及心燥渴。用量：3~5钱。</p>
578	淫羊藿	淫羊雀	小蘗科	<p>植物形态：常绿多年生草本，高可达50厘米，地下有横行呈结节状而硬的茎根，四周生多数须根。基生叶1~3片，3出复叶，总叶柄长8~15厘米，小叶有柄，小叶卵形至卵状披针形，长4~9厘米，宽2.5~5厘米，先端尖或渐尖，边缘有细刺毛。顶生小叶基部二裂片近于圆形而对称，侧生小叶基部成不对称心形而带戟状浅裂，外裂片形斜而较大，三角状戟形，内裂片较小而近圆形，茎生叶形与基出叶相似，但较长大，基部呈歪箭状心形，外裂片特大而顶端渐尖。叶幼时柔嫩，老时变革质，背面有紧贴细毛。花黄色，腋生总状花序或基部分枝呈圆锥状，萼8片，排成二轮，外轮早落，内轮萼片呈花瓣状，花瓣4片，药瓣裂，1室，子房上位，1室。蒴果卵形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于阴湿的山坡杂木林中，有时也生于低山坡及山麓草丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，全年均可采收。</p> <p>用途：性味辛、甘、温，无毒。能补精强壮，祛风湿。治阳痿，小便失禁，妇女宫寒不孕，月经不调，健忘，风湿关节痹痛，四肢不仁，发背痈肿。用量：1.5~4钱。</p>
579	清风藤	钻石风，寻风藤。	清风藤科	<p>植物形态：落叶缠绕性木质藤本，茎绿色，新枝弯曲。叶互生，革质，有柄，卵形或卵状长椭圆形，长5~7厘米，宽2~4厘米，基部钝圆或短楔形，先端尖，全缘，表面深绿色，光滑，背面带白色；叶柄基部不与叶片同时凋落，而残存在茎上的呈针状，顶端微呈2歧。花黄色，单生叶腋，先叶开放，萼、花瓣均5片，雄蕊5枚，子房上位，2室。核果扁圆形，双生，或一个不发育。熟后呈深青碧色。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省。常生于山坡林边或溪谷丛林中。</p> <p>药用部分：茎供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：祛风通络，治风湿痹痛，肌肉麻木初起，皮肤搔痒及疮毒等。用量：3~5钱。</p>
580	婆婆纳	石补钉，桑肾子，小将军。	玄参科	<p>植物形态：一年生或二年生草本，高5~20厘米，茎自基部分枝，匍匐地面或斜上，有短毛茸。茎下部叶对生，上部叶互生，卵圆形或近圆形，径0.6~1厘米，边缘有圆钝齿，叶柄较叶短，间或稍长。花淡红紫色，单生叶腋，萼4深裂，花冠4裂，雄蕊2枚，子房上位，2室。蒴果球形，有纵沟及细短毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于村落，城镇路边，矿地及庭园中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味凉、淡，无毒。治膀胱疝气，阴肿及妇女白带。用量：5钱~1两。</p>
581	假地兰	马铃薯, 黄花野百	云实科, 豆科。	<p>植物形态：灌木状多年生草本，高达60厘米，全株密被黄色绢丝状茸毛，</p>

		合，野百合，响亮草，野花生，荷承草。		<p>茎直立，多分枝。叶互生，椭圆形，倒卵状长椭圆形或倒卵形，大小不一致，长2~6厘米，宽1~3厘米，基部渐狭或略呈楔形，先端钝或微尖，全缘，两面均有毛，以叶背脉上最密，托叶2枚，披针形，长0.4~0.5厘米，反折，无叶柄。花假蝶形，黄色，顶生或腋生总状花序，花萼5片，花冠5瓣，雄蕊10枚，合生。子房上位，1室。荚果长椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于山坡草丛、田边、路边草地中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味温、甘，无毒。解毒透疹，补中益气；治耳鸣耳聋，头昏目眩，肾亏遗精及妇女干血癆。用量：2~4两。</p>
582	菝葜	马加刺鳧，白茯苓，马加勒，金钢藤，鲢鱼须。	菝葜科，百合科。	<p>植物形态：常绿攀缘状木质藤本，根茎横走地中，呈不规则的弯曲，肥厚，质硬，其上疏生须根，茎硬，节处弯曲，长0.7~2米以上，有倒生或平出的疏刺。叶互生，革质，圆形或广椭圆形，叶片长5~7厘米，宽2.5~5厘米，先端钝，基部圆形或阔楔形，有时近心脏形，3~5脉，有柄，全缘，背面绿色，叶柄长4~5毫米，沿叶柄下部两侧扩大成翼状，托叶线形或成卷须状。花单性异株，黄绿色，腋生伞形花序，花萼3枚，花瓣3片，雄蕊6枚，雌花花被与雄花相同，退化雄蕊成丝状，子房上位，3室。浆果球形，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国东部及南部；多生于山坡丛林和荒山草地中。</p> <p>药用部分：根茎、叶供药用，夏秋季采收。</p> <p>用途：性味甘、酸、平，无毒。为解毒，驱风，疮科要药，有发汗，驱风，利尿及治淋病，癌症，消渴症的功用。叶捣烂外搽治恶疮。用量：根茎1~2两。</p>
583	接骨木	接骨丹，接骨风，续骨木，木蒴翟，舒筋树。	忍冬科	<p>植物形态：落叶灌木，高可达4米。茎淡绿色，无毛，髓心粗大，灰褐色。叶对生，奇数羽状复叶，长8~16厘米，总叶柄长3~7厘米，小叶柄长2毫米，小叶5~7片，卵形，椭圆形或卵状披针形，长3.5~9.5厘米，宽1.5~3.5厘米，基部偏斜楔形，先端渐尖，边缘有锯齿，中脉显著，表面深绿色，背面淡绿色，两面均无毛。花白色，顶生圆锥状聚伞花序，花萼钟形，5裂，花冠辐状，深5裂，雄蕊5枚，子房下位，5室。浆果熟时鲜红色。</p> <p>生态分布：产我国北部及东部各省。</p> <p>药用部分：根、叶及根皮入药，四季均可采用，根以9~10月采集为佳。</p> <p>用途：性味苦、平，无毒。能接骨，治跌打损伤，热痢及黄疸。用量：根、叶1~2两，水煎或泡酒服，外敷用叶和根皮。</p>
584	接骨金粟兰	节节竹，驳骨风，肿节风，九节风，草珊瑚，大威灵仙，接骨叶，青甲子，满山香，竹节茶。	金粟兰科	<p>植物形态：多年生常绿草本或亚灌木，高可达2米。根粗大，须根多数，茎直立，多分枝，绿色无毛，节明显。叶对生，革质，长椭圆形或卵状披针形，长6~18厘米，宽2~7厘米，基部稍圆，钝形或楔形，先端长尖，边缘有粗锯齿。表面深绿色，光滑，背面绿色，侧脉隆起，叶柄长0.5~1.5厘米。花淡黄绿色，顶生穗状花序，通常1~3枝聚生，无花被，雄蕊1枚，白色，子房下位，1室。浆果球形，熟时鲜红色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡常绿阔叶林或杉竹林下阴湿处。</p> <p>药用部分：根、茎、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能清热解毒，通经接骨。主治一切传染病的高烧，口腔炎，中毒性消化不良，毒蛇咬伤，跌打损伤，驱风，产后腹痛，关节痛，能舒筋活络，散瘀，消肿。用量：全株3钱~1两，外用适量。</p>
585	继木	继柴，继利条，纸末花。	金缕梅科	<p>植物形态：半常绿灌木或小乔木，高可达10米，树皮深灰色，小枝密被灰褐色星状毛。叶互生卵圆形至卵状椭圆形，长1.5~3厘米，基部斜圆形或偏心脏形，先端渐尖，钝圆或突尖，薄革质，全缘，边缘有纤毛，后无毛，背面带白霜，有细柔毛或星状毛，两面沿脉上有星状毛，叶柄密生星状毛。花白色或黄白色，丛生枝顶，萼4裂，花瓣4片，线形，雄蕊4枚，子房半下位，2室。蒴果椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国山东，长江流域至南部各省；多生于山坡疏林边，荒山草地中，沟谷丛林中，尤以红壤丘陵荒山灌丛中为最多。</p>

				<p>药用部分：根、叶、花、果实入药，全年均可采收。</p> <p>用途：根性味涩、苦，微温。能健脾化湿，通经活络。花性味甘、涩、平；能清热解毒，止痛，止血；叶嚼烂敷刀刺伤；叶能止血，治蛇伤，痢疾。用量：叶5钱~1两，花、根2~5钱。</p>
586	梧桐	调羹树，青桐皮，青桐，棕榈。	梧桐科	<p>植物形态：落叶乔木，高可达15米。树干挺直，皮灰绿色，平滑。叶互生，心状圆形，3~5掌状分裂，通常直径20~30厘米，裂片长尖，全缘，基部心形，平滑或背面有细柔毛；叶柄长8~30厘米，淡黄色。花单性或杂性，成硕大的顶生圆锥花序，单性花各具有退化雄蕊或雌蕊；萼钟形，5深裂，呈花瓣状，花瓣缺，雄蕊多数，约15枚，子房有柄，柄上着生5心皮，心皮上部结合成1柱，基部分离，各具1心皮柄，每心皮内含胚珠多数。朔果而呈骨突果状，远成熟前开裂，果瓣叶状，膜质，4~5枚向外开展。种子2~4枚，着生于果瓣的边缘。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：种子、根、叶、花入药，夏秋采收。</p> <p>用途：种子性味甘、平，无毒。治头发早白，小儿口疮，痢头，火烫伤。叶性味苦，寒；能清热解毒，治小儿疳积，发背。根性味苦，寒；治关节风湿痛。茎皮驱虫，乌须发，解毒。用量：花3~5钱，种子1~3钱，根5钱~1两，根皮、茎皮、叶3~3钱。</p>
587	梓树	水桐，河楸，花楸。	紫葳科	<p>植物形态：落叶乔木，干直立，高可达6米，树皮灰白色，皮孔纵裂。叶对生，有时轮生，有长柄，广卵形或圆形，长达15~30厘米；基部圆形或心脏形，先端尖锐，叶缘微波状，或3~5浅裂。花黄白色，顶生圆锥花序，萼小，先端2裂，花冠钟状，唇形，5裂；雄蕊4枚，2强，2枚假雄蕊较小；子房上位，2室。蒴果细长，圆柱形，长达30厘米，径1厘米，下垂。种子扁平，两端有丝状毛。</p> <p>生态分布：产东北、北部至中部各省；多栽植于城镇庭园或公路边。</p> <p>药用部分：果实，又叫“梓实”秋季采收，春夏采根皮晒干入药，叫“梓根白皮”。</p> <p>用途：根白皮性味苦、寒，无毒。能清热解毒，止吐逆反胃，消肿毒。梓实性味甘、平，无毒。能利尿，为治肾脏病药，外用杀虫。用量：根白皮、梓实1~3钱，无实热者忌用。</p>
588	梔子	黄梔子，山梔子，梔子，野桂花。	茜草科	<p>植物形态：常绿灌木，高可达2米。叶对生，革质，长椭圆形，长椭圆状披针形或卵状披针形。基部楔形，先端短尖，长4~14厘米，宽1.5~4.5厘米，全缘，表面深绿色有光泽。花白色，有芳香，单性叶腋，萼圆筒状，6裂，花冠5~7裂，雄蕊6枚；子房下位，2室，果倒卵形，至长椭圆形，具六角棱。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于阔叶林下，山坡灌丛及荒山草地中。</p> <p>药用部分：9~10月采果，四季采根入药。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。能行血解毒，利尿止血，外用消红肿，舒筋活血。治热病烦躁，口疮，跌打扭伤，吐血，衄血，黄疸，瘰癧，小儿疝气。用量：根5钱~1两；果1~4钱。</p>
589	梅叶冬青	点秤星，秤星树，岗梅。	冬青科	<p>植物形态：落叶灌木，枝圆柱状，紫黑色，有很明显散生椭圆状的凸点。叶互生，卵形，长3~8厘米，宽2~4.5厘米，基部短尖至浑圆，先端尾状短尖，尖头长达8~10厘米，边缘有小锯齿，表面深绿，秃净或略被短毛，背面绿色，有时被毛较表面为密，中脉隆起，在鲜叶时折短中脉则有白色丝状物相连，叶柄长8~10毫米。花黄绿色，单性异株，有时杂性，腋生伞形花序，萼片、花瓣和雄蕊通常4枚，有时5~6枚，子房上位，3~多室，浆果球形，有纵棱，先端有宿存的花柱。</p> <p>生态分布：产我国长江以男至南部各省；多生于山坡疏林中，荒山草地或沟边丛林中。</p> <p>药用部分：根入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、甘，凉。能清热解毒，散瘀活络，生津止渴；治感冒，</p>

			高烧，气管炎，咽喉炎，百日咳，跌打肿痛，毒蛇咬伤。又为凉茶重要原料。用量：根5钱~1两。
590	粗糠柴	香楸藤，楸树，香桂树，大检子，吕宋楸，唠哩仔。	大戟科 植物形态：常绿灌木或小乔木，幼嫩枝、叶及花序均被褐锈色柔毛。叶互生，长椭圆形至卵状披针形，长7~16厘米，宽2.5~6厘米，基部浑圆，先端渐尖，基出三脉明显，全缘或波状钝齿，表面绿色，平滑，近基部有腺体二个，背面灰绿色，被细毛，并散生红色腺点。花黄绿色，小形，单性异株，花轴密被短毛，无花瓣，雄花集聚成顶生或腋生穗状花序，裂片4~5片，雄蕊多数；雌花萼筒状，4~5齿裂，子房上位，3室，有红色腺点。蒴果近球形，稍扁，外面密被红色粉状毛茸。 生态分布：产我国南北各省；多生于山坡丛林中或村落附近灌丛中。 药用部分：果实表面的腺毛及毛茸入药，秋季采收。 用途：驱除绦虫药，毒性小，且有缓泻作用，适用于小儿及体弱者。根、干皮及蒴果外被的红色腺体广用于工业染料。
591	猪殃殃	拉拉藤，锯子草。	茜草科 植物形态：蔓状和攀缘状一年生草本，茎纤弱，四方形，多分枝，有倒生小刺。长可达1.5米，叶6~8片轮生，无柄，膜质，披针状线形至狭倒卵状长椭圆形，长1~2厘米或更长，宽2~6毫米，先端钝或短锐尖，中部以下渐狭，边缘及背面中脉有倒生小刺。花白色，腋生聚伞花序，萼及花冠均4裂，雄蕊4枚，子房下位，2室。果稍肉质双生，有钩毛。 生态分布：产我国南北各省；多生于村落城镇庭园湿地。 药用部分：全草或根药用，6~7月采集。 用途：性味甘、涩，微寒；一说辛、苦，微寒。能清热解毒，消肿止痛，治痈肿，阑尾炎，赤白浊，近用于治癌。用量：全草3~8钱。
592	猪屎豆	野花生，椭圆叶猪屎豆，野黄豆草，猪屎青。	云实科，豆科。 植物形态：落叶亚灌木，高达1.5米，枝圆柱形，具浅沟纹，被紧贴而细小的灰白色柔毛。叶互生，三小叶，叶柄扁圆形，长2~4厘米，上面有浅纵沟，小叶柄细柱形，长1~2毫米，均被灰褐色短柔毛；托叶极细小，早落；小叶倒卵形至倒卵状长圆形，顶端1枚稍大，长3~5厘米，宽1.5~2.5厘米，基部阔楔形，先端钝圆而微凹，有短尖头，全缘，表面绿色无毛，表面淡绿色而薄被紧贴细柔毛，中脉在表面微凹，再背面突起，侧脉羽状，7~9对。花黄色，假蝶形，顶生总状花序，萼5裂，旗瓣近于卵圆形而先端稍尖，有纵纹，雄蕊10枚，下部连合。荚果圆柱形，微弯、淡褐色。 生态分布：我国中部、东部及南部各省有栽植。 药用部分：根、种子及全草入药，夏秋采收。 用途：根性味微苦、辛、平，无毒。开郁解结，除湿热，理气，解毒。种子性味甘、涩、凉；能补肝肾，明目，固精。又可作咖啡的代用品。 用量：种子2~6钱，根5钱~1两。
593	猕猴桃	桃阳，狐狸桃，藤梨。	猕猴桃科 植物形态：落叶缠绕性藤本，长可达8米，嫩茎赤褐色，被毛，髓部含粘汁。叶互生，阔卵形或广椭圆形，长4~12厘米，宽约4~12厘米，基部浑圆或心脏形，先端圆钝或微凹，边缘有纤毛状细锯齿，表面暗绿色，疏被柔毛，叶背灰白色，密被茸毛，叶柄长3.5~8厘米，亦被茸毛。花单性异株，黄白色，有芳香，数朵聚生于叶腋。花萼、花瓣为5片，雄蕊多数，子房上位，多室。浆果卵形、椭圆形或球形，外被棕黑色毛。 生态分布：产我国中部至南部各省，多生于山坡村边灌丛及溪边丛林中。 药用部分：根、茎、叶、果入药，叶夏秋季采收，果晚秋采收。 用途：果性味酸、甘、寒，无毒。能止暴渴，解烦热，调中下气，祛暑热，利小便。藤中汁性味甘、寒、滑，无毒；治反胃，石淋。枝叶能杀虫。根近用于治肿瘤。
594	银线草	四叶对，四叶细辛，四片瓦，四大金刚，四大天王。	金粟兰科 植物形态：多年生草本，高可达40厘米。根茎多节，横走，分枝，须根多，细长，具香气。茎直立，不分枝，有节，每节着生2枚鳞叶，膜质，阔椭圆形至三角形。茎顶常对生4叶，呈轮生状，叶卵形或椭圆形，长6~12厘米，宽2~6厘米，基部阔楔形，先端尖或钝，边缘有粗锯齿，叶柄长1~2厘米。花在春季茎与叶还未完全伸长展开之前开放，白色，顶生穗状花

				<p>序，长2~4厘米，无花被。雄蕊1枚，子房下位，1室。核果梨形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山谷林阴下。</p> <p>药用部分：全草入药，夏季采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、有毒。能止痛，祛湿，散寒；治无名肿毒，跌打损伤，膏淋，肺癆咳嗽。用量：根5分~1钱。内服宜谨慎，孕妇禁用。</p>
595	铜锤玉带草	地钮子，地茄子，小铜锤。	半边莲科	<p>植物形态：一年生匍匐纤细小草本，平卧地表，长达45厘米，须根多，黄色，茎绿色，略呈方形，有细柔毛，节下生根。叶互生，圆形至心状卵圆形，长1~1.2厘米，宽1~1.2厘米，基部心脏形，先端钝，边缘钝锯齿，表面绿色，背面淡绿色，两面均有短毛，基脉5~7条。花淡紫色，单生叶腋而与叶对生，花梗长1~2厘米，萼5裂，边缘有刺毛，花冠左右对称，2唇形，雄蕊5枚，子房下位，2室。浆果椭圆形，紫蓝色，有宿萼。</p> <p>生态分布：产我国南部至西南各省；多生于阔叶树林阴湿处或山坡草丛湿处。</p> <p>药用部分：果入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味涩、微温，无毒。能顺气，消积，化痰，散瘀血，消痛肿，治男子遗精，女子白带，金疮出血，疝气等症（湿热滞寒者及孕妇勿用）。</p> <p>用量：1~2两。</p>
596	蛇菰	螺丝起，葛菌。	蛇菰科	<p>植物形态：多年生寄生肉草本，全体似蕈状，高7~15厘米，根茎肥厚，茎退化为单生或分枝块茎。由大小不等的浅黄褐色，块状根茎组成，表皮散布浅白色斑点。叶退化为鳞片状，无色。根茎顶端着生直立、肉质花茎，被棕黄色肉质鳞片，复瓦状排列。花单性、异株，顶生穗状花序，深红色，雄花花被3~6裂，雄蕊3~6枚；雌花无花被，心皮1，子房上位，1室。果为坚果状。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部各省；多生于深山密林下。寄生于枯枝落叶下的树根上。</p> <p>用途：性味寒、涩、苦，无毒。能清费热，解热毒；治咳嗽吐血，血崩，痔疮肿痛，梅毒，蛇头，小儿阴茎肿等。用量：3~6钱。</p>
597	蛇莓	三爪龙，蛇泡草、蛇脖子，疔药，龙吐珠。	蔷薇科	<p>植物形态：多年生草本，茎纤细，匍匐地上，长达30厘米，有灰白色的细柔毛。叶互生，具长柄，托叶与叶柄分离，小叶通常3枚，菱状卵圆形至倒卵形，长2~3.5厘米，宽1~2厘米，基部楔形，边缘钝锯齿，表面沿脉疏生细毛，背面有长毛。花黄色，单生于叶腋，花萼、花瓣均5片，雄蕊多数，心皮多数，离生。花托果时膨大成球形或椭圆形，红色，着生多数红色小瘦果，为宿存花萼所包围。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡、路旁、沟边草丛中。</p> <p>药用部分：全草供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、苦、寒，有小毒。能清热解毒，活血。治疗疮、蛇咬伤和火烧伤，带状疱疹，扁桃体炎，跌打损伤。用量：4~8钱。</p>
598	蛇含	小五三，五爪龙，五匹风，五虎下山。	蔷薇科	<p>植物形态：多年生草本，全株被绢状毛，根茎短，茎细弱，直立或匍匐地面，长14~40厘米，着地生根发新枝。叶互生，掌状3~5小叶，根生叶丛生，叶柄长，多为5出，茎生叶互生，多为3出，叶柄短，小叶椭圆状卵形至卵形，长2~4厘米，宽1~2厘米，基部狭窄，先端钝，边缘有粗齿，托叶合着，分离部三角状，膜质。花黄色，顶生或腋生复聚伞花序，副萼5片，萼片、花瓣均5片，雄蕊15~20枚，雌蕊多数，分离。瘦果广卵状长椭圆形，稍弯曲，聚成球形果序。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于湿润的原野，荒地，路旁和田边。</p> <p>药用部分：根、全草供药用，夏秋采收。</p> <p>用途：全草性味苦、寒、无毒；一说有毒。能清热，镇痉，消肿，化痰止咳；外用为解毒剂，治蜈蚣、蛇、蝎、虫咬伤，并又为止血剂，治金疮出血，风毒瘫肿，汁含漱可治咽喉峡肿痛。用量：全草1~3钱。</p>
599	蛇床	野茴香，蛇床子，蛇粟。	伞形科	<p>植物形态：一年生草本，茎直立，高达80厘米。下部有短粗毛，上部无毛，表面具棱，茎中空，根生叶有柄，柄长4~8厘米，具短而宽的叶鞘，叶片卵形，2~3回羽状全裂，长3~8厘米，宽1.5~5厘米，最后的裂片线状披针形，先端尖锐，边缘平滑，茎上部的叶与根生叶相似。花白色，顶</p>

			<p>生伞形花序，花萼、花瓣均5片，雄蕊5枚，子房下位，2室。双悬果广卵形，分果具5棱。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于山坡林边湿地或沟谷草丛中</p> <p>药用部分：果实供药用，7~8月采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、温，有小毒，果实为兴奋强壮剂，能强阳补肾，祛风燥湿，杀虫，对阳痿及妇人阴痒，带下有效，外用为洗剂，有止痒，杀虫，治顽癣，疥疮之效。用量：1~3钱。肾经有火者忌用。</p>
600	蛇根草	血和散，雪里梅。	<p>茜草科</p> <p>植物形态：多年生草本，全体常呈紫绿色，干后变红紫色，高可达33厘米，根茎匍匐地面，有分枝，叶对生，椭圆形或卵形，长3.3~5厘米，宽1.7~3.3厘米，基部广楔形，先端锐尖，全缘，叶柄长1.6~2.8厘米。花淡红或白色，顶生聚伞花序，萼5裂，花冠近漏斗状，5裂雄蕊5枚，子房下位，2室。蒴果倒圆锥形。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部；多生于山沟湿地或沟谷灌丛边湿处。</p> <p>药用部分：全草入药，四季可采。</p> <p>用途：性味平，淡。能活血散瘀，请肺发散。</p>
601	蛇地钱	地皮斑、云斑，一团云，小叶蛇地钱。	<p>地钱科</p> <p>植物形态：植物体扁平呈叶状，称为原叶体，平贴地表，下面生假根，先端二叉分歧，表面绿色气孔和气孔区明显。气孔的孔边作数回环状排列，每环约7个细胞。雌雄异体，长大后各生伞状的雌托和雄托，雌托呈圆锥形，边缘裂成细条，生于白色的长柄上，下面生许多雌器，器内各生一个卵；雄托无柄，椭圆形，呈盘状，上面生雄器，内生有鞭毛的精子。原叶体近中肋处能发生杯状体，内生胚芽，营无性生殖。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于林下湿地，沟谷岩石上或山坡阴湿处。</p> <p>药用部分：4~6月采其全株入药。</p> <p>用途：性味微甘、辛、寒。解热毒，能消肿，止痛，生肌，治痛肿，蛇咬伤，为疗疮要药。用量：外用酌量。</p>
602	甜瓜	香瓜，蜜糖埕	<p>葫芦科</p> <p>植物形态：一年生匍匐状或攀缘状的草质藤本，茎有条纹或棱角，被柔毛。叶互生，圆形或肾形，3~5浅裂，长及宽约相同，宽7~12厘米，边缘有波状齿，两面被毛或粗糙，基部心形，微粗糙。花黄色，单性同株，雄花数朵，丛生叶腋，雌花单生，萼钟状，5裂，花冠5裂，雄蕊5枚，花药分离，子房下位，1室。瓜果圆柱形或椭圆形，形状、色泽随品种不同而异。</p> <p>生态分布：我国各地均栽植。</p> <p>药用部分：瓜蒂、花托、花萼及种子供药用，8~10月采收。</p> <p>用途：甜瓜蒂性味苦、寒，有小毒。甜瓜子性味甘，寒。甜瓜蒂为催吐药，功能吐风热痰涎，膈上宿食，对胃发炎有催吐粘痰之效或用为急救催吐药。用量：瓜蒂1~2钱作煎剂；2~6分作散剂；种子3钱~1两。</p>
603	朱砂根	铁凉伞，大罗伞，凉伞遮珍珠，金鸡凉伞。	<p>紫金牛科</p> <p>植物形态：阴生常绿小灌木，全体秃净，高可达70厘米或更高，一般40厘米。叶互生，革质椭圆状披针或倒披针形，长6~10厘米，宽2~3厘米，基部阔楔形，先端短尖或渐尖，边缘皱缩成波状，具有大的蛋白质状的边缘蜜腺，在背面边缘成点状的隆起，表面浓绿稍带赤褐色，背面淡绿色，侧脉12~18厘米，极纤细，近边缘处汇合成为边脉，而常隐于卷边内。花白色或粉红色，腋生伞形花序，花萼、花冠均5裂，雄蕊5枚，子房上位，1室。核果球形，熟时红色，萼与花柱宿存。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于常绿阔叶树林下，杉木林下灌丛中。</p> <p>药用部分：根及全草入药，全年可采收。</p> <p>用途：性味苦、辛、凉；一说苦、温；一说苦、辛、平，无毒。能活血散瘀，清咽利膈，祛痰止咳。孕妇慎用。用量：根3~5钱，叶5钱~1两。</p>
604	绶草	反皮索，盘龙参。	<p>兰科</p> <p>植物形态：多年生草本，根茎极短，根肥厚，纺锤形或圆柱形而略带念珠状，淡白黄色。茎高达40厘米，淡绿色，叶数枚，生于茎基部，斜展，广线形或线状披针形，全缘，宽、长的变化都很大，最长达15厘米，宽约0.6~1厘米，基部狭长而成鞘状，先端钝尖，中脉微凹入，上部叶退化</p>

			<p>而成鞘状苞片。花淡红色，穗状花序，生于花茎顶端，总轴秃净，着花数朵，呈螺旋状排列；苞片卵状短圆形，比子房略长，渐尖；花被6片排成2轮，内轮花瓣状，唇瓣椭圆形，有皱纹，雄蕊1枚，4花粉块，子房下位，1室。蒴果椭圆形，表面有细毛。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生长于田边低湿草地上。</p> <p>药用部分：根茎和全草药用，春夏采收。</p> <p>用途：性味甘、淡、平，无毒。能滋补，凉血，解毒；治阳虚症，肺结核咳血，咽喉炎，神经衰弱等。根茎用量：3~5钱。</p>
605	续断	属折,接骨,龙豆,南草。	<p>川续断科,山萝卜科。</p> <p>植物形态：二年生或多年生草本，高约1米。地下有多数圆锥状根，黄褐色，生少数须根，茎分枝中空，具棱和浅槽，茎上密生细柔毛，棱上生有粗糙的刺毛。叶对生，有长柄，常呈羽状分裂，根生叶3裂，偶有不分裂者，茎生叶多为3~5羽状分裂或不分裂，裂片长椭圆状卵形，菱状卵形或卵形，顶生裂片为最大，长10~15厘米，宽4~7厘米，基部狭楔形，先端长尖，叶缘具锯齿，有白色柔毛，叶两面也被柔毛。花蓝白色或紫红色，顶生头状花序，球形或广卵形，苞片多枚，线形具刺，花萼浅盘状，有4角，花冠、雄蕊4枚，花托槌状，子房下位，1室。瘦果线形，有四棱，灰黑色。</p> <p>生态分布：产我国东北、北部、中部及南部各省；多生于山坡，林边草丛中。</p> <p>药用部分：根及果实供药用，秋季采收。</p> <p>用途：根性味苦、辛，微温。能补肝肾，强筋骨，通血脉，利关节，止痛，安胎；治腰痛，崩漏带下，遗精，金疮出血，跌折筋骨，妇人乳难等症。果实用作滋养调补剂，有乌须黑发之功效。用量：根1.5~3钱。</p>
606	续随子	千金子	<p>大戟科</p> <p>植物形态：二年生草本，高约1米。全株无毛，有乳汁，表面被白粉，幼嫩时较多。茎直立，在开花前顶部呈聚伞状分枝，枝较柔软。单叶互生，平展，披针形，具短柄，全缘短尖，中肋明显，叶面深绿色，叶背淡绿色，长约12厘米，上部分枝处的对生叶或轮生叶较大，卵形至卵状披针形，无柄。花淡黄绿色，单性雌雄花均无花被，同生在一杯状总苞内，杯缘顶端4裂，裂片基环生有8个黄色腺体，椭圆形，为鸟巢花序；雄花多数，每1朵雄花只有1枚雄蕊，花药黄色；雌花只有1枚，居雄花的中央，柄长，伸出杯状总苞外而侧垂，子房3室，三角形，花柱3裂。蒴果5月成熟，幼时浓绿色，熟时变为淡褐色，每室有种子一粒；种子椭圆形，灰黑色，有褐色斑点，长约4~6毫米，宽约4毫米。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡林边湿地。</p> <p>药用部分：干燥种子入药。</p> <p>用途：性味辛、温，有毒。能利水，破血，通经；治症瘕积聚，痰饮，血结，经闭，蛊毒，晚期血吸虫病，肝脾肿大。用量：5分~1钱。</p>
607	绵毛马兜铃	行骨风，寻骨风，毛马兜铃。	<p>马兜铃科</p> <p>植物形态：多年生蔓生草本，根茎圆柱形，茎密生灰白色细毛。叶互生，卵圆形，长4~10厘米，宽4~9厘米，基部深心脏形，先端钝圆或微尖，全缘，表面绿色，有细毛，背面灰白色，密生灰白色细柔毛，基出5主脉；叶柄长1.5~4厘米，密生灰褐色细毛。花黄色，单生于叶腋，花下有叶状苞片，卵形，密被细长毛；花被弯曲成漏斗状，内侧黄色，中央紫色，花药6枚，贴于花柱周围，子房下位，6室。蒴果，熟时室间开裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至中部各省；多生长于山坡草丛中或梯田边。</p> <p>药用部分：全草入药，5月间开花前采收。</p> <p>用途：性味苦、平、清香。能祛风活血，治筋骨痛及月经痛。用量：1~3钱。</p>
608	绵毛旋复花	白面风，白头公，白节枫。	<p>菊科</p> <p>植物形态：多年生草本，茎直立，有细沟及铁锈纹。叶互生，长卵形，全缘或有锯齿，表面少毛，深绿色，背面密生白色绵毛，呈灰白色，叶脉上生铁锈色的毛，茎上部的叶较狭长，叶呈耳形。花蓝紫色，顶生多数中形的头状花序，花梗软弱，常下垂，总苞片密生白色绵毛，舌状花雌性，3齿裂；管状花两性，5齿裂。瘦果有棱及刺状冠毛。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于山坡林边，灌丛及荒山草地中，</p>

			<p>路边湿地也常有生长。</p> <p>药用部分：根及全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味酸、甘，温。能祛风化湿，调经止血，止吐泻，民间用于调理病后体虚。用量：5钱~1两。</p>
609	绯红南五味子	臭饭团，冷饭团，大钻，黑老虎，透地连珠，三百两银，钻地风。	<p>五味子科</p> <p>植物形态：常绿木质藤本，长达4米。根横走，根皮褐色，有香气，茎皮褐黑色，有稀疏白色皮孔。叶互生，革质，椭圆形，长8~17厘米，两端短尖或钝，全缘，表面深绿色，有光泽，背面淡绿色。花黄色或稍带红色，单性，单生于叶腋，花被8~17枚，雄蕊多数，心皮多数，分离，密集成球形。聚合果球形，直径达10厘米，熟时紫黑色。</p> <p>生态分布：产我国南部至西南各省；多生于沟谷丛林、山坡灌林中。</p> <p>药用部分：根入药，全年均可采收。</p> <p>用途：性味辛、温、味苦，有香气。能行气止痛，活血散瘀，祛风消肿。主治慢性胃炎、急性胃肠炎、胃及十二指肠溃疡；风湿骨痛，跌打肿痛；经前腹痛、产后腹痛，浮肿。用量：5钱~1两，水煎服，研粉内服，每用3~5分。</p>
610	盘柱南五味子	外红消，红木香，内红消，南五味子。	<p>五味子科，木兰科。</p> <p>植物形态：常绿缠绕性木质藤本，长可达4米。叶互生，倒披针形至长椭圆状倒卵形，长5~10.6厘米，宽1.8~3.8厘米，基部楔状，先端尖，边缘疏生有锯齿，偶为全缘，表面深绿色有光泽，背面苍绿色，侧脉10~15对，叶柄长10~12厘米。花黄色，单性异株，单生于叶腋，花梗肥大，花萼5~9片，多数，在外部者小而圆，中部及内部者较大，广椭圆形或倒卵形，雄蕊多数，集合为头状，雌蕊分离，心皮多数，集合为球状，柱头为圆盘形。浆果椭圆形，多数小浆果集成球形的聚生浆果，熟时紫红色，有白粉。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于阔叶树林边，沟谷灌丛中。</p> <p>药用部分：根、根皮、茎、果入药，全年均可采收。</p> <p>用途：根性味苦、甘、微温，微有香气。行血理气，消胀止痛，驱蛔虫。用量：根3~5钱，研末3~5分。孕妇慎用。</p>
611	野菰	金牙齿，僧帽花。	<p>列当科</p> <p>植物形态：一年生寄生无叶草本，只有花茎露在地面，高约15厘米，全体无叶绿素。花淡红色，总状，花轴部短，由鳞状苞腋抽生花梗，顶生侧向，萼片成佛焰苞状，包围于花冠筒下部，花冠筒弯曲，唇形，先端5裂，外展，雄蕊4枚，2强，有一退化假雄蕊；子房上位，1室。蒴果卵球形。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部；多寄生在沟边或山林边禾本科草本植物的根上。</p> <p>药用部分：全草入药，秋冬采收。</p> <p>用途：治骨髓炎。</p>
612	野芋	野芋头	<p>天南星科</p> <p>植物形态：块茎通常呈卵形，茎上有退化叶的残留物。叶大，为基生单叶，有2~5片或更多，具长柄，基部抱茎，绿色或淡紫色，长20~40厘米，叶卵状，盾形，长12~45厘米，基部心形，具两耳，先端钝或短渐尖，全缘，叶面绿色被角质，背面青灰色，光滑。花单性，黄绿色，肉穗花序，藏于佛焰苞内；子房上位，1室，但常不开花。浆果，倒卵形或长椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于水沟或水田边。</p> <p>药用部分：全草及块茎入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味平、滑，有小毒。能解毒，止痛，消肿。供外用，切勿内服。治内外痔疮，吐血及小儿脱肛。</p>
613	野苋	细苋，绿苋。	<p>苋科</p> <p>植物形态：直立，多枝，无刺，秃净草本，高达60厘米。叶具长柄，卵形，长2.5~6厘米，基部截头状或阔三角形而下延，先端钝而常凹入。花单性，绿色，顶生或腋生穗状花序，萼片3裂，雄蕊3枚，子房上位，1室。胞果不开裂或不规则的开裂，有皱纹。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于村落城镇庭园，荒地上。</p> <p>药用部分：全草及根供药用，春夏采收。</p> <p>用途：全草性味甘、淡、凉。功能清热，解毒，利尿，止痛，明目。用量：1~2两。</p>

614	野菱	菱角	菱科，柳叶菜科。	<p>植物形态：一年生水生草本，茎细长，常因水的深浅而长短不一，茎上各节生2、3条有多数丝状分枝的丝状根。叶在茎端丛生而向四方散开，叶片卵状菱形，长1~2厘米，基部广楔形，先端锐尖，边缘上部有数个三角形的深锯齿，表面光滑，背面叶脉隆起，疏生软毛，柄长1~8厘米，上部有膨大的海绵质囊，呈长椭圆形至披针形，长1~1.5厘米。花淡红白色，腋生，萼片、花冠均4片，子房下位，2室。核果扁平三角形，上具4刺。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于池塘，湖沼中。</p> <p>药用部分：果实入药，夏秋采收。</p> <p>用途：菱壳对胃癌，子宫癌有效。多供食用或提制菱粉，菱的淀粉常作青霉素的培养基。全草治小儿头疮毒，解酒毒及增强视力。</p>
615	野薤	野白头，薤白，野大蒜头，野蒜。	石蒜科，百合科。	<p>植物形态：多年生草本，鳞茎丛生于一短的根茎上，卵状披针形，长4~5厘米，鳞被膜质，白色。叶丛生鳞茎上，线形，长20~45厘米，宽约2毫米，内面扁平，外面隆起，呈半圆柱上，苍绿色，质柔软。花紫红色，顶生伞形花序，外有薄膜质苞片2~3片，花被6片，雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果，具3棱。种子黑色。</p> <p>生态分布：产我国北部及中部各省；多生于山坡或田园边草地中。</p> <p>药用部分：鳞茎供药用，5月采收。</p> <p>用途：性味苦、辛，温。能温中通阳，下气散结，并有祛痰作用，可作理气药，适用于慢性胃炎，凡胸闷胀痛，欲吐不吐，喘息咳嗽，冷泻、久痢均可服用；外用涂烧伤及金疮，治各种疮疖，鳞茎捣烂外敷。用量：1.5~3钱。</p>
616	野梨	豆梨	蔷薇科	<p>植物形态：落叶乔木，高达9米；树皮灰黑色，小枝无毛。叶互生，宽卵形至卵圆形，稀长椭圆形，基部圆形至宽楔形，先端短尖，长4~8厘米，宽3.5~5.5厘米，边缘有圆钝锯齿，两面无毛；叶柄长2~4厘米。花白色，腋生伞房总状花序；花萼、花瓣均5片，雄蕊多数，子房下位，2~3室。梨果球形，直径1厘米，黑褐色，有斑点。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡，溪谷，以及村落附近的丛林中。</p> <p>药用部分：果入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味酸、甘、涩、寒，无毒。烧食能止滑痢。枝、叶治霍乱，吐泻不止，转筋腹痛，反胃吐食。</p>
617	野大豆	野黄豆，菽，山黄豆，蔓豆。	豆科	<p>植物形态：一年生缠绕性草本，主根细长，可达20厘米以上，侧根稀疏，蔓茎纤细，略带四棱形，密披浅黄色，紧贴长硬毛。叶互生，3小叶，总叶柄长2~5.5厘米，被浅黄色硬毛；小叶片长卵状披针形，披针状长椭圆形或为卵形，长2~6.5厘米，宽1~3.5厘米，基部菱状楔形、宽楔形或近圆形，先端渐尖或少有钝状，并具短尖头，侧生小叶片基部常偏斜，表面绿色，背面浅绿色，两面均有浅黄色紧贴硬毛，叶脉于两面稍隆起，全缘，小叶柄根短，密披棕褐色硬毛，基部具小托叶，细小而呈针状。花蝶形，淡红紫色，腋生总状花序，花萼钟状，5裂，旗瓣近圆形，雄蕊常为10枚，单体。子房上位，1室。荚果线状长椭圆形，略弯曲，种子2~4粒。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于向阳山坡疏林下和路边以及山麓、郊野、田边及土埂上。</p> <p>药用部分：干燥种子、根、藤与荚果入药，夏秋采收。</p> <p>用途：种子性味甘，微寒。能清肝火，解痘毒。藤和荚果治盗汗，小儿疳积，目生翳障初起，根治伤筋。用量：种子1.5~4钱。</p>
618	野豇豆	土高丽参	豆科	<p>植物形态：多年生缠绕性草本。主根圆柱形或圆锥形，肉质，外皮橙黄色。蔓茎粗，下部木质化，中部柔韧，表面被浅棕黄色长粗毛，后渐脱落。叶互生，3小叶；总叶柄长2.5~5厘米，被长粗毛，基部具卵状披针形托叶1对，托叶长4~5毫米，具显明纵纹，并被长粗毛，顶生小叶菱状卵形或广卵形，基部宽楔形或近圆形，先端渐尖，侧生小叶广卵形，外侧特宽，基部近截形，长4~8厘米，宽2.5~4.5厘米，表面深绿色，背面淡绿色，两面均散生淡黄白色长粗毛，从基部分出三主脉，主脉和侧脉</p>

			<p>于两面均隆起，全缘，纸质。小叶柄极短，被棕褐色粗毛。花淡红色，蝶形，腋生总状花序，花萼钟形，5裂，旗瓣近圆形，顶端微缺，雄蕊10枚，2体。荚果线形，圆筒状，种子10~14粒。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部；多生于向阳山坡林缘和山麓野草丛中，常缠绕树上、灌丛或草丛上。</p> <p>药用部分：夏季采根药用。</p> <p>用途：性味甘、苦，微温。能作补气药，治神经衰弱，瘰癧及毒蛇咬伤。</p> <p>用量：3~5钱。</p>
619	野豌豆	野麻豌豆，大巢菜。	<p>豆科</p> <p>植物形态：一年生草本，高达50厘米，稀被黄色短柔毛。叶互生，偶数羽状复叶，托叶半箭头状，一边有1~3个披针状牙齿，一边全缘，小叶8~16片，顶叶变成卷须，叶片椭圆形或倒披针形，基部楔形，先端截形或凹，并具细尖，两面稀被黄色短柔毛，长8~18毫米，宽4~8毫米。花蝶形，深紫色或玫瑰红色；花萼钟形，5裂，旗瓣倒卵形，顶端凹；雄蕊10枚，两体，子房有短柄，被黄色微柔毛。荚果线状长椭圆形，约具10粒种子。</p> <p>生态分布：产我国北部；多生于山坡草地，村落附近及田园边草丛中。</p> <p>药用部分：4~5月采收全草入药。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能生血，活血，破血。治肾虚遗精，腰痛，湿热黄肿，疔疮。用量：5钱~1两。</p>
620	野牡丹	山石榴，活血丹，高脚山落苏。	<p>野牡丹科</p> <p>植物形态：常绿灌木，高可达1.5米，嫩枝和叶均被粗毛。叶对生，长卵形，长5~12厘米，宽2.5~4厘米，基部圆形，先端尖，全缘，叶脉3~5条，叶柄短，长约0.5~1厘米。花淡紫堇色，顶生总状花序，萼和花瓣各5裂，雄蕊8~10枚，子房下位，5室。蒴果壶状，生有褐色刚毛。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于山坡灌丛草地中或荒山草地及路边。</p> <p>药用部分：根、全株、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：全株性味涩、酸、平，无毒。能化滞消积，解毒消肿，止血止痛；治菌痢，肠炎，肝炎，疝气，胃痛，血栓性脉管炎，便血，衄血，血吸虫病，跌打刀伤。用量：全株5钱~1两，叶3~7钱，根1~2两。</p>
621	野燕麦	燕麦草，乌麦。	<p>禾本科</p> <p>植物形态：一年生草本，须根较坚韧，秆直立，光滑，高达1.2米，具2~4节。叶鞘松弛，光滑或茎部被微毛；叶舌透明，膜质，长1~5毫米；叶片扁平，线形，长10~30厘米，宽4~12毫米，微粗糙，上面和边缘疏生柔毛。花单性，顶生圆锥形状花序，小穗含2~4朵小花，柄弯曲下垂，顶端膨胀，密生淡棕色或白色硬毛，节脆硬易脱落；颖片革质，几相等，通常具9脉；外颖质地坚硬，第一颖长15~20毫米，背面中部以下具棕色或白色硬毛，基盘密生淡棕色或白色短鬃毛；芒从稃体中部稍下处伸出，长2~4厘米，膝曲；芒柱棕色，扭转。颖果被淡棕色柔毛，腹面具纵沟。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；常伴生于小麦田中，为田间杂草之一；荒山草地亦有生长。</p> <p>药用部分：春夏季结子时采集全草入药，其他时间亦可采收。</p> <p>用途：性味甘、温，无毒。能补虚损；治吐血，出虚汗及妇女红崩等症。</p> <p>用量：5钱~2两。</p>
622	野南瓜	鸡婆紫，算盘珠，馒头果，山金桔，鸡目椒，面头果，柿子椒。	<p>大戟科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高可达2.5米，多分枝。小枝密被短柔毛。叶互生，具短柄，叶片长椭圆形，或椭圆状卵形，长3~5厘米，宽6~25毫米，基部广楔形或近圆形，先端钝或短尖，全缘，表面深绿色或粉绿色，近无毛或被疏毛，背面被短柔毛。花单性，淡绿色，雄花萼6枚，雄蕊3枚，雌花萼片6枚，子房上位，3室。硕果扁球形，上具沟棱，似“南瓜”状，故名“野南瓜”。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部各省；多生于山坡林边灌丛中，或砍伐迹地上，以及荒山草地。</p> <p>药用部分：根、茎、果实及叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：根、果实性味苦、涩、凉，有小毒。能行血活血，散寒，解毒，破瘀止痛。治痢疾，疟疾腹泻，消化不良，脱肛，闭经，牙痛，感冒，小便不利，头颈痛，淋症，咳嗽胸胀。用量：根5钱~2两；果3~5钱。</p>

623	野木瓜	乌藤，八月挪，假荔枝。	木通科	<p>植物形态：常绿缠绕性木质藤本，复叶，长达9米。茎枝平滑无毛。叶互生，掌状复叶，柄长8~10厘米，小叶5~7片，革质，长椭圆形至长椭圆状披针形，长4~12厘米，基部圆形，先端渐尖，全缘，表面绿色有光泽，背面有网状脉，小叶柄长1.5~3厘米，下部的叶常由6~7小叶组成，长椭圆形，长约7.5~10厘米，或上部的叶仅由3叶组成。花绿紫色，单性异株，腋生伞房状，花被6片，雄花有雄蕊6枚，无花糖腺；雌花有6个卵形花糖腺，心皮3个，分离，子房上位，1室。浆果卵形，紫红色。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；多生于山谷林缘，或沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、温，无毒。能舒筋活血，解热利尿，镇痛排脓，通经导湿。治风湿骨痛，跌打损伤，水肿，脚气，金疮，痈肿，小便不痛，月经不调。用量：5钱~1两。</p>
624	野慈姑	剪刀草	泽泻科	<p>植物形态：多年生浅水生草本。直立，高达1米。叶根生，有长柄抱茎，叶片狭窄，基部呈剪刀状箭形，长3.5~9厘米，先端长尖，绿色。花白色，于伸长的花茎上排列成总状花序，花一般为3朵轮生，下部雌花，具短梗，上部为雄花，具细长的梗，萼片披针形，基部略联合，花瓣较萼片大，雄蕊多数带堇色，心皮多数离生，密集成圆球状。具有薄翅聚合成球形，瘦果。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、寒，有小毒。能解毒消肿，治蛇咬伤及一切肿毒恶疮。</p> <p>用量：3~5钱。只作外用，不能内服。</p>
625	野甘草	红花耳草，甘草。	茜草科	<p>植物形态：多年生亚灌木草本，茎基部木质，近圆柱形，上部稍为四方形，全体有短柔毛。叶对生，椭圆状披针形至长椭圆形，长约3~10厘米，宽约0.8~2.8厘米，基部楔形，先端渐尖或钝，全缘，表面绿色密被短柔毛，背面灰绿色密生短柔毛，叶脉在背面凸起，白色，羽脉3~4对，在近边缘处相联结，叶柄短或近无柄，托叶合生，三角形，具尖齿。花淡红或白色，顶生聚伞花序，花梗、苞片、萼、花冠均密被短柔毛，萼4裂，花冠漏斗状，4裂，雄蕊4枚，子房下位，2室。蒴果椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于山坡灌丛边，荒山草地及路边。</p> <p>药用部分：全草及根入药，7~10月采收。</p> <p>用途：性味甘、平。祛风，清热，止血，解毒。用量：5钱~1两。</p>
626	野山药	山药，紫梯机，山薯，淮山，土洋参，九黄姜，野白薯，薯蓣。	薯蓣科	<p>植物形态：多年生缠绕性草质藤本。块茎肥厚，略成圆柱形；茎紫绿色，细长蔓延。叶对生或3叶轮生，卵状披针形或三角状卵形，长5~10厘米，宽3~6厘米，基部耳状心脏形，先端长尖，叶腋常有球形的肉质珠牙称为“零余子”，叶柄长2~4厘米。花淡紫色，单性异株，腋生穗状花序，花被6片，雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果略圆形，具3翅。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生长于山坡、林边、沟谷灌丛中。</p> <p>药用部分：块根及叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、平、温，无毒。能清热解毒，补脾健胃；治遗精、滑精，无名肿毒，毒蛇咬伤。用量：块根3~6钱。</p>
627	野山楂	山楂子，山楂，红果子，小叶山楂。	蔷薇科	<p>植物形态：多枝落叶灌木，高达1.5米。枝条有长5~8毫米的刺针；幼枝有短柔毛。叶阔倒卵形与倒卵状长椭圆形，基部渐狭而接近于短叶柄，长2~6厘米，宽1~3厘米，基部楔形，边缘有缺刻及不整齐锯齿，顶端常为3裂，表面平滑无毛，背面有疏毛，脉上亦稍有毛，托叶近于卵形，有牙齿。花白色，伞房花序，3~7花丛生，萼片5片，花瓣5片，雄蕊20枚，花药红色，子房下位，3~5室。梨果球形或梨形，红色或黄色，萼宿存而向外反曲。</p> <p>生态分布：产我国北部、中部至南部各省；多生于林缘或荒山草地。</p> <p>药用部分：茎、叶、果实及果核均供药用，果实于9~11月，茎随时可采，叶春夏秋季采收。</p> <p>用途：果实性味酸、甘，微温，无毒。消积散瘀，补脾健胃，行结气，化血块，活血。核化食磨积。治反胃，小儿麻疹，产妇腰痛，妇人崩带，</p>

			疝气，老人腰痛。茎消积。叶主治漆疮。用量：果2~4钱，根1~2两。
628	野芝麻	野油麻	<p>唇形科</p> <p>植物形态：多年生草本，高可达80厘米，茎丛生，软弱，4棱，被细细茸。叶对生，心脏形或卵形。长3~9厘米，宽1~5.6厘米，基部心形，先端尖或尾尖，边缘有锯齿或重锯齿，表面及背面脉上或有疏柔毛，叶柄长0.6~5厘米。花淡红或白色，唇形，腋生轮伞花序，花萼筒状，5裂，花冠唇形，上唇呈萼状，2裂，下唇3裂，有舌状附属物，雄蕊4枚，2强，子房上位，4室。小坚果长圆形，有三棱。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于林间，空旷地的灌木丛中或山坡疏林下。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛，淡。能清热解毒，消肿止痛。</p>
629	野蔷薇	墙靡，营实，多花蔷薇，刺花。	<p>蔷薇科</p> <p>植物形态：落叶灌木，枝长而弯垂，高可达2米，茎枝多被皮刺。叶互生，奇数羽状复叶，小叶3~9枚，小叶片椭圆形或广卵形，长2~4.5厘米，宽1~2.3厘米，基部钝圆形，先端钝或尖，边缘有锯齿，两面均有细柔毛，托叶栉齿状，几全部附着于叶柄的两侧。花淡红或白色，芳香，顶生圆锥状伞房花序，花梗上着生少数腺毛，萼、花瓣均5片，雄蕊多数，伸出花托之外，心皮多数，分离，子房上位，1室。瘦果生于壶状花托内，花托发育成为椭圆状球形光滑的假果称为“蔷薇果”。熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国北部和中部各省；多生于山坡林边，溪边丛林中，荒山灌丛中。</p> <p>药用部分：根、花、果、叶入药，春夏秋采收。</p> <p>用途：花性味甘，平；为泻下药及利尿药，能除风湿，利关节，小量作芳香健胃药；治痢疽恶疮，眼热昏暗。蒸溜花露可治口疮及消渴。根性味涩，寒；能止泻痢，除风热、湿热，缩小便，止消渴。果实性味酸、温；能去风湿，利关节。用量：根、叶5钱~1两，花1~3钱。</p>
630	野菊花	路边菊，野黄菊。	<p>菊科</p> <p>植物形态：多年生草本，茎直立或匍匐状，高可达1米，表面有细纵沟，疏被柔毛。叶互生，卵状三角形或长椭圆状卵形。长4~7厘米，宽1~3厘米，羽状分裂，裂片又作羽状浅裂，基部楔形，向叶柄渐狭而呈羽状，先端尖而浅凸头，表面深绿色，背面淡绿色，两面均有细柔毛，有托叶。花黄色，顶生伞房状头状花序，头状花序外围为舌状花，中央为管状花，先端5齿裂，子房下位。瘦果上端无冠毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡灌丛中，路边，村落城镇附近有生长。</p> <p>药用部分：花序、全草及叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：花性味微寒、甘、苦、有小毒。花的挥发油可以治霍乱，并止腹痛，又为创伤防腐剂，花对各种化脓性炎症有消炎杀菌之效力，以鲜枝捣汁外涂或作洗剂，功效显著。用量：全草3~5钱；花1~3钱。外敷适量。</p>
631	野扇花	单鞭，土丹皮，清香桂，大风消。	<p>黄杨科</p> <p>植物形态：常绿灌木，高达2米，小枝有棱纹，幼时有短柔毛。叶薄革质，互生，卵形或椭圆形，长3.5~11厘米，宽1~3厘米。基部阔楔形或圆形，先端渐尖，全缘，稍反卷，表面暗绿色有光泽，背面淡绿色有光泽，中肋在表面凸起，羽状叶脉不明显。花单性，白色，有芳香，腋生总状花序，常4朵聚生，无花瓣，雌花生于基部，萼片与雄蕊5数，子房上位，2室。果为核果状，球形，暗赤色。</p> <p>生态分布：产我国长江上、中游各省；多生于向阳山坡灌丛中。</p> <p>药用部分：根入药，秋冬季采收。</p> <p>用途：性味辛，温。能活血疏筋，祛风消肿。用量：5钱~1两。</p>
632	野花椒	黄总管，天角刺，川椒。	<p>芸香科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高达3米。枝条有皮孔水平直出或斜上的皮刺，基部宽而扁，幼枝有细毛或无毛。叶互生，奇数羽状复叶，长5~10厘米，叶轴两侧有狭翼，背面疏生向上弯的皮刺；小叶对生，5~13片，具短柄或无柄，小叶片卵状披针形，长1.5~5厘米，宽8~20毫米，基部楔尖，两侧略不对称，边缘有细圆齿，表面及齿缝外均有透明而粗大的腺点，表面深绿色，背面青绿色，无毛或沿中脉基部两侧有柔毛，中脉在下面凸起，疏生小皮刺。花青绿色，单性，顶生聚伞状圆锥花序，花被6~8片，</p>

				<p>雄花通常有雄蕊5~7枚，稀为4或8枚，子房上位，有柄，果为蒴果状，红色或紫红色，表面有半透明的腺点。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于灌丛中及丛林中或山坡，路旁。</p> <p>药用部分：根、果实及叶入药，果实6~8月采收，余夏秋采收。</p> <p>用途：果壳性味辛、温，有毒。能散寒湿，治脘腹寒痛，吐泻及蛔虫痛等。叶作芳香健胃药。根治积劳损伤，胸腹酸痛麻木。种子能行水，治水肿胀满。用量：果壳8分~1钱，种子5分~1钱5分。</p>
633	野苎麻	野麻，苎仔，线麻，苎麻。	荨麻科	<p>植物形态：多年生草本或亚灌木，高达2米。茎直立，有分枝，密生灰褐色粗糙毛。叶互生，卵圆形，长7~14厘米，宽5~8厘米，基部圆形或楔形，先端长渐尖，边缘有粗齿，表面绿色，粗糙，疏生刚毛，背面灰白色，密被白色绵毛，基出3主脉，叶柄长3~10厘米，疏生灰白色毛。花淡绿色，单性同株，腋生圆锥花序，雄花序生新枝下部叶腋，花萼4裂，雄蕊4枚；雌花序生新枝上部，成小球形花丛，花萼管状，4裂，子房上位，1室。瘦果细小，椭圆形，有细毛，褐色，花柱宿存。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于沟谷草丛中或栽植于园圃中。</p> <p>药用部分：根、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：根性味甘、寒。能利尿，解热，安胎，治淋病，消渴，孕妇胎动，腹痛下血等症。叶为止血剂；治创伤出血，瘀血。根、叶并治急性淋浊，尿道炎出血，子宫脱垂，子宫内膜炎，赤白带下。用量：1.5~3钱。</p>
634	野漆树	薯利子，黄漆树。	漆树科	<p>植物形态：落叶乔木，高可达10米。嫩枝和冬芽均具棕黄色柔毛，皮孔不显著。叶互生，羽状复叶，叶轴圆柱形，被棕黄色柔毛，小叶7~13片，具短柄，小叶片卵形或卵状椭圆形，长4~10厘米，宽3~2厘米，顶端渐尖，基部略斜，圆形或宽楔形，先端渐尖，表面绿色，疏生柔毛或近光滑，背面灰绿色，具黄色短柔毛，在脉间及脉上较多，侧脉18~25对，显著。花黄色，腋生圆锥花序，萼片、花瓣、雄蕊均5数，子房上位，1室。核果扁而偏斜，淡棕黄色，光滑无毛。</p> <p>生态分布：产我国中部各省；多生疏林中，或砍伐迹地丛林中。</p> <p>药用部分：根皮入药，夏秋采收。</p> <p>用途：治刀伤出血。</p>
635	野鸦椿	野鸭椿，夜夜椿，鸡眼椒，鸭椿子树，秤杆树，淡椿子，狗椿子，红果栲。	省沽油科	<p>植物形态：落叶小乔木或灌木，高达5米。树皮灰色，具纵裂纹，小枝红紫色，有细纵裂纹。叶对生，奇数羽状复叶，小叶7~11枚，卵形至卵状披针形，长4~8厘米，宽2~4厘米，基部圆形以至阔楔形，先端尖，边缘有细齿，具柄，表面绿色，背面较淡，脉上有毛，托叶针形。花黄绿色，顶生圆锥花序，花萼5裂；花瓣5枚，雄蕊5枚，子房上位，2~3室。骨突果紫红色，萼宿存。种子蓝黑色，附于果皮上。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至福建一带；多生于阔叶林或杉竹林中。</p> <p>药用部分：叶、根及果入药；果农历7~8月采收，根及叶夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能发表散寒，行气，利湿祛风，软坚消积；治月经过多，水腹坠胀。</p>
636	野凤仙花	霸王七，万年芭，芭七。	凤仙花科	<p>植物形态：多年生草本，高约60厘米；根节发达，肉质，根茎状或成圆形，椭圆形的块根，茎肉质多汁，透明直立，分枝，节处膨大，绿色带紫红色，有毛。叶互生，叶柄长1~3厘米，叶片卵形，向下延长，先端尖，边缘有圆齿状锯齿，齿与齿间有极细的线形裂片。花黄色，腋生总状花序；花萼3片，中间一片居下，囊状，特大，向后延生成弯距，黄色，两侧者小，绿色，花冠5瓣，上端一瓣常直立，每侧2瓣愈合为一，雄蕊5枚，子房上位，5室。蒴果为角果状，长纺锤状。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于山林，水沟及流水边等潮湿处。</p> <p>药用部分：根、叶入药，秋冬采集。</p> <p>用途：性味辛、苦、微寒，无毒。能祛瘀消肿，解毒；治跌打损伤及疔疮等症。用量：5~8钱，泡酒服。</p>
637	野胡萝卜	鹤虱风	伞形科	<p>植物形态：二年生草本，高达120厘米。根圆锥形，肉质，红色、橙黄色</p>

				<p>或黄色，茎单生，具倒糙硬毛。根生叶长圆形，2~3回羽状分裂，最后裂片线形至披针形，长2~15毫米，宽0.8~4毫米，先端尖锐成小凸头，光滑或具糙硬毛，叶柄长3~12厘米，具叶鞘；茎生叶无柄，有叶鞘，最后叶片近线形，先端尖。花白色、黄色或淡红色，顶生复伞形花序，总苞片多数，羽状分裂，萼小形，不明显，花冠5瓣，雄蕊5枚，子房下位，2室。双悬果卵圆形，上具5主棱，4条次棱具翅。</p> <p>生态分布：原为栽培物；多野生于村落城镇附近的田野荒地上。</p> <p>药用部分：全草、根和果实均入药，在冬春间采挖，果实在夏间成熟后采摘。</p> <p>用途：全草性味微甘、苦、寒，有小毒。能杀虫，解烟毒，消肿，消气，化痰；治妇女干病及痒疹。果实性味辛、苦、平、有小毒。治虫积腹痛。</p> <p>用量：果实1~2钱。</p>
638	麻栎	毛猴儿，橡碗树，栎树，青刚，柞树。	壳斗科	<p>植物形态：落叶乔木，高达25米，树皮灰褐色，密生细毛。叶互生，卵状长椭圆形，长椭圆状披针形或长椭圆状倒披针形，基部阔楔形、圆形或稍呈心脏形，先端长尖，长8~18厘米，宽2~5厘米，侧脉12~16对，直达齿端，成刚毛状突出，表面绿色有光泽，背面脉腋有毛。花绿色，单性同株，雌雄花序都着生于新枝的叶腋，雌花序有雌花1~3朵，雄花多数，成细长下垂的茅荑花序。坚果近圆形稍呈椭圆形，壳斗具伸长反曲的鳞片，鳞片具灰白色细毛，包着坚果的二分之一。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部各省；多生于山坡疏林中，松山林或竹林中，以及砍伐迹地中。</p> <p>药用部分：果入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、微温，无毒。能消乳肿，涩肠止泻，妇人乳房吹肿，哮喘，下痢及血痢。用量：4~6钱，水煎服。孕妇忌服。</p>
639	鹿藿	牛眼珠藤，野毛豆。	豆科	<p>植物形态：多年生缠绕性藤本，全株密被淡黄色柔毛。叶互生，小叶3枚，顶端小叶近圆形，表面疏被短柔毛，背面密被长柔毛和松脂腺点，侧生小叶偏阔卵形或偏阔椭圆形，先端急尖，基部圆形，长2~6厘米，宽1.5~4.5厘米，托叶披针形或锥形。花蝶形，黄色，腋生总状花序，花萼钟状，5裂，旗瓣较宽，反曲，雄蕊10枚，两体。荚果扁，椭圆形，1~2种子。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡，旷野溪边，路旁灌丛中。</p> <p>药用部分：全草或根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、平，无毒。祛痰，解毒，杀虫，祛风湿，和血气。治蛊毒，女子腰腹痛，肠痈，瘰癧，头痛，眼痛，腹痛。</p>
640	鹿蹄草	鹿卸草，破血丹，一药草。	鹿蹄草科、石南科。	<p>植物形态：多年生常绿草本，茎极短，近地面茎细长匍匐，节上有退化鳞片状小叶及不定根，地下茎具棱角。叶互生，圆形至阔椭圆形，长3~7厘米，宽2.5~5.5厘米，先端钝圆，微凹，基部钝圆或稍带楔形，边缘浅波状或具细凸齿，表面暗绿色，有光泽，叶背及叶柄均带紫红色，叶柄长4~8厘米，扁圆，上面凹下。花白色，顶生总状花序，花萼5深裂，花瓣5枚，雄蕊10枚，雌蕊1枚，子房上位，4~5室。蒴果，扁球形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于较高的山地山坡的针叶或阔叶林阴下。</p> <p>药用部分：全草入药，全年采集。</p> <p>用途：性味苦、温，无毒。能强筋壮骨，祛风除湿，活血止血；治金疮出血，蛇、虫、犬咬伤。用量：3~4钱。</p>
641	崖椒	青椒，山花椒，天椒，土花椒，香椒子。	芸香科	<p>植物形态：落叶灌木，高达3米，枝上疏生皮刺，无毛。叶互生，奇数羽状复叶，长12~25厘米，叶轴有狭翼，中间下陷成小沟状，背面有斜上的小沟刺，小叶11~23片，上部的对生，下部的近对生或互生，斜卵形或卵状披针形，长3.5~5.5厘米，宽1.5~2.3厘米，基部楔形，有时偏斜，两侧不对称，边缘有细锯齿，齿缝有腺点，基部两侧边缘常反卷，先端长，渐狭而钝头，表面绿色，疏生有毛，下面淡黄色，无毛，小叶柄极短，无毛。花绿色，单性异株，顶生伞房状圆锥花序，花萼、花瓣、雄蕊均5数，雄花有退化心皮2~3枚，雌花心皮3枚，子房上位，3室。果实为1~3</p>

				<p>个干果合成，表面有腺点。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于山坡疏林中。</p> <p>药用部分：根、叶及果实入药，叶夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、温，有毒。功能发汗散寒，止咳，消积除胀。果实为健胃剂，镇咳药，可敷乳房肿痛及无名肿毒，毒蛇咬伤等，又为驱降蛔虫药，并为食品香料。用量：根1~3钱；种子8分~1钱5分，水煎服。</p>
642	商陆	土红参，抱母鸡， 乌鸡母兜。	商陆科	<p>植物形态：多年生草本，全体平滑无毛。茎高1~1.5米，呈圆柱形或稍具棱角，多分枝，肉质多水汁，通常绿色或紫红色。叶互生，有叶柄，叶片卵圆形，基部楔形，两边不相等，先端尖，全缘。花白色，后变淡紫红色，顶生总状花序，通常和叶对生，花被5片，雄蕊8个；雌蕊8~10个，子房上位。浆果，8~10分果轮生，扁球形，熟时呈紫红色或紫黑色。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：根供药用，栽培二年后采收，春季二月、秋季九月采根。</p> <p>用途：性味苦、辛、寒，有毒。能通大小肠，泻蛊毒，堕胎；行气活血，利水消肿，补脾益肾，除肠热，水肿胀满；外敷痈肿恶疮。用量：1~3钱。</p> <p>脾虚（营养不良）及孕妇忌用。</p>
643	雪见草	叶下红，关公须， 落地红，虾蟆草， 雪风草。	唇行科	<p>植物形态：冬季一年生直立草本，高30~60厘米。茎粗壮，分枝，被灰色小粗毛。叶对生，基部叶多平贴地面，具长柄，长椭圆形或倒卵长椭圆形，长3~7厘米，基部渐狭，先端钝，边缘有钝圆齿，生于花茎上的叶较小，为披针形。花蓝色，极小，轮生于花茎每节上，呈圆锥状，总状花序；花萼被疏毛并有淡黄色腺点，上唇全缘，下唇2裂；花冠较小不及4毫米，雄蕊2枚，子房上位，4裂。小坚果黑褐色。</p> <p>生态分布：产我国南部；生于丘陵山坡松林及疏林边，而以荒山草地为最多。</p> <p>药用部分：全草及根入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：根性味苦、辛、凉，无毒。能活血，消痈肿，止吐衄，全草治疮毒。用量：根3~7钱，全草5钱~1两。外用不定量。</p>
644	犁头草	犁咀草，犁尖菜， 玉如意，剪刀菜。	堇菜科	<p>植物形态：多年生草本，茎极短，主根粗短，白色，无匍匐枝，全草高约12厘米。叶根生，长卵形、卵状椭圆形至三角状卵形，长2~6厘米，宽1.5~4厘米，先端钝，边缘具钝锯齿，基部浅心形至心脏形，一部分与叶柄联合，叶柄上端有狭翅，长2~8厘米。花紫色，单生于花茎顶端，花两侧对称，花萼、花瓣均5片，花距长约7毫米，雄蕊5枚，子房上位，1室，3心皮。蒴果长圆形，3瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域及南部各省；多生于山坡林边、溪边或荒山草地中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏季至秋初，于花正开放时采集。</p> <p>用途：性味苦、辛、寒，无毒。能清热解毒，除脓消炎。治痈疽、疗毒、瘰癧、疮疡等症，内服并外用。用量：3~5钱。</p>
645	紫花地丁	地丁草，紫花地 丁，箭头草，羊角 子，米布袋。	堇菜科	<p>植物形态：多年生草本，茎极短，植株高约7厘米。密被白色短毛，地下有白色细圆柱状的根数条。叶根生，有长叶柄，叶片长椭圆形或线状披针形，基部截形或楔形，顶端钝状，边缘具波状钝锯齿，托叶与叶柄基部合生，上端分离呈狭披针形，全缘。花紫色，有时为白色，腋生，有长柄，近中部有小苞片2枚，萼片和花瓣均5枚，最下1枚基部延长成囊状或长椭圆状的距，雄蕊5枚，子房上位，1室。蒴果三角状卵形成椭圆形。</p> <p>生态分布：产我长江中下游至南部各省；多生于山坡、溪边草地及田边。</p> <p>药用部分：全草入药，4~7月开花期或果熟后采收。</p> <p>用途：与犁头草相同。</p>
646	常山	和常山，日本常 山。	芸香科	<p>植物形态：落叶灌木，高可达3米。枝条黄褐色，无毛，嫩梢绿色，疏生白色柔毛，后脱落，或平滑无毛。叶互生，开花时发恶臭，叶片菱状卵形至卵状椭圆形，长5~13厘米，宽2~7厘米，基部阔楔形，先端渐尖或具钝状椭圆形，全缘或具钝锯齿，表面深绿色，有多数透明腺点，中脉及侧脉疏生短柔毛，背面淡绿色，初密生细毛，后脱落；叶柄沟状，长5~8</p>

				<p>毫米。花单性异株，雄花侧生于新枝基部，总状花序，萼、花瓣、雄蕊均4数，雌花单生，萼、花瓣4数，退化雄蕊4枚，子房上位，4心皮。蒴果2瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国长江以南各省；生于疏林下或灌丛中。</p> <p>药用部分：根、叶、茎均可供药用，9~10月采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、寒，有小毒。根有祛痰，解热镇咳，催吐作用，外用治无名肿毒。茎、叶汁液可杀马身上的虱。用量：根1.5~3钱。</p>
647	常春藤	三角尖，钻矢风，三角枫，上树蜈蚣，枫荷梨藤。	五加科	<p>植物形态：常绿攀缘木质藤本。气根纤细，密被白毛，攀缘性，茎被淡黄棕色或灰色的毛鳞，尤以幼枝上为多，且具白色长绒毛。叶互生，革质，具膜质鳞片；营养枝上的叶为三角卵形至三角长椭圆形，长5~12厘米，3裂，边缘有时为细波状，基部截形或阔楔形，先端渐尖，表面深绿色，背面浅绿或黄绿色；叶柄长约2.5~4.5厘米；花枝的叶为卵圆形至菱形，全缘，基部圆形或楔形，叶柄具鳞片。花淡黄色，顶生伞形花序，萼、花瓣、雄蕊均5数，子房下位，5室。浆果球形，黄色或红色。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部各省；多生于阔叶林中的树干上，或附生于沟谷阴湿处的岩石上。</p> <p>药用部分：全草、茎、叶、果实入药，茎、叶全年可采，果实秋冬可采。</p> <p>用途：全草性味苦、辛、温，无毒。治风湿流注，痈疽肿毒，眼生云翳及肝炎等症。茎、叶味苦。果实性味甘、温，无毒。用量：全草1~3钱，作煎剂或熬水洗疮。</p>
648	常绿油麻藤	常绿黎豆，棉麻花藤位，常春油麻藤，过山龙。	豆科	<p>植物形态：常绿缠绕性木质大藤本，茎长达数9米，直径有时达30厘米。叶互生，3小叶，革质，卵状长椭圆形，长7.5~12.5厘米，先端渐尖，两面无毛，网脉明显，表面有光泽。花蝶形，暗紫色，腋生总状花序，萼阔钟状，5裂，旗瓣远较其他瓣为短，雄蕊10枚，两体。荚果木质，扁平，长线形，长达30~60厘米，宽2.8~3.5厘米。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于阔叶林内阴湿处，缠绕于大树上或灌丛上。</p> <p>药用部分：茎入药，全年可采。根、叶也供药用。</p> <p>用途：性味甘、温，无毒。能活血化痰，治腰脊疼痛，四肢麻木。功用同丰城鸡血藤。用量：4钱~1两。</p>
649	蓖麻	红蓖麻，毗麻，大麻子，草麻。	大戟科	<p>植物形态：一年生草本，茎高达2米，中空，少分枝，幼枝通常绿色，具白粉，有环状的节痕。叶互生，盾形，直径20~70厘米不等，掌状分裂，裂片长卵形或狭形，先端尖，边缘有不整齐的锐锯齿，两面均光滑无毛。花单性同株，顶生总状花穗，上部为雌花，暗红色，下部为雄花，淡黄色，雄花花被3~5片，雄蕊多数，雌花花被5片，子房上位，3室。蒴果球形，一般表面密布尖刺，亦有光滑无刺者，成熟后3裂，每室有种子1粒。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：种子或叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、平，有小毒。能消肿排脓，开窍通经络。主治疮肿疥癬，胞衣不下，口眼歪斜等症。种子用量：8分~1钱5分。</p>
650	萝卜	菜菔，萝卜。	十字花科	<p>植物形态：二年生草本，茎高达约1米，地下具有肉质肥厚的主根。叶有柄，光滑具聚尖毛；根生叶丛生，通常浅或深羽状分裂；茎生叶互生，全缘或羽状分裂，叶片大小及形态不一，但一般以先端的一裂片为最大，表面有粗毛，边缘有锯齿，长约18~40厘米，愈往上愈小。花十字形，白色或浅红色，顶生总状花序；花萼、花瓣均4片，雄蕊6枚，4强，子房上位，2室。长角果，肉质，略呈念珠状的圆柱形，顶端有小喙。</p> <p>生态分布：我国各地普遍有栽植。</p> <p>药用部分：幼苗、根、种子均入药，冬春采收。</p> <p>用途：根性味甘、辛、平，生用性凉，熟食性温，无毒。萝卜下气，消食，清热，解毒。老萝卜头下气，利水，清虚热头痛，多配方用。萝卜秧性味苦。清热，利水，治痢疾腹泻。鲜萝卜捣汁加糖服或生服，治秋冬季燥火喉痛，下痢，解烦渴，消饱胀。种子性味甘、辛、平。能下气定喘，消食化痰。治咳嗽痰喘，胸闷腹胀，食常，下痢等。用量：种子1.</p>

			5~3钱，老根4钱~1两，萝卜秧4钱~1两。
651	萝摩	奶浆藤，飞来鹤，白环藤。	萝摩科 <p>植物形态：多年生蔓生草本，长达2米以上。折断后有乳汁，全体被软毛，地上茎常缠绕他物上升。叶对生，具柄，长1~6厘米，宽4~8厘米，基部心脏形，先端锐尖，全缘，表面绿色，背面白绿色，幼时被柔毛。花绿白色，腋生总状花序，萼5深裂，花冠5裂，副花冠短，呈环形；雄蕊5枚，花药箭形，先端有心脏形薄膜，花粉快每室1个，雌蕊1枚，子房上位，由二个离生心皮组成。骨突果呈角状，种子多数，扁卵形，边缘呈翅状，上端着生多数白色绢丝状毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡林边或沟谷林中。</p> <p>药用部分：果壳、种子、茎、叶入药，冬季采种子，夏季采茎、叶。</p> <p>用途：果壳性味咸、平。能软坚，清肺化痰，定惊，止血，治肺风痰喘，损伤出血等症。全草性味甘、微辛；一说淡、平，无毒能补气，益精，发奶，治虚弱白带有效，并适用于治癆伤及其他气虚，虚损诸症。有风寒外感的应先解表后用。亦治牛、马、猪乳汁不通。叶捣烂敷肿毒及蛇虫毒，子敷金疮能生肌止血。用量：果壳8分~3钱，全草1~2两。</p>
652	菊花	黄甘菊，黄菊花，茶菊，杭菊花。	菊科 <p>植物形态：栽培的多年生草本，高60~150厘米。茎直立，上部分枝开展，具细毛或绒毛。叶互生，具短柄。卵圆形至披针形，长5~10厘米，略作羽状裂，边缘微有锯齿，裂齿尖锐或钝圆，背面具白色绒毛，基部楔形。花有白、黄等颜色，顶生头状花序，总苞被毛，外层苞片线形，绿色，具白色绒毛，边缘膜质，头状花序边缘为舌状花，中央为管状花，雄蕊5枚，聚生药，子房下位，1室。瘦果，无冠毛。</p> <p>生态分布：产我国中部及东部，各地广栽植。</p> <p>药用部分：全草或花供药用，在霜降前后采摘，可采2~3次。</p> <p>用途：性味甘、苦，微寒。为散风热药，清头目，降火，解毒。治头痛眩晕，血压亢进，神经性头痛等；又为眼科药，对结膜炎，绿内障等有效，民间用鲜汁治疗疮，肿毒。用量：花1~3钱。</p>
653	烟草	烟	茄科 <p>植物形态：一年生草本，高达2.5米，多分枝，被粘质柔毛，基部木质化。叶互生，极大椭圆状卵形至长椭圆状倒卵形，长10~50厘米，宽5~25厘米，基部渐狭，稍抱茎，先端渐尖，全缘，表面深绿色，具粘质柔毛，背面绿色，主脉粗壮。花淡红色，顶生圆锥花序，花萼钟形，5裂，花冠漏斗状，5裂，雄蕊5枚，子房上位，2室。蒴果，卵形。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽植。</p> <p>药用部分：全草入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、温，有小毒。能镇静，辟瘴气。治腰痛，骨气痛，麻木不仁，偏头风痛。</p>
654	菖蒲	白菖，水菖蒲，泥菖蒲。	天南星科 <p>植物形态：浅水生多年生草本，根茎较肥大，横生地下，分枝，有多数环节，呈淡红色，全株有特殊香气。叶丛生根部，2列式互生状，剑形，长50~150厘米，宽8~15毫米，中脉明显，基部抱茎，先端尖。花黄绿色，顶生肉穗花序，长约5厘米，圆柱状，佛焰苞为花序柄的延长，叶状，长与叶相等，花序柄扁平，长6.5~30厘米，花被6片，雄蕊6枚，雌蕊1枚，子房上位，2~4室。浆果长椭圆形，熟时红色，聚集于肉穗花序上。</p> <p>生态分布：产我国各地；多生于池塘，水泽和水沟中；村落附近也常有栽植。</p> <p>药用部分：根茎供药用，8~9月采收。</p> <p>用途：性味辛、温。能为辟秽开窍，宣气逐痰，解毒，杀虫。治癫狂，惊痫，痰厥昏迷，风寒湿痹，噤口毒痢，外敷痈疽疥癣。用量：1~2钱。</p>
655	菟丝子	龙须子，黄藤子，金灯藤。	旋花科，菟丝子科。 <p>植物形态：一年生无叶的寄生草本，全体无毛。茎纤细，左旋，缠绕，多分枝，直径不足1毫米，长可达1米，黄白色而带紫色，随处生吸器，侵入寄主组织内。无绿色叶，而有三角状卵形的鳞片叶。花绿白色，丛生成球形，花萼杯状，先端5裂，花冠钟状，5浅裂，雄蕊5枚，子房上位，2室。蒴果扁球形，种子褐色。</p> <p>生态分布：产我国各地；多寄生于溪边丛林上，或山坡灌丛上；田园作物上也常有生长。</p>

				<p>药用部分：种子或全草入药，8~9月间割取全草，捆成小把，晒干后打出种子，除去杂质，再晒干入药用。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。有补肝肾，养血，润燥之功效，能治遗尿，遗精，大便燥秘，风湿瘫痪。用量：种子1~3钱，全草2~5钱。</p>
656	豆寄生	菟丝子，龙须子。	旋花科，菟丝子科。	<p>植物形态：一年生无叶的寄生草本。常寄生于豆科、菊科、藜科或山茶科植物上，茎肉质，蔓性，左旋，丝状，橙黄色，长可达1米，随处生吸盘附着于寄主体上。花白色，细小多数，簇生成球形，有苞片，萼片5裂，稍肉质，花冠5裂，倍长于萼，短钟形，雄蕊5枚与花冠裂片互生。子房圆形，2室。蒴果略呈球形，较菟丝子为大，茎约4毫米，顶部中央凹入，花柱及萼宿存。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：种子入药，秋冬季采收。</p> <p>用途：与菟丝子同。用量：1~3钱。</p>
657	黄瓜	勒瓜，王瓜，刺瓜，胡瓜。	葫芦科	<p>植物形态：一年生匍匐状或攀缘性草本，全体被有刚毛，茎细长，可达3米，下部为圆形，上部方形，有卷须。叶互生，有柄，叶片三角状卵形，长7~15厘米，掌状3浅裂，裂片呈锐尖三角形，边缘有微尖齿牙，两面均粗糙。花黄色，单性同株，单生或丛生叶腋，花萼5裂，花冠盆状，5裂，雄蕊5枚，合生，子房下位，1室。瓜果圆柱形，嫩时中部有刺毛，青绿色或后变白色或黄色。</p> <p>生态分布：我国各地普遍栽培。</p> <p>药用部分：藤、叶、根及果均供药用，春夏采收。</p> <p>用途：藤、叶性味微寒、淡，无毒。清热利水，除湿，滑肠；治痢疾，腹泻。用量：鲜叶1~2两。</p>
658	黄荆	大叶黄荆，黄荆树，蚊子柴，布荆，五指柑。	马鞭草科	<p>植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达5米，全体有香气，嫩枝被细绒毛。叶对生，掌状复叶，常为5小叶，间有3小叶，小叶椭圆状卵形、披针形或椭圆状倒卵形，小叶长3~10厘米，基部楔形，先端长尖，全缘或浅波状缘，或两侧有浅锯齿2~5个，表面绿色，稀有短毛，背面色，被小柔毛，干时黑色，中间3小叶具柄，两侧小叶常无柄。花淡紫色，顶生圆锥状花序，萼钟状，5裂，花冠唇形，5裂，雄蕊4枚，2强，子房上位，2室。核果球形，褐色。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于溪边灌丛中，村落附近及路边也常有生长。</p> <p>药用部分：根、茎、叶、果实入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、苦，无毒。能消暑止渴，利尿，镇痛祛痰，利气。茎治灼烂，灼疮，风火牙痛，青盲内障。根性味甘、苦、平，无毒。能解肌发汗；治心风，头风，肢体诸风。叶性味苦、寒，无毒。治痢疾霍乱转筋，血淋，下部疮，脚气肿满，九窍出血。果实性味苦、温，无毒。能除骨间寒热，通利胃气，止咳逆下气；治心痛及妇女白带，小肠疝气，耳聋。荆沥（取粗茎一段，火烤之，两端流出的荆汁）性味甘、平，无毒，能去心间烦热，除痰唾，解热痢；治头风目眩，中风口噤，头痛疮肿，下痢等。用量：果实1.5~3钱；根3~7钱；叶2~3钱；荆沥50~100毫升冲服。</p>
659	黄堇	断肠草，黄花鱼灯草，粪桶草。	紫堇科，罂粟科。	<p>植物形态：二年或多年生草本，高达40厘米，柔软多汁，全体光滑无毛，有恶臭气味。叶互生，基生叶具长柄；二回羽状复叶，长5~10厘米，宽3~5厘米，小叶广卵形，深裂，裂片卵形；茎生叶具短柄，较基生叶为小。花黄色，侧生总状花序，多与叶对生，苞片线状披针形，花萼2片，细小，花瓣4片，外两片不相等，前一片平展，后一片基部延长成距状，雄蕊6枚，两体，后面一体的花丝具蜜腺伸入距内，子房上位，1室。蒴果线形。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部各省；多生于山谷林边湿地，村落附近，田边或庭园边湿地。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏季采收。</p> <p>用途：性味苦、寒、涩，有毒。能解毒杀虫，治疮毒疥癣，毒蛇咬伤。一般不作内服。</p>

660	黄精	山姜，南黄精，多花黄精。	百合科	<p>植物形态：多年生草本，高达70厘米。根茎横走地下，节明显，淡黄色，肥大多肉。地上茎稍倾斜，光滑无毛。叶互生，无柄，椭圆形、长圆状椭圆形或卵状椭圆形，长8~14厘米，宽3.5~5.7厘米，基部渐狭，先端钝尖，两面均无毛，纵脉5~7条，在背面隆起。花绿白色，3~5朵，腋生，下垂伞形花序，花被6裂，雄蕊6枚，子房上位，3室。浆果球形，熟时蓝色。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部各省；多生于山坡林边阴湿处，沟谷丛林边。</p> <p>药用部分：根茎入药，秋冬采收。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。能补肾润肺，益气滋阴，治脾虚面黄，肺虚咳嗽，筋骨酸痹及产后气血衰弱等症。用量：3钱~1两。</p>
661	黄樟	猴樟，大叶樟，樟木。	樟科	<p>植物形态：常绿乔木，高达25米。全体无毛，树皮灰白或灰褐色，枝条绿褐色，小枝有角棱。叶互生，革质，叶形大小及脉序变异较大，一般为椭圆状卵形或长椭圆状卵形，长6~12厘米，宽3~6厘米，基部楔形或阔楔形，先端急尖，全缘，叶脉羽状，脉腋无腺体，侧脉每边4~5条，表面深绿色有光泽，背面粉绿色，叶柄长1.5~3厘米。花绿白色，顶生伞房状花序，花被6片，发育雄蕊9枚，3轮，花药4室，第4轮为退化雄蕊，子房上位，1室。浆果球形，有宿存杯状花被，熟时黑色。</p> <p>生态分布：产我国南部至西南部；多生于山坡常绿阔叶林或沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：根入药，全年均可采收。</p> <p>用途：能舒筋活血，止痛。</p>
662	黄麻	络麻	田麻科，椴树科。	<p>植物形态：一年生草本，高可达4米，茎直立，仅近顶端有分枝。叶互生，膜质，卵状披针形至披针形，长5~12厘米，宽1.5~4厘米，先端渐尖，基部微圆，边缘有锯齿，两侧最下1齿延伸成尾状尖锐的裂片，两面光滑，仅背面脉上疏生伏毛；托叶线形，长5~10厘米。花黄色，树数朵腋生，花萼与花瓣各5片，雄蕊多数，分离，子房上位，5室。蒴果倒卵状球形，有10条丛棱和小突瘤。</p> <p>生态分布：我国各地广栽培。</p> <p>药用部分：根、叶、种子入药，夏秋采收。</p> <p>用途：种子含酞，味苦，有毒。功能调经止血。根能祛痰止血，治石淋及带下崩中。叶能止痛止痢。用量：种子3~6钱；根5钱~1两；叶3~5钱。</p>
663	黄连	鸡爪黄连	毛茛科	<p>植物形态：多年生草本，高约30厘米，根茎横走，黄色，长4~6厘米，常弯曲，有多数细分枝；地上茎不明显。叶根生，有长柄约10~15厘米，3出复叶，老叶常带革质，三角状卵形，小叶3枚，中央1枚常较长，每片小叶略成菱形，长5~8厘米，宽3~5厘米，羽状深裂，裂片尖锐，边缘重锯齿，表面绿色，平滑有光泽，脉上有微毛，背面淡绿色带黄色，无毛。花黄白色，两性或有时单性，顶生圆锥状聚伞花序，生于由叶丛中抽出的花茎上，萼片披针形，羽状3~5深裂；花萼5片，花瓣蜜腺状，雄蕊、雌蕊均多数，心皮分离，子房有柄。骨突果6~9枚，聚生呈伞形果穗。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部；多生于海拔较高的山地林边水沟湿地，或沟谷阔叶林下。</p> <p>药用部分：根茎、叶入药，秋季及冬初采收。</p> <p>用途：性味苦，寒。能泻火，燥湿，解毒，止泻。治热病泄泻，痢疾，心烦，呕吐，咯血，消渴，目疾赤痛，痈肿疔毒，口舌生疮，湿疮。用量：3分~2钱。</p>
664	黄连木	香柏连，黄连茶，凉茶树，鸡冠木，黄楝树。	漆树科	<p>植物形态：落叶乔木，高达25米，有特殊气味，小枝有细柔毛。叶互生，奇数羽状复叶，顶端小叶常不发达，侧生小叶5~6对，具短柄，小叶披针形至卵状披针形，长5~9厘米，基部偏斜，先端渐尖，幼时两面主脉间有微细柔毛，后变为光滑，全缘，质柔软，叶轴亦具细毛。花小，黄绿色，单性异株，雄花成腋生圆锥花序；雌花成疏散的腋生圆锥花序。雄花萼片1~2片，雄蕊3~5枚；雌花萼片2~5片，子房上位，1室。核果倒卵状扁球形，黄白色，后变红紫色。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于村落附近阔叶树疏林中或栽培于庭</p>

				<p>园中。</p> <p>药用部分：树皮及叶入药，树皮全年可采取，叶夏秋均可采收。</p> <p>用途：治风湿疮及漆疮初起。</p>
665	黄水枝	博落	虎耳草科	<p>植物形态：多年生草本，高约25厘米。根黄褐色，须根多，根茎伸长，有时分枝，茎有纵沟，绿色，有白色柔毛。叶基生，叶片心脏形至卵圆形，为不明显的3~5裂，长约8厘米，宽约4.5厘米，叶柄细长，长5~15厘米，疏生长刚毛及短腺毛，具不整齐的钝锯齿，齿先端有刺，边缘有腺毛，基部心脏形，先端钝，表面绿色有腺毛；茎生叶互生，2~3枚，叶较小而短柄，叶脉掌状5出较明显，呈黄褐色。花白色，顶生总状花序，密被短腺毛，花萼、花瓣均5片，雄蕊10枚，子房上位，1室。蒴果2瓣裂。生态分布：产我国长江流域至西南各省；多生于山地林边，路旁或阴湿的石壁上。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。能散表发汗，活血去瘀；治跌打损伤。用量5~8钱。</p>
666	黄药子	金线吊葫芦，黄独，土芋，零余薯。	薯蓣科	<p>植物形态：多年生草质缠绕藤本，地下块茎单生，逐年由前年的块茎顶端增大，球形或圆锥形，少有分裂的，具多数须根；茎圆柱形，长达5米，光滑，无刺。叶腋内通常生有球形多疣突的珠芽（零馀子）。叶互生，心状卵形，基部阔心形，先端锐尖，全缘，有纵脉7~9条。花黄绿色，单性异株；雄花为穗状花序，短而丛生，或延长为圆锥花序式排列，雌花序稍长，丛生；花被裂片6片，雄蕊6枚，子房下位，3室。蒴果长椭圆形，有3个翼状硬膜质翅。</p> <p>生态分布：产我国东南部、南部至西南各省；多生于溪谷冲积土灌丛中或山坡丛林边。</p> <p>药用部分：块茎入药，9~11月采收。</p> <p>用途：性味苦、咸，有毒。能祛湿散痰，凉血，降火，消痈肿，止血。治吐血，蛇咬伤，咳嗽，肿瘤。用量5钱~1两。</p>
667	黄胆草	荷包草，小马蹄草，马蹄金，小金线草，螺丕草，小叶积雪草。	旋花科	<p>植物形态：匍匐状纤细成片生长的多年生草本，通常被灰色小毛。叶互生，圆形或肾形，直径8~20毫米，少有达2.5厘米者，基部心形，先端钝圆而微凹，全缘，表面绿色，背面淡绿色，被稀疏毛茸，叶柄长2~4.5厘米。花黄色，单生于叶腋，花柄短于叶柄，萼片5裂，花冠钟形，深5裂，雄蕊5枚，子房半下位，为2个分离心皮组成。蒴果膜质，近于球形，1~2个外被毛茸。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡林边，灌丛边阴湿处或田边。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏季采收。</p> <p>用途：性味辛，平。能消炎，解毒，杀虫，接骨。可治黄疸病，痢疾，尿路结石，肺出血，跌打损伤。用量：3~5钱。</p>
668	黄蜀葵	霸天伞，疳疮药，水棉花，棉花七，棉花蒿	锦葵科	<p>植物形态：一年生草本，高达1.5米。茎圆柱形，被灰褐色刚毛。叶互生，有长柄，托叶阔披针形或披针形，叶片掌状5~9深裂，裂片狭长，长椭圆状披针形或卵状椭圆形，长达17厘米，先端渐尖，边缘粗锯齿，表面绿色，背面淡绿色，幼时密生黄褐色细毛，老则无毛或几无毛，沿脉有细毛。叶脉放射状，直达裂片的尖端。花黄色，单生叶腋，萼5裂，花瓣5片，雄蕊多数，单体，子房上位，5室。蒴果长椭圆形，有5棱，密生刚毛，熟时5纵裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部和西南各省；多生于沟谷丛林边，山坡或溪边丛林中，或栽植于村落园圃边。</p> <p>药用部分：花、种子、根或茎入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、滑、微寒，无毒。和血，润肠，除邪火。治红崩、白带、吐血、大便结燥。花与根功用相同。用量：根5钱~1两。</p>
669	黄瑞香	瑞香，纪氏瑞香，祖师麻。	瑞香科	<p>植物形态：半常绿灌木，高约60厘米，树皮灰褐色，富纤维，不易折断。叶互生，常聚生于枝端，倒披针形，长3~9厘米，基部楔形，先端尖或钝，有微凸，叶表绿色，背面粉白色，近无柄。花黄色，有芳香，顶生头状</p>

			<p>花序，常3~8朵，无苞片，萼呈花冠状，圆筒形，4裂，无花瓣，雄蕊8枚，2列，子房上位，1室。核果卵圆形，鲜红色。</p> <p>生态分布：产我国中部至长江中游；多生于阔叶树林下阴湿处。</p> <p>药用部分：茎皮及根皮入药，全年可采收。</p> <p>用途：性味苦、辛、温，有小毒。能止痛、散血、补血；有麻醉性。俗云“打的就地爬，离不了祖师麻”。主用于跌打损伤、周身疼痛、头痛、心胃痛、腰腿痛。又治四肢麻木，发热骨蒸等症。用量：1~3钱。</p>
670	黄常山	常山，鸡骨常山，白常山。	<p>八仙花科，虎耳草科。</p> <p>植物形态：落叶灌木，高达2米。主根木质，坚硬，圆柱形，常作被状弯曲，长达30厘米以上，直径5~25毫米，外皮黄棕色或灰棕色，有纵纹。茎枝圆形，有节，幼时被棕黄色短毛。叶对生，椭圆形、广披针形或长圆状倒卵形，长5~17厘米，宽2~6厘米，基部楔形，先端渐尖，边缘有细锯齿，表面深绿色，背面淡绿色，幼时两面均疏被棕黄色短毛。花淡兰色，顶生状圆锥花序，花萼管状，附生于子房上，先端5~6齿，花瓣5~6片，雄蕊10~12枚着生于花瓣基部，子房下位，3~5室。浆果圆形，兰色有宿存的萼和花柱。</p> <p>生态分布：产我国中部和长江流域各省；多生于山坡阔叶树林边，沟谷丛林下或溪边灌丛中。</p> <p>药用部分：根、叶入药，8~10月采收。</p> <p>用途：性味苦、寒，有毒。能止痰、截疟，治疗新久各种疟疾，老痰积饮，欲吐不能，胸胁胀满等症。用量：5分~3钱。老年及体弱者慎用。</p>
671	黄花蒿	臭蒿，青蒿。	<p>菊科</p> <p>植物形态：一年生草本，茎直立，高达1米，无毛，有纵纹，上部多分枝。全体有奇臭。叶互生，自茎基部向茎梢逐渐变小，基部抱茎，2至多回羽状细裂，裂片先端尖，表面绿色，背面黄绿色，两面均有细微的短毛。花淡黄色或白色，头状花序球形，排成圆锥花丛；总苞圆球形，花全为管状花，雌花较小，通常位于外轮，两性花位于中央，瘦果卵状，微小，淡褐色，表面有隆起的纵条纹，无冠毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于村落旷地、路边，溪地湿地。</p> <p>药用部分：茎、根或全草入药，10~11月采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、寒，无毒。茎叶作煎剂，有健胃作用，鲜叶揉汁治恶疮，疥癣及毒虫咬伤。又清热，下气，治小儿风寒凉热及盗汗，另可防治植物病和杀虫。用量：全草2~3钱。</p>
672	黄花大远志	黄花倒水莲，黄金卵，吊吊黄，念健，黄花鸡骨。	<p>远志科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高1~2.5米，树皮灰白色。叶互生，披针形至倒卵状披针形或椭圆形，长8~20厘米，宽3~7厘米，基部渐狭或近圆形，先端渐尖，全缘，两面均平滑无毛，叶柄长8~12毫米。花黄色，左右对称，下垂总状花序或圆锥花序；花萼5片，内面两侧2萼片甚大，呈花瓣状，花瓣3片，下部合生，中央的1瓣较大，呈囊状，近顶端处有流苏状附属物；雄蕊8枚，花丝下部合生，子房上位，2室。蒴果阔肾脏形，扁平。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于山坡疏林下及沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：根、全株或叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘，微温，无毒。有除湿，强壮滋补作用，其根浸入于水缸中，吃此水后可防治“黄病”。主治病后和产后虚弱，营养不良性水肿，产后血崩，子宫脱垂，肾虚腰痛，月经不调，肝炎，风湿关节炎等。本品可代黄芪、党参用。用量5钱~1两。</p>
673	黄毛耳草	铺地蜈蚣，过路蜈蚣，地蜈蚣，白山茄，野地茄子，地麻筋，山茄，山莲。	<p>茜草科</p> <p>植物形态：多年生草本。常呈铺散、匍匐状，全株均被有黄绿色细长柔毛，以茎、叶柄、托叶、叶背脉尖等处为多。茎具角棱，纤弱，黄绿色，节上有须根，基部稍木质化，上部近于圆形。叶对生，具短柄，叶片卵形至长圆状披针形或椭圆形，长1~2.5厘米，宽0.6~1.2厘米，先端尖，有时稍钝，基部稍圆，或为广楔形，全缘，表面深绿色，背面黄绿色，托叶连合成披针状，膜质，顶钝，钻状齿裂。花淡紫色、白色，数朵丛生于叶腋；花柄细柱形，长2~3毫米，密被长柔毛，萼4裂，萼筒漏斗形，长1~2毫米，花冠漏斗形，长5~6毫米，先端4深裂，雄蕊4枚，着生于花冠筒内喉部，子房下位，2室。蒴果扁球形，膜质，长和宽均约2厘米，</p>

				<p>熟时室背开裂。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于山坡林边，灌丛下，溪边及荒山湿地草丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，6~10月采收。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。能清热解毒，止血散瘀肿，又可治毒蛇咬伤。</p> <p>用量：5钱~1两。</p>
674	游草	田中游草，水游草,牛草,李氏禾。	禾本科	<p>植物形态：水生或湿地多年生草本。秆下部伏卧于地面或倾斜，并于节处生根，上部直立部分高可达50厘米，节处密被倒生白色细毛。叶2列式互生，披针形长15~16厘米，宽约1厘米，粗糙，叶鞘光滑或粗糙，上部通常短于节间，叶舌膜质，长1~2毫米，基部两侧下延于叶鞘边缘相愈合，先端渐尖，全缘。花绿色，顶生圆锥状穗状花序，小穗含3小花，无芒，两侧扁平，颖退化，外稃较薄，具5脉，脊背与边缘均具刺毛，内稃具3脉，脊上有硬纤毛，雄蕊6枚，子房上位，1室。颖果长2.5毫米。</p> <p>生态分布：产我国南部；多生于沟边、池边、沼泽边及水田边的潮湿处。</p> <p>药用部分：全草或根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味涩、平，无毒。能散寒解毒，通经络。治疟疾，感冒及全身疼痛。用量：5~8钱。</p>
675	溲疏	空疏	八仙花科，虎耳草科。	<p>植物形态：落叶灌木，高达3米。小枝具赤褐色而为细薄剥落状树皮，幼时有星状短柔毛。叶对生，卵圆形以至长椭圆状披针形，长3~8厘米，宽2~4厘米，基部通常圆形，先端尖形或钝而渐尖，边缘为钝状小齿牙，表面浓绿色，两面有星状短柔毛，背面具有10~15放射星状毛；中脉在表面下陷，背面隆起，叶柄长约1厘米。花白色或外面带红色，顶生圆锥花序，萼齿5个，花瓣5片，雄蕊10枚，子房下位，3室。蒴果近于球形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省及山东等处；多生于山坡林边，沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：树皮、果实入药，夏秋采收。</p> <p>用途：为退热剂，去胃中热及皮肤中热，利尿道。果实和糯米煎服。</p>
676	腊莲	大叶土常山,大叶老鼠竹，白马桑，崖马桑。	八仙花科，虎耳草科。	<p>植物形态：落叶灌木，高约2.5米。小枝密生，平贴尖硬毛。叶对生，长椭圆状卵形至椭圆状披针形或宽披针形，长7~8厘米，宽3~8厘米，基部楔形或圆形，先端渐尖，表面散生平贴尖硬毛，尤以脉上为多，边缘具细锯齿或锯齿，叶脉于背面显著隆起，叶柄长1~3厘米，下部叶柄可至5厘米，也具平贴尖硬毛。花白色或稍带紫色，顶生伞形花序，花序周围为不孕性花，萼片花瓣状而特别大，为阔卵形或浑圆形，全缘或有锯齿；中央为孕性花，较小，萼与花瓣均为5数，雄蕊10枚，雌蕊柱头2，偶为3，子房下位，2~5室。蒴果扁球形，顶端平截，宿存花柱2歧。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至西南各省；多生于山坡疏林内，溪谷两旁灌丛中。</p> <p>药用部分：根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、酸、凉，有小毒。能消食积，解热毒；治疟疾，消肠中热积，除胸腹胀满，擦癣癩，治肿毒。用量：2~4钱。</p>
677	腊梅	黄梅花，蜡木。	腊梅科	<p>植物形态：落叶灌木，高可达4米，枝条丛生，呈方形，棕褐色，皮孔突出，树皮内具油细胞。叶对生，卵状椭圆形或卵状披针形，长6~18厘米，宽4~7厘米，基部圆形或阔楔形，先端渐尖，全缘，无毛，表面深绿色，粗糙，背面浅绿色，具短柄，柄长0.3~1厘米，无托叶。花先叶开放，黄色，带浓郁芳香，花密生于已落的叶腋处，花被多数，螺旋状排列，雄蕊5~6枚，雌蕊多数，分离，生于壶形的花托内，花托口部收缩，边缘有不孕性雄蕊，子房1室，有1胚珠。瘦果具种子1枚，为花托所包藏，熟时花托长大成倒卵形或卵圆形的假果，外有绢丝状毛。</p> <p>生态分布：产我国中部；全国各地有栽植。</p> <p>药用部分：花蕾及花12月~翌年1月（大雪~大寒）分批摘取花蕾及初开放的花入药。</p> <p>用途：性味辛、苦、温，无毒。能解暑生津，开胃散瘀。治心烦渴，气郁纳滞。现代用治麻疹，百日咳。采花浸生油中为“腊梅花油”，治烫伤。</p>

			根及茎作镇静、镇咳、止喘药。用量：1~3钱。
678	棕榈	棕树，棕榈，败棕子。	<p>棕榈科</p> <p>植物形态：常绿乔木，高达5米。茎圆柱形，直立，不分枝。由纤维状老叶鞘形成轮节，包被茎干上。叶大形，丛生于茎端，有长叶柄，掌状，形成圆扇形，直径1米许，叶片边缘深裂成30~60片线状披针形的裂片，具放射状叶脉，叶柄基脚有纤维状叶鞘，俗称“棕布”。花单性异株，黄绿色，腋生多枝的肉穗花序，包于大型佛焰苞内，花被6片，雄花有6雄蕊，雌花有1雌蕊，子房3，基部合生，上位。核果球形，坚硬，熟时黄色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部和西南各省。</p> <p>药用部分：根、棕毛、茎、叶、果入药，除果秋季采收外，余全年均可采用。</p> <p>用途：果实、棕毛性味苦、涩、平。泻热、收涩，止血。主治吐血，衄血，崩带，肠风，赤白痢。根能通淋，治淋症，小便不利。用量：棕毛1~3钱，冲服；鲜根1两，水煎服。</p>
679	棣棠	兑棠花凤凰，地棠，金地棠，清明花，麻叶棣棠，黄榆叶梅。	<p>蔷薇科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高1~2米。小枝绿色，老时平滑无毛。叶互生，椭圆形或三角状卵形，长2~7厘米，宽1~4厘米，基部截形或微心脏形，先端渐尖，边缘有缺刻状重锯齿，表面光滑，鲜绿色，背面苍白色，嫩叶两面脉上疏生白柔毛，托叶膜质，披针形。花黄色，单生枝顶，花萼5深裂，花瓣5片，花盘环状，雄蕊多数，雌蕊5枚，分离，子房上位，各1室，瘦果棕黑色。</p> <p>生态分布：产我国中部至长江流域和南部各省；多生于山坡林边，沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：花入药，春夏采收；根及嫩叶亦供药用，与花同，但药力较弱，四季可采。</p> <p>用途：花性味涩、平，无毒。能行水消肿止痛；治久咳，消化不良，外洗小儿荨麻疹，关节炎等。用量：5分~8钱。</p>
680	斑茅	芭茅	<p>禾本科</p> <p>植物形态：多年生草本，具粗壮被鳞片的根茎，高达3米。秆直立，无毛，具多节，节具长须毛。叶互生，叶鞘无毛或有毛，下部者长于而上部者短于节间，叶舌长0.5~1毫米，先端钝圆，具小纤毛，叶片线形，长10~60厘米，宽4~12毫米，除上面基部密生柔毛外余均无毛，顶生圆锥状穗状花序，呈扇形，长20~30厘米，主轴无毛，仅在分枝腋间有短毛，分枝较弱，长10~20厘米，穗轴节间无毛，长4~8毫米，每节具短柄和长柄小穗，第一颖先端膜质而渐尖，第二颖舟形，先端渐尖并与边缘同为膜质而具小纤毛，第一外稃披针形，较颖稍短，第二颖外稃披针形，较颖短1/4，先端尖，雄蕊3枚，花柱长而羽毛状，颖果离生。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于荒山草地及村落附近。</p> <p>药用部分：根、花入药，夏秋采收。</p> <p>用途：根性味甘，淡。能通窍利水，破血通经；主治跌打损伤，筋骨风痛，妇人闭经，水肿虫胀。花能止血；治络血，呕血，衄血，创伤出血。</p> <p>用量：5钱~2两。</p>
681	斑杖	五三	<p>天南星科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达70厘米。球茎扁球状，上生须根，茎圆柱形，有紫褐色斑点，全体秃净无毛。叶2枚，互生状，掌状复叶，3歧状，小叶7~15枚，中央小叶较大，椭圆形，长约12厘米，宽约3~4厘米，基部楔形或钝，先端锐尖，全缘或有疏锯齿，表面深绿色，背面淡绿白色，叶脉在表面稍凹陷，侧脉在近叶缘处相联结。花单性异株，黄白色，肉穗花序顶生，佛焰苞紫褐色，有纵形白纹，苞片上部弯平，肉穗花序上端呈棒状。浆果聚生成圆柱状的果穗，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部各省；多生于沟谷林下阴湿处或溪边丛林下。</p> <p>药用部分：球茎入药，秋冬采收。</p> <p>用途：同天南星。</p>
682	斑叶兰	小叶青，蕲蛇药，滴水珠。	<p>兰科</p> <p>植物形态：多年生小草本，高达25厘米。地下根茎绿白色肉质，根呈纤维状，密生灰白色根毛，茎直立，圆柱形，肉质，表面绿白色，密生绵</p>

			<p>毛，基部青绿色。叶互生，稍肥厚，下部叶多平贴地表，狭卵形至卵形，长2~4厘米，宽1~2.5厘米，全缘，基部渐狭或呈阔楔形，先端锐尖，叶柄呈鞘状，叶表面暗绿色有显著黄白色斑纹，上部的叶退化呈膜质鞘状苞叶。花白色或淡红色，为偏侧性扭捩穗状花序，有花5~10朵，外轮花被的外面有毛茸，唇瓣下部陷入。先端外曲，内有茸毛，子房下位，1室。蒴果绿灰色，倒卵形或圆柱形，表面密生绵毛。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于常绿阔叶树林以及杉木林下的阴湿枯枝落叶层上。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：清凉解毒，消炎退肿。主治毒蛇咬伤，痈肿疮疖，咳嗽，气管炎等症。</p>
683	博落回	叭拉筒，号桐梗，通大海，泡通珠，边天蒿，通天大黃。	<p>罂粟科</p> <p>植物形态：直立多年生亚灌木状大形草本，高达2.5米。根茎粗大，黄棕色。茎圆柱形，中空，折断后流出黄色汁液，外表为绿色或稍带紫色，被白粉。叶互生，广卵形，一般长15~30厘米，宽12~25厘米，最大的叶长达35厘米，宽30厘米，基部稍为心脏形，先端钝，边缘为不整齐的5~9掌状浅裂，叶面光滑无毛，叶背被白粉，两面有疏毛或近于光滑，叶柄长5~12厘米，上面成浅槽，背面呈半圆形。花淡红色，顶生圆锥花序，花被2枚，花开后即脱落，雄蕊约30枚，子房上位，柱头2裂。蒴果狭长椭圆形，扁平，熟后红色，表面带白粉。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡灌丛边，尤以砍伐后的林地或新开辟的公路边为最多。</p> <p>药用部分：根、茎、叶入药，夏秋采收。（有毒植物）</p> <p>通途：性味辛、涩、寒，有大毒。又有说苦、辛，有毒。能祛风解毒，行气消肿。治蛊毒，消癭瘤，疗白瘡风及一切恶疮。并杀虫，可作农药。用量：2~3钱，捣烂外敷，不可内服。</p>
684	酢浆草	老雅松，酸味草，酸浆草，黃花酢浆草，三叶酸，斑鳩酸。	<p>酢浆草科</p> <p>植物形态：一年生草本，平铺多枝的草本，被有疏生毛，茎匍匐状，长达50厘米，常成片生长。叶互生，掌状复叶，小叶3枚，叶柄长2.5~5厘米，托叶与叶柄连生，形小，小叶倒心脏形无柄，长达5~10毫米。花黄色，1至数朵，腋生伞形花序，萼5片，花瓣5片，雄蕊10枚，花丝下部连合，子房上位，5室。蒴果圆柱状，熟时裂开而将种子弹出。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于村落、城镇园庭湿地，山坡草地或溪边草地中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味酸、涩、寒，无毒。能去湿解热，散瘀解毒，杀虫，生津利尿；治跌打损伤、淋病、赤白带下、疥癬、烫火伤、蛇咬伤，小儿疳疾、流感、过敏性皮炎、痢疾等。用量：5钱~1两。孕妇忌用。</p>
685	紫花酢浆草	铜锤草，紫酢浆草，红花酢浆草。	<p>酢浆草科</p> <p>植物形态：多年生直立无茎草本。地下部有多数白色的小鳞茎，鳞片褐色，具3纵棱。叶根生，掌状复叶，叶柄长10~20厘米，被毛，小叶3枚，阔倒心脏形，长1~3厘米，宽甚于长，背面有红黑色小腺点，并被疏毛。花淡紫红色顶生伞形花序或常不规则的2或3分枝，每枝有1~2个伞形花序，花萼、花瓣均5片，萼片顶端有2个红色长形的小腺体，雄蕊10枚，花丝连合，子房上位，5室。蒴果圆柱形。</p> <p>生态分布：我国南部有分布。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味酸、寒，无毒。能散瘀血。治跌打损伤，妇女白带，砂淋，脱肛及痔疮等症。用量：3钱~1两钝肉或泡酒服。孕妇忌服。</p>
686	紫草	紫根，紫丹，紫草根子。	<p>紫草科</p> <p>植物形态：多年生草本，根肥大，常下部分枝，直生或斜生。茎直立，通常仅上部分枝，高达60厘米，全体密被白色刚毛。叶互生，无柄，广披针形或狭披针形，长5~8厘米，宽1~2厘米，基部楔形，先端尖，全缘或波状缘，边缘有白色刚毛，两面粗糙均呈暗灰绿色，密被刚毛。花白色，顶生卷旋状总状花序，苞叶披针形，萼5深裂，宿存，花冠高碟状，上端辐射状，5裂，喉部有5片短小鳞片，雄蕊5枚，子房上位，2室。小</p>

			<p>坚果4枚。</p> <p>生态分布：产我国东北、华北、至中部各省；多生于山坡草地及路边草丛中。</p> <p>药用部分：根供药用，春秋采收。</p> <p>用途：性味甘、微苦、酸，寒。为清热凉血，能凉血活血，解毒利大肠。外用治火伤、冻伤、刀伤、湿疹等；内服为通大便及利尿药。用量：1~3钱。</p>
687	紫堇	断肠草，裂苞紫堇。	<p>紫堇科，罂粟科。</p> <p>植物形态：冬季一年生或多年生草本，全体有恶臭味，高达60厘米，柔嫩多汁。根块状，具多数须根，茎淡绿色有棱。叶互生，具长柄，基部鞘状，叶片为3出2回羽状分裂，裂片长圆形，复作羽状深裂，小裂片先端多缺刻，有时背面带紫红色。花红紫色，顶生总状花序，萼片2枚，细小不明显，花瓣4片，外2片大小不等，前一片平展，后一片基部延长成距状，雄蕊6枚，两体，子房上位，1室。蒴果长椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡草地，沟谷灌丛边，或水沟边，村落、城镇附近常见。</p> <p>药用部分：根部、叶、花入药，春夏采收。</p> <p>用途：性味苦、涩、寒，有毒。不宜内服。能杀虫，洗疮毒，搽痢子，治毒蛇咬伤。外用分量不拘。</p>
688	紫苏	赤苏，桂荏。	<p>唇形科</p> <p>植物形态：一年生直立草本，茎高0.3~1米，紫色或绿紫色，有紫色或白色细节毛，在茎节部较密，全体有芳香。叶对生，卵形或圆卵形，基部近截形，先端长尖或突尖，边缘具圆锯齿，两面紫色，或表面绿色，背面紫色，两面无稀毛。下面具油腺点。花红色或淡红色，唇形，顶生总状花序，花萼钟形，具10枚，5裂，花冠管状，唇形，5裂，雄蕊4枚，子房上位，4裂，花柱出自子房基部。小坚果4枚。</p> <p>生态分布：产我国长江流域南部各省。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。叶能发散风寒，理气宽胸，解郁化痰，安胎，解蟹毒。梗长于理气，解郁安胎。子降气平喘，祛痰止咳，温中开郁。治伤风感冒，喘咳，鱼蟹中毒，肠鸣腹胀，呕吐等。用量：子1.5~3钱；全草3~5钱；茎叶2~4钱；叶研末1钱冲服。凡气虚表虚者忌用。</p>
689	紫茎	帽兰	<p>山茶科</p> <p>植物形态：落叶小乔木。树皮棕色或紫红色，小枝有毛或光滑。叶互生，常聚生于小枝顶端，革质，椭圆状卵形至长椭圆形，长5~10厘米，宽2~3厘米，基部狭楔形，少有圆形，先端渐尖，边缘疏生圆钝齿，有毛或近于光滑，叶柄5~8毫米。花白色，单生于叶腋，萼片5枚，与苞片相似，花冠5瓣，雄蕊多数，花丝基部联合，子房上位，5室。蒴果扁圆形，有5棱。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山地阔叶林中或沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：树皮及根皮入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、辛、凉，无毒。能去寒表汗，疏筋活血；治跌打损伤，风湿麻木。用量：5钱~1两。</p>
690	紫萁	薇，高脚贯众。	<p>紫萁科</p> <p>植物形态：多年生常绿草本，高达80厘米。根茎短粗或成矮树干状而稍弯，密被残存的叶柄。叶两型，丛生根部，叶柄长20~30厘米，禾秆色，幼时密生绒毛，后脱落，叶片为2回羽状复叶，长30~50厘米，宽25~40厘米，复叶的顶部为一回羽状，中、下部为2回羽状，羽片3~5对，对生，长圆形，基部一对稍大，具小柄，小叶5~9对，对生或近于对生，无柄，长椭圆形或长椭圆状披针形，基部稍宽，圆形或近截形，先端稍钝或急尖，上部小叶较小，顶生羽片同形。孢子叶与营养叶的高度相等或稍高，深棕色，无叶绿素，羽片和小叶均缩短，小叶线形，长1.5~2厘米，背面沿中脉两侧密生孢子囊群。孢子囊球形，有柄，边缘着生，由顶端纵裂，孢子呈球形四面体。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡林边，沟谷灌丛边，或荒山草地中。</p> <p>药用部分：根茎入药，全年可采。</p>

			用途：性味苦、微寒，有小毒。能消肿胀，通大便。用量：2~3钱。
691	紫藤	轿藤，朱藤，豆藤，招豆藤，藤萝，黄纤藤。	豆科 植物形态：落叶高大木质藤本。茎灰褐色，缠绕性，长达10米。叶互生，奇数羽状复叶；小叶7~13枚，对生或近于对生，卵状披针形或长椭圆状披针形，长4~7厘米，幼时密生平贴细毛，后无毛。花蝶形，先叶开放，兰紫色，稍有芳香，顶生下垂总状花序，萼钟形，5裂，旗瓣大，外反，基部有2个附属体，雄蕊10枚，两体，子房有柄。荚果线形，稍扁，密生绒毛。 生态分布：产我国中部及长江流域各省；多生于向阳山坡、溪边、灌木丛或荒山草地中。 药用部分：茎皮、花、种子入药，春夏秋采收。 用途：性味甘、温，有小毒。能下水，治瘾病。此外种子炒熟放酒中，可使酒不坏。
692	紫薇	狗骨头，紫金标，满堂红，百日红。	千屈菜科，紫薇科。 植物形态：落叶小乔木或灌木，高2~7米。枝干弯曲，小枝幼时呈4棱，树皮光滑，褐色或棕色。叶对生或近于对生，倒卵形，椭圆形至长椭圆形，长5~7厘米，宽1.3~3厘米，基部楔形，近于无柄，先端圆而微凸，全缘，沿中脉两侧具细柔毛。花紫色或白色，顶生圆锥花序，萼钟形，6裂；花瓣6枚，边缘皱曲，基部成爪，雄蕊多数，子房上位，6室。蒴果椭圆状球形，室背开裂。 生态分布：产我国黄河流域至南部各省；多生于荒山草地，山坡林边。村落城镇中也有栽培。 药用部分：根、叶、花入药，夏秋采收。 用途：性味微苦、涩，无毒。一说甘、平，无毒。能消风清热，消肿、活血止痛，安胎，解毒，利尿。治发背，乳痈、头部疖肿。
693	紫珠	起风紫，山指甲。	马鞭草科 植物形态：落叶灌木，高达2米，小枝有粗糠状短柔毛。叶对生，椭圆形或倒卵形，长3~8厘米，基部楔形，先端渐尖，除近于基部及先端外，边缘为粗锯齿，表面绿色，背面有腺而淡绿色，叶柄长2~4毫米，花水红色，腋生聚伞花序，萼钟状，4裂，花冠短筒状，4裂，雄蕊4枚，子房上位，4室。核果球形，紫色。 生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡林边，溪边丛林中，以及砍伐迹地。 药用部分：根、茎、叶入药，夏秋采收。 用途：性味平、微涩。能散瘀，止血；治创伤出血衄血，咯血，肠胃出血，妇女血崩等症。用量：1~3钱。
694	紫楠	大叶紫楠，紫金楠，金心楠，金丝楠，枇杷木。	樟科 植物形态：常绿乔木，高达16厘米。树皮灰色，光滑，小枝黑褐色，幼枝密被棕褐色茸毛。叶互生，革质，倒披针形或倒卵形，长8~24厘米，宽3.5~9厘米，基部楔形，先端短尾尖，偶为渐尖，全缘，表面绿色，幼时脉上有短毛，后渐脱落变光滑，背面灰绿色，脉上密被棕色细毛，侧脉羽状，主、侧脉及网脉在下面显明隆起，叶柄圆柱形，长5~20毫米，密生棕褐色短毛。花灰黄色，腋生圆锥花序，花被6裂，雄蕊9枚，花药4室，成3轮排列，外面2轮花药内向，第3轮雄蕊基部各有2个腺体，花药外向，第四轮为不育雄蕊，子房近球形，上位，1室。核果卵形，熟时呈紫色，基部为宿存的杯状花被筒所包被，果柄有绒毛。 生态分布：产我国长江中下游各省；多生于较阴湿的山谷常绿阔叶林中。 药用部分：叶、根入药，全年可采。 用途：性味辛，微温。能暖胃顺气。
695	紫弹树	朴树，中筋树，沙楠子树，香丁。	榆科 植物形态：落叶乔木或灌木，高达14米，嫩枝有赤褐色细软毛。叶互生，卵圆形至卵状长椭圆形，长5~10厘米，宽2~4厘米，先端渐尖，或成尾状，基部广楔形或圆形，两边不相等，全缘或仅中部具锯齿，表面黄绿色，幼时常被软毛，后脱落，背面网脉平或下陷，较为显著，脉上有毛，叶柄长3~8毫米，上具细软毛。花杂性，绿色，腋生聚伞花序或单生，花被4片，雄蕊4枚，子房上位，1室，花柱2裂。核果椭圆状球形，熟后呈橙黄色。 生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡疏林中，或沟谷丛林中。

			<p>药用部分：叶、根皮、茎、枝入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、寒。能清热解毒，祛痰，利小便；治小儿解颅。</p>
696	紫云英	米筛花草，红花草,红花菜,花草，花菜。	<p>豆科</p> <p>植物形态：一年生草本，高达30厘米。茎下部分枝呈匍匐状。叶互生，奇数羽状复叶，长10~16厘米，托叶卵圆形，顶端狭尖，小叶通常9~11片，倒卵形或椭圆形，长7~15毫米，宽4~10毫米；基部楔形，顶端凹或微缺，有时为圆形，初时两面被白色粗毛，后近背面有毛，叶脉不明显，全缘，薄膜质。花蝶形，紫色或黄白色，常5~9朵集生成腋生头状花序，花萼钟形，5裂，旗瓣卵形，顶端圆或微缺；雄蕊10枚，2体，子房上位，1室，具短柄。荚果线状长椭圆形，呈肿胀状，成熟时黑色。</p> <p>生态分布：产我国中部至南部各省。</p> <p>药用部分：全草及种子入药，夏秋采收。</p> <p>用途：全草性味辛，平；亦说甘、苦、温，无毒。能祛风明目，解热利尿。治淋病，疥癣及各种疮疡。用量：3~4钱。</p>
697	紫阳花	牡丹三七，草绣球。	<p>虎耳草科</p> <p>植物形态：多年生亚灌木状草本，高达60厘米。根茎粗大，呈不规则块状，横走，淡黄褐色，周围密生纤维状须根。茎直立，不分枝，幼茎上散生白色短柔毛。叶互生或近对生，长椭圆形或倒卵状长椭圆形，长8~15厘米，宽2.5~7.5厘米，基部楔形或宽楔形，并下延成叶柄，顶端渐尖或骤尖，表面淡绿色，散生白色硬毛，毛的基部稍膨大，贴生，背面淡绿色，仅脉上疏生硬毛，边缘具较整齐的粗齿牙，齿端不具短凸头，侧脉8~10对，于两面均稍隆起，茎下部叶柄长2~3.5厘米，上部渐短或几无柄。花白色或淡红色，顶生伞房花序，花序周围不孕花较显著，常由2片或3片花瓣状萼片组成；单性花萼及花瓣均4~5数，雄蕊约15枚，子房下位，3室。蒴果近球形。</p> <p>生态分布：产我国中部，多生于山谷林阴下，岩石边或山坡草地。</p> <p>药用部分：根茎入药，夏秋采收。</p> <p>用途：用于跌打损伤。</p>
698	紫茉莉	洋天麻，胭脂花。	<p>紫茉莉科</p> <p>植物形态：一年生直立草本，多分枝，高达1米。叶对生，卵形，长4~10厘米，基部截头状或心形，先端长尖，边缘全缘或波状。花白色、红色或黄色，萼状总苞内有花1朵，萼花瓣状，萼管圆柱形，上部稍扩大成漏斗形，5裂；花瓣缺，雄蕊5枚，子房上位，1室。果革质不开裂，卵圆形，黑色，有细棱沟。</p> <p>生态分布：我国各地有栽植。</p> <p>药用部分：根、叶、茎入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：根性味淡、平、无毒。清热解毒，利尿祛湿，活血，治跌打损伤，白带，糖尿病等。鲜叶榨汁治创伤，煎汤治疮毒。用量：根5钱~1两。外用适量。</p>
699	紫金牛	矮脚樟，金牛草，矮脚茶，茶果，小青，平地木，叶底红。	<p>紫金牛科</p> <p>植物形态：常绿小灌木，高达20厘米，地下茎横走。叶聚集于茎稍，互生，椭圆形，基部楔形，先端锐尖，表面绿色有光泽，除叶之中肋具有短小之柔毛外，均平滑无毛，叶柄长0.5~1厘米，有短柔毛，花白色，腋生总状花序，生于茎稍或为圆锥花丛，萼5裂，花冠辐状，5裂，雄蕊5枚，子房上位，1室。核果球形，熟时红色，萼及花柱宿存。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于阔叶树林下或沟谷丛林下；南昌西山山脉及望城岗极常见。</p> <p>药用部分：</p> <p>全株、根或根皮入药，全年可采。</p> <p>用途：性味微苦，平；亦说辛，温。活血，止痛，解毒，祛痰，除湿，消肿。治关节炎，跌打损伤，月经不调，肝炎，咯血。用量：全株5钱~1两。</p>
700	紫花前胡	前胡，早前胡，土当归。	<p>伞形科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达2米，根粗大，纺锤形，有支根数个，茎圆形，上部叉状分枝，基部节上及花序上有毛。叶互生，根生叶和茎生叶均有柄，叶柄长10~20厘米，基部扩大呈鞘状而包茎，叶片1~2回羽状分裂，下部一回裂片具小叶柄，小叶柄的边缘呈翅状延长，裂片再分3裂，最后裂片椭圆形至长圆状披针形或倒卵状椭圆行。长5~13厘米，宽2.5~5.</p>

				<p>5厘米。先端尖边缘锯齿，茎上部叶片逐渐简化而成广阔膨大的紫色叶鞘。花紫色，顶生复伞形花序，萼、花瓣均5片，雄蕊5枚，子房下位，2室。双悬果圆卵形至卵状长圆形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡，林野，草地或荒山草地中。</p> <p>药用部分：根入药，秋季采收。</p> <p>用途：本品与白花前胡药用相似。性味苦、辛，微寒。能散风热，降气，祛痰，止痛，止咳；为祛痰，镇痛，止咳剂；为祛痰，镇痛，止咳剂；治青竹蛇咬伤用量：1钱5分~3钱。</p>
701	紫花曼陀罗	洋金花，闹洋花，曼陀罗。	茄科	<p>植物形态：一年生草本，高1~2米。多分枝，茎及枝带淡紫色。叶互生，在枝上端者近于互生，叶柄带紫色，长10厘米左右，叶为卵形或椭圆状卵形，长9~17厘米，基部歪斜，先端渐尖或钝尖，两侧不相等，边缘有不规则的波状分裂，裂片端尖，表面绿色，背面淡绿色，主脉下部带紫色。花淡紫色，单生于叶腋或分枝处，花萼漏斗状，顶端5裂，花冠也呈漏斗状，顶端5裂，边缘有5尖锐的突起，呈尖丝状，雄蕊5枚，子房上位，2室。蒴果卵圆形，表面有针刺，深褐色，成熟时上端成4瓣裂。</p> <p>生态分布：我国长江流域各省有分布；多生于村落、城镇附近矿地上。</p> <p>药用部分：叶、花、种子入药，夏秋采集花晒干入药。</p> <p>用途：性味辛、温，有毒。能祛风湿，止喘定痛。主治惊痫急寒哮，煎汤洗治诸风顽痹及寒湿脚气。叶和种子为麻醉性镇咳、镇痛剂；花瓣的镇静镇痛作用尤著，可治神经痛。有剧毒，用时宜慎。用量：1~5分；种子3~5分；外用酌量。</p>
702	鹅掌柴	七加皮，七叶莲，汉桃叶，鹅掌藤。	五加科	<p>植物形态：常绿蔓状灌木，高达3米，茎圆筒形，有纵条纹。叶互生，掌状复叶，小叶5~7枚，小叶长椭圆形，长9~16厘米，宽2.5~4厘米，两端钝，全缘，总叶柄长达20厘米。花青白色，伞形花序，排成顶生总状，花萼、花瓣、雄蕊常5~6枚，子房下位，6室。浆果球形，黄红色。</p> <p>生态分布：产我国东南部各省；多生于沟谷常绿阔叶树林中。</p> <p>药用部分：根、茎、叶入药，全年可采收。</p> <p>用途：性味苦、甘，温。能舒筋活络，消肿止痛。主治风湿骨痛，跌打损伤。用量：2~3钱；外用鲜叶捣烂敷患处。</p>
703	鹅掌楸	马褂木	木兰科	<p>植物形态：落叶乔木，高达15米。树皮黑褐色，纵裂，小枝灰色，具细小圆形皮孔。叶互生，呈马褂状，长4~18厘米，宽5~20厘米，基部圆形或浅心形，平截或微凹，两侧边缘中部凹入形成2裂片，裂片先端尖或钝尖，两面绿色，均无毛，侧脉羽状，并有细网脉，叶柄细长圆形，长4~8厘米。花黄白色，单生于枝顶，萼片3片，开展，花瓣6片，直立，雄蕊多数，雌蕊心皮多数，分离，复瓦状密生于纺锤形的花托上。聚合果黄褐色，呈卵状长圆锥形，每1成熟心皮具狭长的翅。</p> <p>生态分布：特产江西庐山，四川、湖北、浙江也有分布；多生于山谷杂木林内，或向阴山坡水沟边。</p> <p>药用部分：树皮入药，夏秋可采。</p> <p>用途：祛水湿风寒。</p>
704	鹅掌金星	三叉剑，双凤尾草，三角风，七星丹，金鸡脚。	水龙骨科	<p>植物形态：多年生常绿草本，高10~25厘米。根茎细长横走，密被鳞片，鳞片线状披针形，基部盾形，淡棕色，膜质，根茎发达，须根周围的小根密生。叶根生，常为1~3叶，叶柄长4~17厘米，黄色，无毛，叶全缘或2~3裂，少数5裂，长6~10厘米，基部圆形或稍下延，裂片线状披针形，长5~9厘米，宽1.5~2厘米，先端渐尖，表面绿色，背面浅绿色，有主脉一条，侧脉近对生，约20~30对，直达叶缘，形成菱形网脉，每对侧脉间有缺刻1枚。孢子囊群圆形，单行，着生于稍近中脉处。</p> <p>生态分布：产我国西南、中南、华中及陕西南部等地；多生长于丘陵山地、山坡灌丛边，或生长于岩石积土上。</p> <p>药用部分：全草药用，全年均可采用。</p> <p>用途：性味辛、淡、平，无毒。能除湿利尿。治小儿慢惊风、咳嗽、吐乳、痈肿、结核，冷骨风，筋骨疼痛等症。用量：2~3钱。</p>
705	鹅不食草	胡椒草，地胡椒，	菊科	<p>植物形态：一年生小草本，高5~20厘米。茎纤细，基部匍匐，无毛或略</p>

		疟疾草，球子草， 石胡荽。		<p>具细绵毛。叶互生，倒卵状椭圆形，长7~20毫米，基部楔形，先端钝，仅上部边缘有锯齿，无毛，有时背面稍有细毛，无柄。花黄色，为细小的头状花序，扁球形，单生于叶腋，直径约3毫米，花序轴甚短，总苞半球形，苞片2轮，椭圆状披针形，绿色，边缘革质，外苞片较内苞片大；花全部管状，外围有多层雌花；中央为两性花。瘦果椭圆形，具4棱，棱边有长毛，无冠毛。</p> <p>生态分布：产我国长江下游至海南岛；多生于田园，沟边湿地以及庭院中。</p> <p>药用部分：5~6月采集全草入药。</p> <p>用途：性味辛、温，气香，无毒。能痛关窍，除风湿，散瘀消肿，活血解毒。治中风窍闭，风湿麻木，筋骨疼痛，感冒咳嗽，鼻炎，百日咳，跌打损伤，蛇伤，疖疮等。用量：1~2钱；鲜用3~5钱。</p>
706	葱	香葱，四季葱。	石蒜科，百合科。	<p>植物形态：多年生丛生草本，有香气，鳞茎细长，圆柱状，白色膜质。叶5~6枚，近根生，圆筒形，长20~30厘米，直径0.4~0.8厘米，直立，中空，先端尖，中部膨大，具白绿色霜粉，含粘液。花白色，伞形花序密集成球形，初时包以白色膜质囊状苞片，生于花茎顶端，中空，花被6片，雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果球形。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：全株或鳞茎（葱白）入药，全年可采。</p> <p>用途：性味辛、平、温，无毒。治伤寒中风，面目浮肿，除风湿，身痛麻痹，虫积心痛，通乳汁。外用跌打伤肿，清除脓汁，催生肉芽，断指再植。用量：全草3~7株，作煎剂或捣汁饮。</p>
707	韭菜	起阳草，扁菜。	石蒜科，百合科。	<p>植物形态：多年生草本，鳞茎圆柱形，1~3个聚生，鳞被灰色。叶扁平，线形，绿色，肉质，长约15~30厘米，宽2~4毫米。花白色或带粉红晕，20~40朵，伞形花序生于花茎顶端，有苞叶1~2枚，花茎细长有棱，高达50厘米，花被6片，雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果倒心脏形，室背开裂。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：种子、鳞茎及叶入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：种子性味辛，甘。为兴奋、强壮、健胃药，能补肝肾，暖腰膝；治小便频数，遗尿，遗精，带浊等症。用量：种子1.5~3钱。凡阴虚心火旺者忌用。</p>
708	萱草	黄花菜，金针菜。	百合科	<p>植物形态：多年生草本，高可达1.2米，地下有肉质块根。叶基生，狭线形，长80~100厘米，宽约2厘米，先端尖，全缘，两面无毛，有多数平行脉。花橙红色，顶生圆锥花序，花被6片合生成漏斗状，雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果三角形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山地沟谷或溪边湿地。</p> <p>药用部分：根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性甘、凉，无毒。能消食，利湿热，明目，安胎，消肿散毒，解热止咳。据称对血吸虫病有显著疗效，但有副作用。用量：5钱~1两。</p>
709	律草	割人藤，老虎藤， 勒草，拉拉藤。	大麻科，桑科。	<p>植物形态：多年生草本，长达4米余。茎有棱线，生细柔毛，棱上生有2叉小钩刺。叶对生，掌状3~7深裂，裂片约长6~12厘米，宽5~8厘米，卵形至卵状披针形，基部心脏形，先端急尖或渐尖，边缘具齿牙或重齿牙，表面粗糙，疏生刚毛，背面疏生黄色腺点，脉上有刚毛。花单性异株，雄花为顶生或腋生圆锥花序下垂，花被5片，雄蕊5枚，雌花序穗状，生于叶腋，花被1片，鳞状，抱着子房，子房上位，1室。瘦果略扁形，集生成球状的果穗。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于村落、城镇附近灌丛中及围篱边。</p> <p>药用部分：果实、茎、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、苦，寒。果实为健胃剂，有利尿，止水痢，消癰疮及凉血作用；又治蛇、蝎伤。茎、叶除疟虚热渴，治血尿，蛇、蝎咬伤。用量：全草3~6钱。</p>
710	茼蒿	艾蒿。	菊科	<p>植物形态：多年生灌木状草本，高达2米。茎直立有沟棱，密被白色绵毛。叶互生，3回羽状裂，长3~8厘米，基部楔形，有短柄，先端锐尖，表面</p>

				<p>绿色，散生白色小腺点，背面有灰白色绒毛。花黄褐色，顶生头状花序排成总状圆锥花丛，总苞密被灰白色绒毛，苞片4~5裂，花全为管状。瘦果长圆形，无冠毛。</p> <p>生态分布：产我国中部各省；多生于山坡林边、灌丛边、荒山草地中，村落附近荒地均有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：发汗透表，辟疫杀虫。</p>
711	扁蓄	粉节草，边血草， 鸟蓼。	蓼科	<p>植物形态：伏地一年生草本，高约40厘米。茎平卧或向上倾斜，多分枝，有沟纹，基部圆柱形，幼枝有棱角。叶互生，椭圆形至椭圆状披针形，长1~3.5厘米，宽6~10毫米，基部楔形，先端钝或锐尖，全缘，表面深绿色，背面淡绿色，两面无毛；叶柄极短，叶鞘2裂，下部绿色，抱茎，上面透明，先端多裂。花绿色，丛生于叶腋，花被5深裂，雄蕊8枚，子房上位，2室，有3棱。瘦果三角状卵形，黑色，表面有细纹及小点。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于水边、路旁、荒草及沙滩上。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、平，无毒；一说甘，涩。利小便，清热，祛湿，止泻，驱虫。治黄疸，霍乱，腹痛，下痢，蛔虫，疥疮疽痔，热淋涩痛，产后瘀痛，下疳等。用量：1~3钱。</p>
712	葡萄	菩提子。	葡萄科	<p>植物形态：落叶木质藤本，枝条粗壮，幼枝光滑或具柔毛，有卷须。叶互生，近圆形或卵圆形，长10~20厘米，常3~5深裂，基部心脏形，边缘具粗锯齿，两面平滑无毛或背面稍有柔毛，叶柄长4~10厘米。花黄绿色，杂性，圆锥花序着生于新梢上与叶对生，花萼5片，花冠5瓣，顶部略接合，不展开而作帽状脱落，雄蕊5枚，着生于花盘上，子房上位，2室。浆果球形或椭圆形，熟时紫红色或绿色，被有粉霜。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：根、藤、果入药，鲜用或干用，秋季采收。</p> <p>用途：根性味甘、苦、寒，无毒；能除风湿，消胀，利水；治瘫痪麻木，吐血，口渴。果性味甘，平；能逐水利小便；治湿痹，热淋涩痛；制酒饮，益气强壮。根及藤能止呕，安胎；治妊娠恶阻。用量：果3~5钱。无寒湿及体弱者忌用。</p>
713	葡萄	谷皮叶，纸皮，藤 纸皮，尖叶楮皮， 小构树，女谷。	桑科	<p>植物形态：落叶灌木，高可达3米。枝条细长，有时常带蔓状，小枝细长疏生，略呈“之”字形，幼时有短柔毛，不久即变光滑，呈暗紫色。叶互生，卵状椭圆形或卵状批针形，长4~9厘米，宽3~5厘米。基部偏斜，圆形或稍呈心脏性，先端长尖，具2~3个乳头状腺体，三出羽状脉，边缘有锯齿，不裂或深裂。表面绿色，具粗糙伏毛，背面淡绿色，有细毛，叶柄长7~12毫米。花绿色，单性同株，雄花序茅荑状，近椭圆形，生于新枝叶腋，萼4裂，雄蕊4枚，雌花生新枝上部叶腋，成球形头状花序，花萼管状，3~4齿，子房上位，有柄。复果球形，红色。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于山坡和沟谷丛林或岩石边。</p> <p>药用部分：根、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：能清凉解毒，治跌打损伤，腰痛。</p>
714	葛薤	割谷镰藤，野葡萄， 薤荒。	葡萄科	<p>植物形态：落叶攀缘木质藤本，有卷须，小叶与叶柄幼时均被灰褐色绒毛。叶互生，阔卵形或三角状卵形，有时具不明显3裂，长4~10厘米，宽4~9厘米，基部截形或浅心形，先端渐尖，边缘具不整齐粗大锯齿，表面有光泽，背面脉上初被丝状绵毛，后仅基部及脉腋有短柔毛与毛丛，叶柄长1~5.5厘米。花淡黄绿色，单性异株，圆锥花序与叶对生，长4~8厘米。萼片、花瓣均5片，花瓣顶端粘合，下部分离，雄蕊5枚，有退化雌蕊；雌花子房上位，2室，退化雄蕊5枚。浆果球形。熟时兰黑色。</p> <p>生态分布：产我国黄河流域至南部各省；多生于山坡林边、路边、河畔灌丛中。村落附近常有生长。</p> <p>药用部分：根、茎和果实供药用；夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、平。作强壮剂，能补五脏，续筋骨，长肌肉，果实可食，并造果酒。</p>

715	葛	葛藤	豆科	<p>植物形态：落叶多年生草质藤本，长达10米。块根粗大，肥厚，茎坚韧富纤维，有棕褐色长硬毛。叶互生，有长柄，具棕色毛，托叶盾状，小叶3片，有短柄，基部有线状披针小托叶2枚，顶生小叶菱形或菱状广卵形，长10~15厘米，宽8~12厘米，基部圆形或钝，先端渐尖或突尖，表面绿色，有棕褐色平贴长硬毛，背面灰绿色，有白粉，密生灰白色平贴长硬毛，侧生小叶斜广卵形，两边不对称，一侧或两侧有1~2浅裂。花蓝紫或紫色，蝶形，腋生总状花序，萼4裂，旗瓣一般圆形，顶端微凹，雄蕊10枚，2体，雌蕊1枚，花柱弯曲。荚果扁平，密生黄色粗硬长毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡，丛林边，公路边，溪谷边，梯田边草丛或灌丛中。</p> <p>药用部分：块根、花、叶及茎的髓部中寄生的“葛藤虫”，或根捣取淀粉称“葛粉”均入药，夏秋季采收。</p> <p>用途：葛根性味辛、甘、平；能解表退热，生津止渴，止泻痢，透疹。葛花性味甘、平、无毒。能退热，解酒，治大醉酒毒和慢性酒精中毒，肠风下血。葛粉能止泻止吐，开胃下食，解酒毒及巴豆毒。用量：根1~2钱，葛花8分~2钱。</p>
716	葫芦	蒲芦，扁蒲，蒲子，瓠，壶芦。	葫芦科	<p>植物形态：一年生蔓生草本。茎粗壮，具软粘毛，卷须分枝。叶互生，叶柄长5~30厘米，顶端具腺齿2枚，叶片心形，卵形至肾状卵形，径15~40厘米，不分裂，或五角形浅裂，基部宽心脏形，边缘有尖齿牙，两面均被毛。花白色，单性同株，单生叶腋，夕开早萎；雄花具长柄，雌花具短柄，萼筒漏斗状，5裂，花瓣5片；雄花雄蕊3枚，药结合，雌花子房下位，1室。瓜果初时绿色，后变白色或黄色，常带有棕色斑点，形状大小不一。</p> <p>生态分布：我国各地均有栽培。</p> <p>药用部分：果壳、种子入药，立冬前后采收。</p> <p>用途：果壳性味甘淡、平，无毒。能利水，消肿胀，治水肿，口渴，烦热等症。种子用于解热，治肺炎，肠炎等症。果壳用量：3~8钱。</p>
717	葫芦茶	金剑草	豆科	<p>植物形态：落叶亚灌木状草本或灌木，高可达1.5米，直立，分枝，枝三角形，棱角上被粗毛，后变秃净。叶互生，为似葫芦状的单身复叶，顶生叶片卵状长椭圆形，长椭圆形至披针形，长6~12厘米，基部浑圆，先端短尖，表面无毛，背面主脉上被毛，叶柄长1~2厘米，有阔翅，翅宽4~8毫米。顶端有小托叶2枚，托叶大，披针形，长达15毫米，脱落性。花蝶形，淡紫色，顶生或腋生总状花序，萼阔钟形，4裂，雄蕊10枚，两体，子房无柄。荚果长椭圆形，5~8节。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于山坡林边或灌丛边及荒山草地中。</p> <p>药用部分：全草入药，4~10月采收，洗净，鲜用或晒干用。</p> <p>用途：性味微苦、涩、凉，无毒。能清热消炎，祛风解郁，健脾消食，利尿杀虫；治肝炎，支气管炎，肾炎，细菌性痢疾，肠炎，慢性溃疡，钩虫、蛔虫病，感冒，中暑等。用量：3钱~1两。</p>
718	落新妇	金毛三七，阴阳虎。	虎耳草科	<p>植物形态：多年生强壮草本，高可达80厘米。根茎粗大呈块状，横走，表面留有叶柄残茎而呈凹凸不平，并围以深棕黄色长绒毛和褐色膜质鳞片，下生暗褐色须根。茎直立，基部和根出叶柄均密被棕黄色长绒毛，中间杂以腺毛。根生叶3~4回3出复叶或第3回小叶片着生不规则而外形似2~3回羽状复叶；具长柄，长12~20厘米，基部半抱茎，具棕色钻状膜质鳞片状拖托叶，1回叶轴长6~12厘米，2回以上叶轴较短，小叶片卵状，卵状椭圆形也有呈倒卵形的，长2.5~7厘米，宽1.5~5厘米，基部宽楔形或浅心形，先端尖或渐尖，侧叶片基部常偏斜，表面深绿色疏生短刚毛，后渐脱落，背面浅绿色，短刚毛较多，叶脉上尤密，上面凹陷，下面隆起，边缘具不整齐重锯齿，齿端尖锐，厚革质，顶生小叶柄长1~2厘米，侧生小叶柄长不及1厘米，或几无柄，无毛或具极疏生长毛，茎生叶和根出叶相似，惟叶柄较短，基部膜质，钻形，托叶较狭。花淡红色，顶生圆锥花序，密生于花茎的分枝上。萼片常为5裂，花瓣5片，雄蕊10枚，雌蕊2~3枚，分离心皮，子房上位，1室。骨突果2个合生，熟后呈枯黄色。</p>

				<p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡林下阴湿地，林缘路边草丛中也有生长。</p> <p>药用部分：根茎入药，夏秋采收。</p> <p>用途：主治劳动过度，筋骨疼痛，毒蛇咬伤，跌打损伤等症。</p>
719	棠梨	海棠梨，野梨子，土梨，杜梨。	蔷薇科	<p>植物形态：落叶乔木，高达10米。幼枝、叶柄、叶背及花序均有茸毛，后脱落。叶互生，菱形或椭圆状卵形，长5~8厘米，宽2~4厘米，基部广楔形，先端渐尖，边缘锯齿尖锐而粗硬，表面鲜绿色，有光泽，叶柄长3~4厘米。花白色，由8~10朵组成顶生伞形总状花序，花萼5枚，花瓣5枚，雄蕊20~30枚，子房下位，2~3室。梨果球形，褐色有斑点。</p> <p>生态分布：产我国黄河流域至长江流域各省；多生于山坡疏林中或林边。</p> <p>药用部分：树皮、果入药，秋季采果，夏秋采取树皮。</p> <p>用途：果实性味酸、甘、涩、寒，无毒；消食止滑利。枝叶性味同果实，治霍乱，吐泻不止，转筋腹痛，反胃吐食。</p>
720	寒莓	水漂沙，寒刺泡。	蔷薇科	<p>植物形态：常绿蔓性灌木，茎通常卧伏地面，着地生根。高达80厘米。枝上有沟刺并密生短毛。叶互生，圆形或近心脏形，常具3浅裂，先端钝圆，边缘有波状的浅缺刻，并有细齿，表面及背面均有茸毛，叶脉掌状，在基部5出，叶长约6~10厘米，宽与长相等。花白色，3~4朵丛生叶腋，萼片、花瓣均5片，雄蕊多数，雌蕊多数，心皮分离，着生于凸起的花托上。小核果聚生成扁球形聚合果，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡林边，沟谷溪边灌丛中，村落附近常见。</p> <p>药用部分：根及全草入药，全年可采。</p> <p>用途：根性味寒，凉。活血凉血，清热解毒；可治黄疸性肝炎，月经不调，产后发热，小儿高烧，痔疮肛漏等。全草治产后受风，月经不调，四肢疼痛。用量：3~5钱。</p>
721	粟米草	四月飞，鸭脚爪子草。	粟米草科	<p>植物形态：一年生小草本，高达30厘米。茎多叉状分枝，枝纤细有棱，无毛，通常褐绿色。叶近轮生，根生叶倒卵形至长椭圆形，茎生叶披针形或线状披针形，大小不一，长1~3厘米，宽3~7毫米，基部渐狭呈短柄，先端尖，全缘，托叶早落。花黄棕色，腋生聚伞花序，花单被，萼5片，雄蕊3枚，雌蕊1个，子房上位，3室，卵形。蒴果圆形。</p> <p>生态分布：产我国南部至江南各省；多生于山坡草地中，路边，村落、城镇附近草地也有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：治腹痛泻泄，蛇伤。</p>
722	筋骨草	白花夏枯草，青鱼胆，金疮小草，紫背金盘，白头翁，破血丹，散血草，伏地筋骨草，雪地开花。	唇形科	<p>植物形态：多年生草本，茎下部匍匐地上，上部稍直立，全株密被毛茸。叶对生，长椭圆形、卵形或倒披针形，长3~9厘米，宽0.8~2厘米，基部渐狭，先端圆钝或尖，边缘有圆波状钝齿，表面深绿色，背面淡绿色，嫩时常带紫色，有叶柄。花淡紫色或白色，唇形，腋生轮状花序，萼钟形5裂，花冠下唇长约为上唇的2倍，雄蕊4枚，2强，子房上位，2室。小坚果黑色，卵圆形。</p> <p>生态分布：产我国中部或南部各省；多生于山坡林边草地、灌丛边、溪边。村落附近也有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，春夏季采收。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒；一说苦、涩、寒。能止血生肌；治金疮，衄血，血瘀及下血。用量：1~3钱。</p>
723	景天	佛指甲，佛甲草，白花蝎子草，活血三七，绣球石柗丹。	景天科	<p>植物形态：多年生肉质草本。茎圆柱形，直立，高达50厘米，全株被白色粉霜，地下有块状根。叶互生或对生，有短柄，椭圆形至倒卵状楔形，长5~10厘米，边缘有浅波状的钝齿，肉质，叶表常凹平，呈舟状。花绿白色，顶生或腋生伞房状聚伞花序，萼、花瓣均5片，雄蕊10枚，雌蕊5枚，分离，子房上位，各1室。骨突果带红色或粉红色。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡草地、沟谷林边湿地或岩石上。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦，平。可解热止渴，生津止咳。治喉炎，肝热；目赤，去</p>

			目翳，小儿丹毒；外用治痈肿、疔疮、疥癣、痔疮及蚊虫咬伤（种子煎剂涂敷）。
724	景天三七	杂兰，鲜三七，九头三七，土三七，广三七，长生景天。	植物形态：多年生常绿肉质草本，高达50厘米。茎直立，圆柱形，粉白绿色。叶肉质肥厚，互生或近于对生，广卵形或倒披针形，长3.5~7.5厘米，宽1.8~3.5厘米，基部楔形，先端钝圆，上部边缘有锯齿，下部全缘。花黄色，顶生伞房花序，花萼、花瓣均片，雄蕊10枚，心皮5枚，分离，子房上位。骨突果5枚。 生态分布：产我国东北、北部至长江流域各省。 药用部分：根及全草入药，秋季采收。 用途：性味甘、微酸，平。安神补血，止血化瘀。用于金疮出血，内伤出血，小儿丹毒，热狂赤眼，妇人带下，眼生花翳，产后阴脱。花能轻身明目，治妇女漏下赤白。用量：1钱5分~1两。
725	琴叶榕	一种三苗，狗婆极子树，牛奶子树，下奶草，鼠奶子，牛乳树。	植物形态：落叶灌木，高1米许，全体有乳汁。小枝有节，幼时被疏毛。叶互生，稍带革质，变异极大，小提琴状或倒卵形，长4~10厘米，宽不等，基部圆形或阔楔形，先端具尖，全缘，中部常收缩成窄腰带形，两面均无毛或背面脉上有疏毛，背面有突起小点。花单性，细小，隐藏于叶腋内的肉质小卵形花托内，成为“隐头花序”，长约10毫米，平滑无毛。果为瘦果，藏于由隐头花序发育成的“隐花果”或“无花果”内。 生态分布：产我国长江流域以南各省；多生长于河旁，池畔及溪沟边等丛林中。 药用部分：根、叶入药，全年可采。 用途：性味辛、微涩、平，无毒。能祛风湿，解毒，疔疽，通乳汁。用量：3~5钱。
726	裂叶秋海棠	水八角，水蜈蚣，一口血。	植物形态：多年生常绿草本，高可达35厘米，根茎肥大多节，有纤维状细根。叶2~5个基生，叶掌状深裂，裂片5~7枚，基部心脏形，有不整齐的锯齿，全长13~15厘米，宽16~18厘米，叶柄长12~20厘米，托叶膜质，卵圆形。花单性，红色，5~6朵，伞房花序生长于长18~20厘米的花轴顶端，雄花常先开，花被4片，雄蕊多数，雌花花被5片，子房下位，2室，光滑，具不等大小的3翅，最大翅呈三角形，小翅狭长。果为蒴果，具不等大的3翅。 生态分布：产我国长江流域以南各省，多生于阴湿沟谷，河边，山坡林边或灌丛中。 药用部分：根茎入药，秋冬季采收。 用途：性味酸、寒，无毒。能散血止血；治肾病黄肿，蛇咬伤及妇女火疳、热疳等症。用量：3~4钱。
727	葱木	百鸟不宿，老虎卵，鹊不踏，鸟不宿，吻头。	植物形态：落叶灌木或小乔木，高可达10米，茎密生针刺。叶大形，互生，奇数2回羽状复叶，长0.4~1米。叶轴有刺，小叶卵形或阔卵形，长5~10厘米，宽2~7厘米，基部圆形，先端渐尖，边缘稍有锯齿，表面绿色，背面粉绿色，脉上有毛。花白色，顶生复伞形花序，合成为圆锥花丛，萼、花瓣、雄蕊均5数，子房下位，5室。浆果球形，熟时黑色。 生态分布：产我国中部至长江流域；多生于山坡林边，沟谷灌丛中。 药用部分：根皮及根入药，夏秋采集。 用途：根皮性味辛、平，有小毒；根性味甘、淡、平。能祛风除湿，健胃，利尿，散瘀，止痛；治肾炎水肿，淋巴结肿大，跌打损伤，急性肝炎，痛风。孕妇忌服。用量：根皮1~2两，根5钱~1两。
728	椴树	大叶韧皮树，毛枝椴。	植物形态：落叶乔木，高达20米，幼枝密生灰白色短柔毛。叶互生，卵形或卵状椭圆形，长6~12厘米，宽5~11厘米，基部偏斜，心脏形，先端渐尖，两边不对称，边缘疏生微细的齿牙，表面深绿色，背面密生棕色星状毛，叶柄长3~5厘米，有短柔毛。花黄绿色，腋生伞形花序，总梗生长于狭长叶状苞片上；萼5片，花瓣5片，雄蕊多数，子房上位，5室。果为小坚果状，球形，表面有疣瘤，内含种子1~3枚。 生态分布：产我国长江流域各省；多生于海拔800米以上的阔叶树林中。

			药用部分：根入药，夏秋采收。 用途：治跌打损伤。
729	榆树	麻果对，钱榆，春榆。	榆科 植物形态：落叶乔木，高达15米。树皮粗糙，有纵沟裂，枝条广展。叶互生，托叶阔，基部常作半心形，叶卵形或卵状披针形，长2~8厘米，宽2~2.5厘米，基部楔形或圆形，两边约略相等，先端锐尖或渐尖，表面深绿色，背面幼时有短毛，边缘有锯齿。花黄绿色，春初先叶开放，丛生叶腋，花被与雄蕊均5数，子房上位。翅果倒卵形或近圆形，先端有缺陷，种子位于中央而近缺陷之底缘密接处。 生态分布：产我国北部至长江流域一带，多生于河边低湿处，村落城镇附近也有生长。 药用部分：春季采树皮，秋季采根入药。 用途：性味甘、涩、平。能通便利水，祛风除湿。治大小便不通，脾胃不和，湿热黄疸，风湿骨痛。用量：5钱~1两。
730	楸树	金丝楸，梓桐。	紫葳科 植物形态：落叶乔木，高达15米。枝直向上，树皮灰色，光滑。叶对生，三角状迤卵形至广卵状椭圆形，长6~16厘米，宽6~12厘米，基部截形或尖楔形，先端长尖，全缘，表面深绿色，略有茸毛，背面淡绿色，有茸毛，叶柄长2~8厘米。花白色，顶生伞房花序，3~12朵，萼2枚唇形，花冠唇形，5裂，内有紫色斑点，发育雄蕊2枚，子房上位，2室。蒴果长柱形，长达50厘米。 生态分布：产我国黄河流域至长江流域各省。 药用部分：树皮、叶入药，夏秋采收。 用途：树皮性味苦、小寒，无毒。能杀虫及皮肤虫，除血胀，生肌肤，长筋骨，下气；治吐逆，恶疮疽痿，咳嗽。叶治疮肿，脓血，诸痈肿溃及内有刺不出者，咳嗽，瘰癧，头痒生疮，儿发不生，小儿目翳，秃疮等。
731	辣椒	番椒，辣茄，唐辛。	茄科 植物形态：一年生草本，茎高达75厘米。叶互生，卵状披针形，长5~9.5厘米，宽1.5~2厘米，全缘，基部渐狭而下延入叶柄，先端尖。花白色或淡黄绿色，1~3朵腋生，萼广针形，5裂，花冠5裂，雄蕊5枚，子房上位，2室。浆果熟后变为红色或橙黄色，形状与大小经过栽培后，变异很大，有长圆锥形、灯笼形或球形不等。 生态分布：我国南北均有栽植。 药用部分：根、叶、果入药，夏秋采收。 用途：果实性味辛、温，有小毒。内服作调味、健胃药，用于消化不良，酒食充气，能增加食欲。外用作皮肤发赤药及局部刺激药，治风湿痛，腰肌痛。根治哮喘及冻疮。用量：果实5分~1钱。
732	辣蓼	红辣蓼，班焦草，辣蓼草，辣尿草。	蓼科 植物形态：一年生草本。茎直立或下部伏地，高达90厘米，稍粗壮，分枝稀疏，茎节膨大，茎通常呈淡红紫色，全株散布腺点及毛茸。叶互生，广披针形，基部楔形，先端渐尖，叶表深绿色，有八字状的黑斑，叶鞘薄膜质，口缘生长刺。花淡红色，顶生穗状花序，下垂状。花被5片，雄蕊7~8枚，子房上位，1室。瘦果有三棱，外包宿存萼。 生态分布：产我国南北各地；多生于溪边，山坡湿地，村落城镇庭园中也有生长（花秋季开放）。 药用部分：根、茎、叶入药，夏秋季采收。 用途：性味辛、温，有小毒。能祛风湿，通关窍，散瘀，解毒，杀虫，止血。用量：5~6钱。
733	猪荳	粘粘草，猪膏母，虎膏。	菊科 植物形态：一年生草本。茎直立，被柔毛，高达1.5米，上部常叉状分枝。叶对生，卵状长椭圆形至三角状卵形，长4~8厘米，基部截形或楔状渐狭，先端锐尖，边缘有锯齿，近基部常为不整齐浅裂，两面密生灰色短毛，叶柄长短不一。花黄色，头状花序多数，聚成顶生圆锥花丛，总苞片2列，外列的线状匙形，扩展，被腺毛，易粘着人衣裤上，外围的花短舌状，雌性，管状花两性。瘦果稍膨胀而通常弯曲。 生态分布：产我国南北各地；多生长于山坡、路边、旷野及耕地附近，村落城镇庭园中也有生长。

			<p>药用部分：全草入药，夏至至秋末开花时收割地上部分晒干。</p> <p>用途：性味苦、寒，有小毒。能祛风湿，强筋骨，为痛风要药，治骨节冷痛，坐骨神经痛，风湿麻痺痛等症。亦治蛇毒、蜂咬伤，以鲜叶贴患处。又有降血压作用，用于高血压症。用量：3~4钱。</p>
734	瑞香	雪地开花，红总管，雪冻花，雪花皮，山棉皮。	<p>瑞香科</p> <p>植物形态：常绿灌木，高达2米左右。小枝平滑无毛，表面略带褐紫色，皮富纤维，强韧。叶质厚，互生，长椭圆形，长5~8厘米，基部狭楔形，先端钝或略钝，全缘，表面深绿色，背面淡绿色，平滑无毛。花白色或淡红色，头状花序，萼花瓣状，上端4裂，外面红紫色，内面白色，无花瓣，雄蕊8枚，子房上位，1室。核果圆球形，红色。</p> <p>生态分布：特产江西庐山，江南各省也有分布；多生于丘陵山地，山坡或沟谷林下湿地。</p> <p>药用部分：根、树皮、花入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、咸。能活血散血，缓解痉挛，止痛退热，祛风除湿；治急喉风，手脚麻木，骨梗不下，冻疮，烧伤。用量：根、皮、叶2~4钱。</p>
735	锦鸡儿	黄雀梅，绣花针，土黄芪，金雀花，阳雀儿，冷骨枫，土霸齿花。	<p>豆科</p> <p>植物形态：落叶灌木，高达2.5米。主根圆柱状，棕红或枣红色，有断续状纹，具有直立及斜出枝，小枝有角棱，细长而无毛，黄褐色或灰色，干皮具黄点，皮易剥落，托叶通常为棘状，总柄永存，有棘或脱落。叶互生，偶数羽状复叶，小叶4枚，顶端1对通常较下方1对为大，倒卵行以至楔性倒卵形，长1~3.5厘米，宽0.5~1.5厘米，先端圆或凹，具小短尖或无，表面暗绿色有光泽，平滑无毛，硬纸质，有细网脉。花黄色，蝶形，单生叶腋，萼钟状，5裂，旗瓣狭倒卵形，雄蕊10枚，两体，子房近于无柄。荚果稍为压扁状，无毛。</p> <p>生态分布：产我国黄河流域至长江流域各省。多生于山坡林下、路旁，郊野旷地上。现见村落园圃边有栽培。药用部分：根、花入药；根夏秋采收；花春夏采用。</p> <p>用途：根性味微辛，平；花性味甘，温。祛风活血，通经络，解热，利尿，止咳化痰；治腰痛、头痛、头晕、耳鸣；妇人崩中带下，月经不调，五心潮热，蛇伤，跌打损伤，风湿关节痛。用量：花1.5~3钱；根3~5钱。</p>
736	腹水草	穿山鞭，两头拉，仙人搭桥，两头绷，钓鱼杆，惊天雷。	<p>玄参科</p> <p>植物形态：多年生秃净蔓性草本。茎细柔，常弯垂，着地可生根，故名“两头绷”或“仙人搭桥”，长达1.5米。叶互生，卵形或卵状长圆形，长4~10厘米，宽2.5~5厘米，基部圆形或阔楔形，先端渐尖，有时尾状，边缘有不整齐粗锯齿，叶被紫红色。花紫色，叶生总状花序，花萼5片，花冠筒状，4浅裂，雄蕊2枚，子房上位，2室。蒴果卵圆形，稍扁。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡林边，沟谷丛林或草丛中。</p> <p>药用部分：全草或藤入药，夏秋可采。</p> <p>用途：性味苦、温，有小毒。祛风败毒，去腐生肌，散血逐瘀。主治月经不调，跌打损伤，，风湿骨痛，毒蛇咬伤，烫火伤，腮腺炎；又有利尿功效，用于治血吸虫病。用量：5钱~1两。孕妇忌用。</p>
737	福氏星蕨	骨排草，旋鸡尾，石扁担，风尾草，七星剑，金鸡尾。	<p>水龙骨科</p> <p>植物形态：多年生常绿草本，高达70厘米。根状茎横走，疏被棕色鳞片，鳞片卵形，急尖，脱落。单叶疏生，薄革质，淡绿色，叶柄黑色，长约10厘米，叶片线状披针形至广线状披针形，长25~45厘米，宽1.5~5厘米，基部渐狭长，先端渐尖，全缘，叶脉不明显。孢子囊群圆点状，棕黄色，中脉两边各1行，着生于网脉的交叉点上，整齐或不整齐，不具盾形的鳞片。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于沟谷林下岩石上，树枝上或山坡湿地草丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，四季均可采收。</p> <p>用途：性味苦、凉，无毒，能利小便，退热通淋。治五淋带下，头项瘰癧，红痢及阳毒未溃等症。用量：1~2两。</p>
738	廊茵	红火老鸦酸草，蛇不钻，猫儿刺。	<p>蓼科</p> <p>植物形态：一年生蔓生草本，长达5米，全株被毛。茎直立，方形，有纵纹，棱角明显，有倒生小刺，并被短柔毛。叶互生，戟状三角形，长2.5~6厘米，基部戟形，先端尾尖，背面主脉有疏刺；叶柄长，有着生倒刺，托叶下部鞘状抱茎。花淡红色，顶生短穗状花序，花被5片，无花瓣，雄</p>

				<p>蕊8枚，子房上位，1室。瘦果黑色，花被宿存。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于沟谷丛林边，村落附近灌丛中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦，平。能行血散瘀，消肿解毒。</p>
739	鼠麴草	棉艾，佛耳草，追骨风，白头草，清明菜。	菊科	<p>植物形态：两年生草本，茎高约10~25厘米。基部分枝多，直立或斜生，全体密被白色的绵毛。叶互生，着生于茎下部的叶呈匙形，上部的叶匙形至倒披针形，先端圆钝具尖头，全缘，基部狭窄，无柄，两面都有白色绒毛，花开后基部的叶渐凋落。花金黄色，顶生，头状花序多枝，排成伞房状，头状花序周围为雌花，中央为两性花。瘦果椭圆形，具乳头毛，冠毛黄白色。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于旱田，田边湿地草丛间。</p> <p>药用部分：全草入药，春季采收。</p> <p>用途：全草嫩时民间均大量采取，捣烂和米粉制米果供食用。性味甘、平，无毒。能止咳化痰，治感冒，咳嗽，风湿骨痛，气喘及支气管炎等症，以酒泡服，治筋骨病。用量：5钱~1两。</p>
740	雷公藤	菜虫药，红紫根，断肠草，红药，黄藤草。	卫矛科	<p>植物形态：蔓性落叶灌木。根内皮呈柑黄色。小枝具4~6棱，表面暗赤褐色，具有近圆形小瘤状突起和锈褐色绒毛。叶互生，椭圆形至广卵圆形，长5~10厘米，宽3~5厘米，基部半圆形或略带楔形，顶生短尖或渐尖，表面光滑，背面淡绿色，叶脉每侧5条，间有4或6条，主脉和侧脉在叶面均稍隆起，脉上疏生锈褐色短柔毛，边缘具细锯齿，叶柄长0.5~1厘米，表面密生锈褐色短绒毛。花小，绿白色，顶生或腋生圆锥花序，花萼5浅裂，花瓣5片，雄蕊5枚，着生于花盘边缘，花丝近基部较宽，子房上位，3室，3棱状。果为翅果。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于向阳山坡，溪谷边或林边。</p> <p>药用部分：叶、根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦，大毒，不可内服。能杀虫，消炎，解毒。</p>
741	蓍草	千条蜈蚣，花牡丹，飞天蜈蚣，一枝蒿，千条蜈蚣赶蛇。	菊科	<p>植物形态：多年生草本，茎高达1米。直立，有棱条，上部分枝，有毛或无毛。叶互生，长线状披针形，长6~10厘米，宽0.7~1.5厘米，无柄，边缘栉齿状羽状深裂，裂片线形，宽约1~3毫米，排列稀疏，锐尖头，有不等长的缺刻状齿牙，叶片半抱茎，两面披长柔毛，背面毛较密，开花时下部叶枯萎。花白色，头状花序，密集成顶生复伞形花序。周边舌状花雌性，中央管状花两性。瘦果扁平，长圆形，有翼，无冠毛。</p> <p>生态分布：产我国东北、华北各地。</p> <p>药用部分：全草或根入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味苦、酸、平，有毒。为镇痛、消炎、杀菌药。并能通经堕胎。外用治毒蛇咬伤，风湿疼痛等。用量：全草5分~1钱5分，孕妇忌用。</p>
742	蒲草	水蜡烛，香蒲，蒲黄。	香蒲科	<p>植物形态：多年生水生草本，地下生匍匐茎，多须根，茎出水面直立，高可达2.5米。叶二列式互生，狭长线形，长0.8~1.3米，宽4~10毫米。花黄绿色，单性，穗状花序，似蜡烛状，高达2.5米，苞叶2~8片，早落，花穗细长，圆柱状，雌花穗黄色，位于下部，中间相隔2~15厘米，全长达50厘米，上部雄花穗长20厘米，花被鳞状或毛状、雄花具3雄蕊，雌花子房上位，1室。果为小坚果，果穗似蜡烛状，赭褐色。</p> <p>生态分布：产我国南北各地沼泽地带；多生于水泽或湿地，田边。</p> <p>药用部分：花粉（蒲黄）或根茎（水蜡烛根）入药，夏季采收。</p> <p>用途：（1）蒲黄，性味甘、凉，无毒。为止血药，能利水道，消肿排脓。治咳血，吐血，衄血，便血，尿血，子宫出血，痔出血；并治疗膀胱炎及尿道炎，妇女月经不调，带下崩漏症，外用为撒布剂，治创伤，湿疹。（2）水蜡烛根，性味微苦、寒，无毒。能消肿行血；治白带，调经，牙痛。用量：蒲黄1钱5分~5钱；根1钱~1两，孕妇忌用。</p>
743	蒲公英	黄花地丁，奶奶草	菊科	<p>植物形态：冬季多年生草本，高可达20厘米，有丰富乳汁。直根肥厚，</p>

			<p>外面黑色，有苦味。叶根生，无柄，倒披针形或线形，长可达16厘米，先端急尖，边缘有倒向羽状缺刻，裂片不规则，大小不一，基部狭窄如叶柄状，表面绿色，背面淡绿色。花黄色，由叶丛中抽出花茎，顶生头状花序，总苞钟状，花全为舌状花，花冠上端截形，5裂齿，雄蕊5枚，子房下位。瘦果顶端有1长喙，喙上端具白色而有光泽的冠毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于路边湿地，村落、城镇庭院附近均有生长。</p> <p>药用部分：全草，3~4月采集。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。能清热解毒，消炎散结，通乳，利尿；治乳痈结核，疔疮恶毒，瘰癧疮肿；叶能催乳。用量：2~3钱。</p>
744	蒜藜芦	棕包头，棕包脚。	<p>百合科</p> <p>植物形态：多年生草本，高达1.5厘米。茎粗壮，肥厚，直立，基部有叶鞘分解的纤维，似棕状。叶基生和茎生，广椭圆形至卵状长椭圆形，长7~12厘米，叶基部狭而抱茎，先端或钝，全缘，表面无毛，背面有短毛，脉平行，两面隆起。花绿白色，圆锥花序顶生，长25~50厘米，下部多分枝，密生短绵毛；花被6片，雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡林下，沟谷丛林或溪边湿地。</p> <p>药用部分：根部入药，4~9月采挖。</p> <p>用途：性味苦、寒，有毒。能催吐，祛痰，杀虫。</p>
745	牌钱草	毛婆钱，笠碗子树，钱串草。	<p>豆科</p> <p>植物形态：落叶小灌木，高可达1米，枝条被柔毛。叶互生，3小叶，顶生小叶长椭圆形或卵形，先端急尖或钝，边缘波状，侧脉在叶缘相互连接，两面叶脉上均有短柔毛，叶长6~11厘米，宽2.4~5厘米，顶端小叶较两侧小叶约长1倍以上，总叶柄长4~8厘米。花白色，蝶形，包夹于1对圆形叶状苞片内，聚集成叶生总状或顶生总状花，5裂，旗瓣椭圆形，雄蕊10枚，两体，子房上位，1室。荚果扁平，2节。</p> <p>生态分布：产我国南部各省，多生于山坡疏林下，荒山草地上。</p> <p>药用部分：叶、根入药，夏秋可采。</p> <p>用途：性味淡、涩，凉。能活血，清热解毒。</p>
746	滴水珠	心型半夏，石里开，制蛇子，水半夏，石半夏，独叶一枝花，岩芋，一粒珠，蛇珠，独龙珠。	<p>天南星科</p> <p>植物形态：多年生草本，高可达15厘米，地下茎球形，上生须根。叶通常一片，近戟形或心脏形，长6.6~13厘米，基部心形或戟形，先端锐尖，全缘，表面绿色或淡紫色，两面光滑无毛，侧脉羽状在近叶缘处连合，叶柄长约6~13厘米，叶片与叶柄相接处有一珠牙，叶柄下段近1/5~1/4处又有一珠牙。花绿色，单性同株，肉穗花序，花梗长约3~6厘米，佛焰苞管部卵形，上部呈头巾状，花序轴细长，伸出佛焰苞外面稍弯。</p> <p>生态分布：产我国长江南部各省；多生于山坡林边，灌丛边草丛中或岩石及石壁积土水湿处。</p> <p>药用部分：块茎入药，全年可采收。</p> <p>用途：性味辛、涩、温，有毒。能解毒止痛，消肿散瘀。捣烂外敷，或内服少量，治毒蛇咬伤。用量：1~3钱。（原药吞服，不可嚼碎）。</p>
747	漆姑草	瓜槌草，地松，鼻药。	<p>石竹科</p> <p>植物形态：一年生或二年生小草本。茎丛生，自基部分枝，枝下端平卧，高5~15厘米，上部具短腺毛，叶对生，线形，先端锐尖，基部膜质，联合而成短鞘，长5~15毫米，宽1毫米。花白色，单生枝顶或叶腋，花梗及萼片均具有短纤毛；萼片与花瓣均为5片，雄蕊5枚，子房上位，5室。蒴果广卵形。</p> <p>生态分布：产我国东南各省；多生于山坡草丛，荒山草地，溪边湿地，村落、城镇庭园中也有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味酸，甘。能退热行血；治恶疮龋齿。鲜叶揉汁涂漆疮，痈肿及毛发，口含治虫牙。用量：5钱~1两，外用捣绒敷。</p>
748	满江红	红浮萍，红浮漂，漂	<p>满江红科</p> <p>植物形态：水田、池沼中多年生浮生植物。植株小形，三角状，直径约1厘米，羽状分裂。根悬垂水中，须根甚多，白色。叶互生，密生枝上，似扁柏叶状，呈2行复瓦状排列，叶无柄，叶片绿色，成熟时红色，略作四方形，表面有多数乳状突起，叶的背面有一洞穴，注有胶质，内有蓝</p>

			<p>绿藻与之共生。孢子囊果有大小两种，成对而生，生于侧枝的第1片叶的下面，大者为小孢子囊果，球形，小者为大孢子囊果，棒形，在小孢子囊果内有小孢子囊，其内产生多数小孢子；在大孢子囊果内有孢子囊，其内含有1个大孢子。</p> <p>生态分布：产我国东部、南部和西部各省；多生于稻田或静水池沼中。</p> <p>药用部分：全草及根入药，夏秋采用。</p> <p>用途：全草性味辛、寒，无毒。能发汗利尿，祛风胜湿。治暴热身痒，风湿顽痹，辽红白瘾疹，利小便，止消渴。根有润肺止咳的功用，治肺癆症；又作发汗利尿剂，据称功用同麻黄。用量：全草1~3钱，表虚自汗者忌用。</p>
749	榔榆	秋榆，掉皮榆，枹榆，豺皮榆，榔皮树，香皮树，榔树。	<p>植物形态：落叶乔木，高可达25米。树皮灰褐色，成不规则鳞状剥落，露出棕色的内皮层，小枝红褐色有柔毛。叶二列式互生，椭圆形，椭圆状倒卵至卵圆形，长1.5~5.5厘米，基部偏圆形，顶端尖或渐尖，边缘具略整齐的单锯齿，表面光滑或微粗糙，呈深绿色，背面幼时有细毛，后即脱落，呈淡绿色；叶柄短，托叶狭窄，早落。花黄绿色，秋季开放，丛生于叶腋，花被4裂；雄蕊4枚，子房上位，1室，花柱2。翅果扁平，中央有种子，周围为薄翅。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于村落附近。</p> <p>药用部分：树皮、枝、叶及根入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦，寒。能清热解毒，利尿消肿，治热淋及乳痈等。</p>
750	槐树	槐花树	<p>植物形态：落叶乔木，高达15米。树干端直，树皮灰色，具不规则纵裂，嫩枝暗绿褐色，近光滑或生有短细毛。叶互生，奇数羽状复叶，长10~20厘米，叶轴具浅沟；叶柄长2~3.5厘米，基部膨大。小叶7~17片，近对生，小叶卵形、卵状披针形或卵状椭圆形，长2.5~5厘米，宽1.2~2.5厘米，先端钝，具短尖头，基部圆或宽楔形，表面深绿色，无毛，背面苍白色，贴生短细毛，主脉于下面显著隆起，侧脉不明显，小叶柄长2毫米，有白色短柔毛。花蝶形，黄白色，顶生圆锥花序。萼钟状，5裂，旗瓣近圆形，顶端微凹，向外反曲，雄蕊10枚，两体，子房上位，1室。荚果长念珠状，下垂，熟时黄绿色。</p> <p>生态分布：产我国北部。</p> <p>药用部分：花蕾（槐米）、果实（槐角）、根皮入药，夏秋采收。</p> <p>用途：槐米性味苦，平。功能清热止血；治赤白痢疾，肠风痔漏，吐衄血崩，预防中风。槐角应用同槐花，但有催生堕胎作用。根皮治疔毒，烫火伤，痔疮，阴门痒痛。用量：槐米、槐角1钱5分~3钱。</p>
751	槐叶萍	蜈蚣漂	<p>植物形态：水生漂浮植物，茎横走，被褐色柔毛，无根。叶三片轮生，上面2叶漂浮水面，水平排列于茎的两侧，椭圆形或长圆形，长8~15毫米，宽5~8毫米，两端钝圆或基部为心脏形，全缘，柄长约2毫米或近无柄，叶脉斜出，在主脉两侧有小脉15~20对，每条小脉上面有白色刚毛5~8束，表面深绿色，背面密被棕色茸毛，下面叶悬垂水中，细裂成丝状，被细毛，状如须根。孢子果球形，有纵沟4~8个，丛生于沉水叶的基部。大孢子果较小，内有少数大孢子囊，小孢子果较大，内有多数小孢子囊。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于水田、池沼和缓流的河溪中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收，</p> <p>用途：治火烫伤、疮毒。</p>
752	隔山香	野茴香，柠檬香咸草，香白芷，鸡爪参，金鸡爪，狗椽当归。	<p>植物形态：多年生草本，高可达1.5米，根近纺锤形，黄色，端面粉质，常多个似鸡爪状；茎直立，圆柱形，中空，有纵沟纹。叶互生，奇数羽状复叶，一般3~5羽片，小叶3~5枚，长1.5~3.5厘米，宽6~8毫米，长椭圆状披针形，两端钝尖，全缘。花白色，顶生复伞形花序，苞片小，萼、花瓣、雄蕊均5枚，子房下位，2室。双悬果，分果扁平，有柠檬香味。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡灌丛或林边草丛中。</p> <p>药用部分：根入药，秋冬采收，阴干备用。</p> <p>用途：性味辛、苦、微凉，气香。能活血散瘀，止咳祛痰。主治心绞痛，胃痛，慢性咳嗽，毒蛇咬伤。用量：根3~5钱。</p>

753	蜡瓣花	连核梅，连合子。	金缕梅科	<p>植物形态：落叶灌木，高达5米，嫩枝密生短柔毛。叶互生，倒卵形至长椭圆状倒卵形，长5~12厘米，宽2.5~5厘米，基部斜心形或近心形，先端渐尖，边缘有深波状细齿牙，表面暗绿色，背面灰绿色，有短柔毛，或仅脉上有毛，叶柄长6~12厘米，亦密生短柔毛。花淡黄色，有香气，10~18对成下垂的总状花序，先叶开放，各花基部有1大形鞘状苞片，萼及花瓣均5数，雄蕊5枚，子房半下位，偶为上位。蒴果广倒卵形，熟时裂为4瓣。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省至福建等地；多生于海拔800米以上的阔叶林中。</p> <p>药用部分：根皮及叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：治恶寒发热，热度不很高，呕逆心跳，烦乱昏迷（俗称风蛇落肚症）</p>
754	蜘蛛抱蛋	一叶，赶山鞭，九龙盘，蓼叶伸筋。	百合科	<p>植物形态：多年生常绿草本，高达90厘米。须根常从地下茎节下生出，地下茎横走，节间有叶鞘抱茎。叶革质，直立，绿色，叶片椭圆状披针形或阔披针形，长30~45厘米，宽5~7厘米，基部狭窄先端尖，表面深绿色，有光泽，背面绿色，秃净，平行脉8~12条，细脉很多，叶柄25~40厘米。花紫色，单生于近地面的叶腋中，呈船状卵形，苞片3枚，花被8齿裂，雄蕊6~8枚，雌蕊1枚，子房上位，3~4室。浆果球形，花柱宿存。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至西南各省。</p> <p>药用部分：根入药，四季均可采集。</p> <p>用途：性味甘、平、微涩，无毒。能行气活血，止血退热，强筋骨。治热症，腰痛，咳嗽，泄泻，腹痛，跌打损伤。</p>
755	酸枣	山枣皮，酸醋树，五眼果。	漆树科	<p>植物形态：落叶乔木，高可达22米，干直立。叶互生，奇数羽状复叶，小叶7~19枚，小叶披针形或卵状披针形，长约9厘米，宽约4厘米，基部偏斜，先端渐尖，全缘，小叶有短柄。花黄绿色。杂性异株，腋生圆锥花序，两性花较单性花为大，花萼、花瓣均5片，雄蕊10枚，子房上位，5室。核果椭圆形，熟时黄色，果核坚硬，有4眼点。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于沟谷常绿阔叶林中。</p> <p>药用部分：树皮和果皮供药用，全年可采收。熬膏备用。</p> <p>用途：树皮性味涩，凉；果皮性味酸、甜、平，无毒。消炎解毒，止痛止血；治汤火烫伤，外伤出血。</p>
756	酸橙	朱栾，皮头橙，香圆，枳壳。	芸香科	<p>植物形态：常绿小乔木，枝细长疏生，有长而不甚尖的棘刺。叶互生，倒卵状椭圆形或卵状长椭圆形，长7.5~10厘米，先端短或带钝的渐尖头，基部圆形，边缘有浅波状钝齿，半革质，光滑无毛，有半透明油点；叶柄有宽阔的叶翅，叶柄与叶片之间有缢状痕。花白色，有香气，数朵丛生于叶腋；花萼、花瓣均5片，雄蕊20枚或更多，子房上位，10~12室。柑果球形，两端略扁，直径约7.5厘米，果皮厚而粗糙，淡黄色，味苦，肉瓤10~12枚，熟时空心，瓤肉淡黄色。</p> <p>生态分布：产我国长江南部。</p> <p>药用部分：果入药，秋冬采收。</p> <p>用途：性味苦，温。理气宽胸，提肛消胀；为健胃剂，强壮剂，驱风剂和矫味剂。治感冒，消化不良，咳嗽多痰，子宫脱出，脱肛等症。用量：枳壳2~3钱，枳实1~2钱。</p>
757	酸浆	泡泡草，红姑娘，灯笼果，挂金灯。	茄科	<p>植物形态：多年生草本，高约60厘米。地下有横走的匍匐茎，茎直立，通常不分枝，有纵棱，无毛或微有细毛。叶互生，常2枚生于一节，阔卵形，长5~10厘米，宽3~5厘米，基部阔楔形，下延成叶柄，先端短尖，边缘有不整齐缺刻状粗锯齿，两面无毛，叶柄长1.5~3厘米，微有细毛。花白色，单生叶腋，花萼5裂，花后萼筒膨大，变为橙红色或深红色，呈灯笼状包被浆果，花冠广钟形，有5齿，雄蕊5枚，子房上位，2室。浆果球形，熟时血红色而包被在膨大向下垂的灯笼状萼筒内。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于田边、路旁以及村落、城镇庭园旷地上。</p> <p>药用部分：根、全草及果实入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、酸，寒。清热利尿化痰。全草有泻下作用，治麻风，过</p>

				量可使孕妇堕胎；又治天疱疮，疔疮，水肿，糖尿病等。果实为利尿剂，有清凉、消肿、化痰之效，治咳嗽，可清肺解热。用量：果实、全草1.5~3钱。孕妇忌用。
758	蔷薇莓	红梅消，七叶饭消扭，空心瘰	蔷薇科	<p>植物形态：落叶有刺灌木，茎直立或倾斜，高可达3米。枝条柔弱，散生短钩刺，茎枝绿色，上部疏分枝，嫩枝常具腺毛。叶互生，奇数羽状复叶，小叶5~11枚，偶有3枚，小叶片卵状披针形，长4.5~7厘米，宽1.2~2厘米，基部圆，先端长渐尖，表面光滑无毛，背面脉上疏生腺状毛；托叶披针形，边缘疏生腺毛。花白色，1~2朵顶生，花梗密生长柄的腺毛，并疏生细刺，萼片，花瓣均5片，雄蕊多数；雌蕊心皮多数，分离。小坚果聚合呈卵状球形，熟时鲜红色。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省；多生于山坡疏林边，沟谷岩石边，山区村落附近极为常见。</p> <p>药用部分：根及叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：根可治小儿惊风，叶可接骨。</p>
759	焊菜	黄瓜草，野萝卜，辣米菜，塘菖菜，诸葛菜。	十字花科	<p>植物形态：二年生草本，高达30厘米。茎直立或卧伏地上，近基部分枝。叶互生，长椭圆形或披针形，长5~10厘米，宽1.5~2厘米，基部楔形，先端钝尖，边缘有粗锯齿或羽状分裂，基部叶往往呈小提琴形羽状分裂。花淡黄色，顶生或腋生总状花序，萼、花瓣均4数，雄蕊6枚，4强，子房上位，2室。长角果线形。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部；多生于旷野、耕地附近，村落、城镇庭园中均有生长。</p> <p>药用部分：全草及种子入药，春夏冬均可采用。</p> <p>用途：性味辛、苦、凉，无毒。能去冷气，令人能食，利胸隔，豁冷痰，退热止咳，健胃化食。治腹内久寒，饮食不消，心腹痛，心胃痛。外治火烫伤。用量：鲜全草1~2两。（据云本品不能与黄荆叶同用）</p>
760	婴奥	野葡萄，酸古藤，山葡萄。	葡萄科	<p>植物形态：细长攀缘性木质藤本，长达9米，有卷须，小枝幼时有角棱及锈色绒毛。叶互生，心形，3~5裂片，长与宽均为6~14厘米，基部心脏形，基生3~5脉，裂片宽卵形，有圆形缺陷，或有时裂片较短而缺陷为尖形，边缘有浅而不整齐之齿牙，表面为暗浓绿色，平滑无毛，背面有锈色绒毛。花绿白色，圆锥花丛与叶对生，萼细小不明，花瓣5片，雄蕊5枚，子房上位，2室。浆果卵圆形或椭圆形，黑色，熟时紫色。</p> <p>生态分布：产我国南北各省；多生于山坡林边，灌丛中，沟谷、溪边林中，村落、城镇附近也时有生长。</p> <p>药用部分：根、茎、叶及果入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、酸、平，无毒。能祛湿，利尿，消肿毒，止渴。主治风湿关节炎，寒性脓疡，阴毒，癫痫，中耳炎等。用量：1~2两。</p>
761	蔓荆	单叶蔓荆，万金子。	马鞭草科	<p>植物形态：落叶灌木，高可达1米，有匍匐茎蔓延于沙土中，枝四方形，全体密生灰白色细绒毛。叶对生，倒卵形，长2~3.5厘米，宽1~2.2厘米，基部楔形，先端圆形，表面绿色，密生短细毛，背面灰白色，密生细绒毛，叶柄长约5毫米，密生细绒毛，上面有槽。花淡蓝紫色，顶生圆锥花序，萼钟形，上端有5齿，花冠唇形，5裂，雄蕊4枚，子房上位，2心皮，4室。核果球形，包有宿萼。</p> <p>生态分布：产我国沿海各省及江西、云南等地。</p> <p>药用部分：茎、叶及种子入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、寒。能疏风散热，为清凉性镇痛镇静药。用于神经性头痛，目痛，齿痛；又用于感冒发热及慢病发热。用量：果实1.5~3钱。</p>
762	蔓苎麻	糯米藤，糯米草，糯米莲，糯米团。	荨麻科	<p>植物形态：多年生草本，直立或倾斜、或下部伏地而蔓延状，通常有刚毛，根较粗肥，圆锥形。叶对生，卵圆形或椭圆状披针形，长3.5~7厘米，宽1~2厘米，基部圆形或近心脏形，先端钝尖或渐尖，全缘，基脉3出在叶背突出，表面微凹，网状脉在叶背明显，有刚毛，表面粗糙或有刚毛，网脉不明显，无柄或具短柄，托叶膜质，阔卵形，先端短尖。花小，黄绿色，单性同株，丛生叶腋，花被裂片3~5枚，雄蕊5枚，子房上位，1室。瘦果三角状卵形。</p>

			<p>生态分布：产我国长江流域以南各省；多生于山地林边草丛中，沟谷溪边灌丛边。</p> <p>药用部分：根、茎、叶入药，四季均可采收。</p> <p>用途：性味淡、平，无毒。能升清降浊，避秽止呕，行气化湿，醒脾和胃；又为清凉解热药，有健脾镇呕作用。用于消化不良及胃寒而起的吐泻、腹痛、胸闷及乳痈，小儿惊风等。用量：全草3~5钱。</p>
763	翠云草	石柏，金鸡独立草。	<p>植物形态：蔓生常绿多年生草本。主茎蔓延，长达50厘米或更长，有细沟，黄绿色或略带红色，基部及全体各节均生根，两侧疏生羽状的分枝。叶在主茎上疏生，斜长圆状椭圆形，不对称，长3~5毫米，宽2~2.5毫米，基部圆形或心脏截形，先端急尖，全缘有白边，中脉明显；在侧枝上的侧生叶密生，较小，中脉明显，中叶两行，斜卵圆状长圆形，基部圆形，先端渐尖，边缘有白边，长约1.5毫米，宽约1毫米，叶质薄柔软，淡绿色，嫩叶表面通常翠蓝色，孢子囊穗单生于小枝顶端，长1~2厘米；孢子叶卵圆三角形，渐尖，全缘有白边，龙骨状。</p> <p>生态分布：产我国中部、南部及西南部各省；多生于沟谷林下阴湿处，或溪边丛林下。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味微苦，寒。能清热解毒，去腐生肌，利尿逐水；治高热惊厥，创伤出血，烫火伤，盗汗，毒蛇伤。用量：5钱~1两。</p>
764	腐婢	臭黄荆，早禾子树，豆腐叶，观音楂，豆腐柴。	<p>植物形态：落叶灌木，高可达1.5米，有臭气味，小枝密生柔毛。叶对生，卵状披针形或阔椭圆形，长7.5~15厘米，宽3.5~6厘米，基部楔形，先端渐尖，边缘有缺刻状粗锯齿3~4个，下部全缘，表面绿色，疏生细毛或几无毛，沿脉上毛较密，背面淡绿色，有灰白色细毛，沿脉尤密，脉两面隆起，侧脉3~4对。花淡黄色，顶生圆锥花序，萼钟形，5裂，花冠4裂，雄蕊4枚，子房上位，2室。核果球形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至福建等省；多生于山坡林边，灌丛中，山谷丛林中，村落附近也常有生长。</p> <p>药用部分：根、茎、叶入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。能清凉解热，败毒消痈。治疟疾，外敷刀斧伤。用量：3~7钱。（内服配合利尿药为佳，以免小便艰涩）。</p>
765	瘦风轮菜	野薄荷，剪刀草，塔花。	<p>植物形态：多年生小草本。茎初生时匍匐地表，后直立或斜上，高达30厘米，秃净或略被粗毛。叶对生卵形，长1~2厘米，基部楔尖，先端钝，边缘有锯齿。花淡红色顶生或腋生轮状总状花序，萼、花冠均唇形，4~5裂，雄蕊10枚，子房上位，4室。小坚果4枚。</p> <p>生态分布：产我国中部和南部各省；多生于山坡灌丛边草丛中，溪畔、路边湿地，村落、城镇庭园旷野均有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋可采。</p> <p>用途：性味苦、辛、凉。祛风散热，解毒消肿。主治乳痈，白喉，赤白痢，雷公藤中毒；万外敷痈肿疮毒。用量：3~7钱。</p>
766	蕨	江蕨，蕨儿菜，如意菜。	<p>植物形态：多年生草本，高1米余。根茎长，在地中横走。叶柄疏生，长达1米，草黄色；叶革质，2~3回羽状复叶，背面常有毛；叶柄甚长，粗壮，无毛，埋在地中部分常具淡褐色细毛，下部羽片对生，披针形或广披针形，下部者具柄，第二回羽片长椭圆状披针形，基部宽，稍呈羽状分裂，略似无柄，或下部者具不明显的小柄，小裂片长圆形，基部几乎汇合，生于小羽轴上，先端微圆形，叶脉明显，表面凹下，背面凸起，孢子囊群沿叶背边缘者生，成连续的长线形，叶缘反卷，形成假子囊群盖。</p> <p>生态分布：产我国各地；多生于荒山草地中。</p> <p>药用部分：根茎、叶及全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味甘、寒，滑。能清热解毒，利水消肿，健脾胃。根茎可提取淀粉（蕨粉），为缓和滋养剂，嫩叶可食。用量：根茎3~5钱。</p>
767	榧	香榧，野杉，榧子，王榧。	<p>植物形态：常绿乔木，高可达25米。树皮灰褐色，浅裂成鳞状片。叶螺旋状排列而扭转成二列式，叶片线形或线状披针形，长1.2~2厘米，宽约</p>

			<p>3.5厘米，革质，基部钝，有短柄，先端急尖或刺尖头，表面暗黄绿色，背面有两条黄白色气孔带。花单性异株，有时同株，黄绿或绿色，腋生，雄花单生，雌花每两朵腋生，有1单生胚珠，基部为肉质的假种皮和数对鳞片所围绕。种子全部为肉质假种皮所包藏，初时绿色，后为紫赤色，长椭圆形至椭圆状倒卵形，长2~3厘米。</p> <p>生态分布：产我国长江南部、浙江、安徽、福建各省；多生于山坡针叶树林中，常与杉木，金钱松及马尾松混生或散生于阔叶树疏林中，现多有人工栽植。</p> <p>药用部分：种子入药，秋季采集。</p> <p>用途：性味甘、涩，平。能杀虫消积，疳疔。治诸虫积虫毒，痔漏及小儿疳积黄瘦等症。用量：1.5~3钱。作丸剂或煎剂。</p>
768	三尖杉	温杉,水杉,柏杉,榧子,山榧子。	<p>粗榧科</p> <p>植物形态：常绿小乔木，高可达7米。树皮褐色或深褐色，常成大薄片脱落，脱落后内面现浅色花纹，枝开展稍向下垂。叶互生，线形，长6~8厘米，宽3~4毫米，先端渐尖，基部向枝上延伸，表面深绿色，光滑无毛，具显著的中肋，背面灰色，在中肋的两侧各具一条气孔带。花单性异株，雄花黄色，着生于叶腋，雌花绿色，有数种鳞，各具2枚胚珠。种子核果状，长椭圆形，外种皮肉质，熟后变软，紫褐色。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于山坡疏林以及溪边湿地。</p> <p>药用部分：秋季采成熟的种子供药用。</p> <p>用途：性味甘、涩、平，无毒。能杀虫，润肺，疳疔，消积，治诸虫积虫毒，咳嗽，痔漏及小儿疳积黄瘦等症。（多服滑大肠）用量：1.5~3钱。</p>
769	樟树	樟角,香樟,乌樟,香蕊,豫章,樟公,油樟。	<p>樟科</p> <p>植物形态：常绿大乔木，高达30余米。树皮灰褐色或黄褐色，纵裂；小枝圆柱形，光滑，淡褐色。叶互生，叶柄长2~3厘米，叶片卵形或卵状椭圆形，长4~12厘米，宽2.5~6厘米，基部广楔形或略呈圆形，常偏斜，先端渐尖或短尖，全缘或呈波状，表面绿色，有光泽，背面灰绿色或粉白色，光滑无毛，幼叶淡红色，脉在基部以上3出，脉腋具明显的腺点。花黄绿色，腋生，花被6裂，雄蕊12枚，4轮，花药4室，排成两层，瓣裂，最内1轮雄花药4室，瓣裂。子房卵形，上位，1室。核果球形或卵圆形，基部具宿存花托。</p> <p>生态分布：产我国长江中下游至南部各省；野生于山坡林中、溪边，或栽培于村落城镇中。</p> <p>药用部分：枝、干、根、叶都可蒸制樟脑，幼嫩枝叶含樟脑较少。根、树皮、木材、叶、果实入药，夏秋采用。</p> <p>用途：性味气香、辛，温。能开窍除湿，杀虫利滞。主治霍乱，风湿性关节炎，跌打损伤，胃痛腹痛，胃肠炎，寒湿脚气，疥癣瘙痒，龋齿。</p> <p>用量：樟脑3~8分；果3~5钱；根皮4~6钱。</p>
770	樱桃	樱珠,英桃,牛桃,家樱桃。	<p>蔷薇科</p> <p>植物形态：落叶灌木或乔木，高达8米。树皮灰褐色，环状裂。叶互生，广卵形至长椭圆状卵形，长6.5~15厘米，宽4~8厘米，基部圆形，有腺体，先端渐尖，边缘为重锯齿，齿牙为卵形而先端短，表面平滑，背面侧脉上有短毛，叶柄有沟，无毛或有短毛。花白色，先叶开放，3~6朵丛生或为总状花序腋生，萼、花瓣均5片，雄蕊多数，子房上位，1室。核果近球形，熟时红色。</p> <p>生态分布：产我国中部。</p> <p>药用部分：根、叶及果壳药用；青叶晒干入药，夏至前后果熟食用，后将遗下的壳洗净晒干生用，秋后采根。</p> <p>用途：性味酸，微温。能透肺热，助托斑疹。果壳辛、平，无毒。叶甘、平，无毒。用量：内果皮、核1~3钱；根1钱~1两。</p>
771	槲寄生	柳树寄生	<p>桑寄生科</p> <p>植物形态：半寄生常绿小灌木，生于树枝上，高达60厘米。根深入寄主皮部及木质部中，茎圆形，绿色，光滑无毛，有节，节上常呈2叉或3叉分枝。叶对生，倒披针形或长椭圆形，长3~7厘米，宽1~1.5厘米，基部楔形，先端圆钝，主脉不明显，全缘，两面光滑无毛，淡绿色，近无柄。花黄绿色，单性异株，丛生于叶腋，花被、雄蕊均4数，子房下位，1室。果为浆果状核果，球形，肉质，熟时呈淡黄色，半透明状，果皮有胶粘</p>

				<p>质。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多寄生于阔叶树的枝条上。</p> <p>药用部分：茎、叶、果实入药，叶全年可采，果夏秋采。</p> <p>用途：性味苦，平。能补肝肾，健筋骨，安胎下乳。治腰痛背强，筋痿骨弱及妇女胎动不安。又作降血压药，治原发性高血压病。用量：3~5钱。</p>
772	蝙蝠葛	粉防己, 金线吊蛤蟆, 防己藤, 黄攸香, 什子苗。	防己科	<p>植物形态：落叶木质藤本，长可达10米。小枝绿色，有细纵棱纹，光滑无毛。叶互生，有长柄，叶片盾形，稍具浅裂，略呈3~7角形，长宽约7~10厘米，基部浅心形或截形，先端尖或渐尖，掌状脉5~7条，于两面均隆起，叶幼时膜质，老时稍厚，光滑无毛，表面稍带苍白色。花单性异株，黄绿色，基部有小苞片，花萼约6片，花瓣6~8片，雄花有雄蕊12~24枚，药4室；雌花有退化雄蕊6~12枚，心皮3枚，分离，子房上位，1室。核果肾圆形，熟时黑紫色。种子呈马蹄状。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡林边，沟谷灌丛中。</p> <p>药用部分：根茎入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、苦，寒，无毒。功能祛风，利尿。治风湿痹痛，痲肿等症，用途大致同木防己，有解热、镇痛作用。对热性诸痛，风湿，泌尿器病，可作利尿解热药；并治腰痛，瘰癧。根、茎、叶加水煎汁作农业杀虫药。用量：5分~3钱。</p>
773	醉鱼草	一串花，狗头鹰，闹鱼花，痒见消，鱼尾草。	马钱科	<p>植物形态：落叶灌木，高达2米。分枝多，小枝4棱，略带翼，幼枝密被黄色细茸毛，老枝疏被毛。叶对生，椭圆形或卵状披针形，长3~10厘米，宽1.2~3.5厘米，基部楔形或钝圆，先端尖，全缘或有波状齿，萼表面绿色，幼叶密被毛茸。花紫白色，顶生穗状花序，稍下垂，苞片线状，萼钟形，4裂，花冠筒状；稍弯曲，4裂。雄蕊4枚，子房上位，2室。蒴果稍圆形，2瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于山坡林边，溪边，灌丛中。</p> <p>药用部分：全草、花入药，夏秋采收。</p> <p>用途：根性味苦、辛、温，有小毒。能消风祛湿，行气化痰，解毒止咳。治腹痛腹泻，痲肿，关节痛，烫火伤，外伤出血，跌打损伤。用量：根3~5钱。</p>
774	铺地蜈蚣	伸筋草，小伸筋，凤尾伸筋，绿毛伸筋，筋骨草。	石松科	<p>植物形态：多年生蔓性常绿草本；茎初时横走，匍匐地面，后渐直立，高可达60厘米，呈叉状分枝；主枝带木质。叶细小，螺旋状排列，叶线状锥尖形，长2~3毫米，全缘，先端锐尖。孢子囊穗多数，无柄，着生于小枝顶端，稍下垂，圆柱形，卵形或近球形，长2~20毫米，直径2~3毫米；孢子叶三角状卵形，顶端长削尖，边缘有多数睫毛；孢子囊肾形，外有网纹。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部；多生于松林边，荒山草地。</p> <p>药用部分：全草入药，全年均可采收。</p> <p>用途：性味淡、平，无毒。祛风利湿，舒筋活络（孕妇慎用）。用量：4钱~1两。</p>
775	伞花八仙	土常山，甜菜。	八仙花科	<p>植物形态：落叶灌木，高可达3米。树皮灰褐色，粗糙，剥落性；小枝有白色的髓，幼枝赤褐色，疏生白色柔毛，后渐无毛。叶对生，长椭圆状披针形、卵状长椭圆形或倒卵形，长6~12厘米，宽2~4.5厘米，基部楔形，先端渐尖或骤尖，表面浓绿色，疏生白色柔毛，沿脉上较密，至老渐稀，背面淡绿色，散生白色短硬毛，平贴，在脉上尤密，脉腋间并具丛生须毛，边缘具锐锯齿或细锯齿，近叶基常全缘或呈浅波状，侧脉呈弧形斜上，于下面和主脉显著隆起。花黄色，顶生复伞状伞房花序，花序周围为较大的不孕性花，萼3~4片，扩大呈花瓣状；花序中央有较小的孕性花，萼、花瓣均4片，雄蕊7~10枚，子房半下位，3室。蒴果球形，顶端开裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生欲山坡疏林内，沟谷丛林中。</p> <p>药用部分：根、叶入药，夏秋采集。</p> <p>用途：治疟疾。</p>
776	摩来卷柏	黄叶狼鸡草, 花叶	卷柏科	<p>植物形态：多年生常绿草本，茎直立，高达30厘米，禾秆色或稍带红色，</p>

		野鸡尾，岩柏草。		<p>基部生根，茎下部不分枝部分长5~10厘米，叶稀疏贴伏茎枝上，鳞片状卵圆形，先端有短尖芒，上部分枝羽状，叶两型，侧叶分两行排列于分枝的两侧，叶片两侧不对称，先端急尖，长约2.5毫米，宽约1.75毫米，上半部卵圆形，边缘白色，有缘毛状齿牙，下半部长圆状披针形，基部心脏形，边缘有疏齿；中叶较小，成两行排列于小枝的上面，叶片卵圆状椭圆形，长约1毫米，宽约0.5毫米，先端渐尖有芒，中脉明显，边缘白色并有缘毛齿牙，孢子囊穗单生于枝顶；孢子囊2型，单性同株，单生于孢子叶腋，横向，2瓣裂，大孢子囊通常含有大孢子4个；小孢子囊有多数小孢子。两种孢子均为球圆形四面体。</p> <p>生态分布：产我国中部、南部至西南各省；多生于山坡岩石边，林下，沟谷丛林下。</p> <p>药用部分：全草入药，全年均可采收。</p> <p>用途：性味微辛、淡平，无毒。能清热解毒，治吐血，痔疮出血，淋病，火烫伤及刀斧伤出血。又治传染性肝炎。用量：1~2两。</p>
777	薤	胡葱，薤头。	石蒜科、百合科。	<p>植物形态：多年生草本，高可达80厘米，须根多数。鳞茎，卵状长椭圆形，长1.5~3厘米，鳞被白色膜质。叶管状，2~6枚，基生线形，长达40厘米，宽约0.2厘米、中空，有不明显的线棱，灰绿色。花紫红色，伞形花序生于花茎顶端，花茎柔软，半圆形，与叶等长或稍长，花被6片，雄蕊6枚，子房上位，3室。蒴果球形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：鳞茎入药，春夏季采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、温、滑，无毒，能散胸部寒滞，滑肠。用于痢疾及麻疹不出。用量：1.5~3钱。</p>
778	薏苡	川谷，菩提子，尿端子，回回米，瞎眼子树，催生子，尿珠子，蓼茶子，薏米。	禾本科	<p>植物形态：多年生草本，高1~1.5米。茎丛生，直立，粗壮，多分枝，基部节上生气根。叶互生，线形至披针形，长8~40厘米，宽1.2~4厘米，先端渐尖，基部钝圆，边缘粗糙具短刚毛，表面绿色，背面浅绿色，主脉粗壮明显，两面无毛，叶鞘光滑抱茎。花单性同株，腋生穗状花序，雄穗在上，雌穗在下，雄小穗复瓦状排列于穗轴的每1节上，成上举或下垂的总状花序；雌小穗包藏于球形的骨质总苞内，成熟时白色，内含1颖果。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于山谷、溪边、水沟边。</p> <p>药用部分：全草、果实、根入药，秋季叶转黄、果实成熟时收获，全草夏秋可采用。</p> <p>用途：性味甘、淡、微寒，无毒。能清心肺隔热，利小便，通经，驱蛔虫，逐水祛湿。种子能催生堕胎，治沙石热淋，消渴，水肿，黄疸，月经不调，小腹胀。又可治膨胀症，大便秘结，软脚症，小牛排白粪及猪丹毒症。用量：种仁3钱~1两。</p>
779	薄荷	蕃薄荷	唇形科	<p>植物形态：多年生小草本，有香气，高达50厘米。茎下部匍匐，节上生不定根，上部直立，四方形，具逆生茸毛，尤以棱节处较密。叶对生，具柄，叶片披针形至卵形，长2~7.5厘米，宽0.5~2.5厘米，边缘有锯齿，基部楔形，先端尖锐，两面被疏毛及油点，沿脉处毛较密，表面浓绿色，背面较浅。花淡红或淡紫色，轮生于叶腋，呈轮生状的密穗状花序，花萼钟形，5裂，花冠唇形，上唇1片，下唇3裂，雄蕊4枚，子房上位，4裂。小坚果4个，椭圆形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味辛、微苦、凉、气香，无毒。能散风发表，解热镇痛，清头目，利咽喉。治感冒风热，温病初起，头目昏痛，咽喉牙痛及皮肤瘾疹等症。用量：1~3钱，作浸剂或煎剂。</p>
780	薜荔	木莲，桔杷，糖馒头，文头果，木瓜	桑科	<p>植物形态：常绿攀缘木质藤本。皮部富乳汁，小枝有毛，节上常生气根，借以攀缘于树皮上、岩石或墙壁上。叶大小悬殊较大，幼枝上的叶小而</p>

		藤，络石藤，馒头果。		<p>质薄，卵形至椭圆状卵形，长约2厘米，基部偏斜，先端钝圆，全缘，无柄；老枝坚硬直立，节明显无气根，有点状皮孔，叶互生，大而质厚，倒卵形或椭圆形，长3~8厘米，宽2~3厘米，基部圆形或心形，表面光滑，背面有毛，侧脉5~6对，最下1对和主脉成为三主脉状，背面网脉显著，形成小蜂窝状；叶柄粗而短，托叶早落。花细小单性，包藏在单生叶腋而似梨果的肉质花托内，称为“隐头花序”花序顶端有1小孔；雄性的隐头花序顶端凹平，内藏雄花和虫瘿果，雌性的隐头花序顶端平而稍凸起，内藏多数雌花（种子花）。果为瘦果，藏在雌性隐头花序内，油隐头花序发育而成为肉质的假果，称“无花果”或“癭头果”。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多附生于老树上、墙壁上或岩石上。</p> <p>药用部分：乳汁、叶、果（隐头果）入药，幼枝叶作为“络石藤”，秋季或全年均可采收。</p> <p>用途：性味甘、涩、平。茎、叶能活络舒筋，除风湿，解热毒，安胎，辽痈肿，并外敷刀伤。果实壮阳固精，下乳，又治久痢，痔疮。用量：茎叶1~4钱；果实8分~1钱5分。</p>
781	蕹菜	空心菜	旋花科	<p>植物形态：一年生蔓性秃净草本。茎中空，匍匐于地上或浮于水上。叶具长柄，长椭圆状卵形或椭圆状长椭圆形，长6~15厘米，基部截形、心形或戟形，先端短尖或钝，边缘全缘或波状。花白色，腋生，萼5裂，花冠漏斗状，5裂，雄蕊5枚，子房上位，2~4室。蒴果卵形，有种子2~4颗。</p> <p>生态分布：产我国南部。</p> <p>药用部分：全草及根入药，夏秋采用。内服解饮食中毒，外用治一切胎毒肿物和扑伤。</p> <p>用途：性味淡、凉，无毒。治妇女白带，血淋，盗汗，久咳，吐血，痈疮及食物中毒。用量：全草一般鲜用4两~半斤。</p>
782	薯蓣	红孩儿，孩儿血。	薯蓣科	<p>植物形态：多年生常绿藤本，茎缠绕性，稍带革质，块根肉质含胶液，长圆形，有时分枝，多须根，外紫黑色，内棕红色，粗裂具疣点和凹纹。茎圆柱形，通常分枝，平滑无毛，近基部有刺。叶革质或近革质，叶形多变化，下部叶通常较大，互生，线状披针形或阔心形，长达20厘米，宽约16厘米，基部圆或截形，先端微凸，全缘；表面光滑，绿色，主脉明显，背面浅绿色，叶柄基部扭曲；上部叶对生，较小，卵形或线状披针形，基出脉9条，网脉显著。花单性腋生，穗状花序或圆锥花序，雄花花被6片，雄蕊6枚，雌花花被6片，子房上位，3室。蒴果具3翅，3瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国长江以南至南部各省，多生于山坡或沟谷林边灌丛中。</p> <p>药用部分：块根入药，四季均可采收。</p> <p>用途：性味苦、平，无毒。活血，补血，止痛，散气。主治筋骨痛，关节痛，腰痛，内伤吐血，贫血等症。用量：4分~3钱。</p>
783	糙叶树	牛筋树，加条。	榆科	<p>植物形态：落叶乔木，高可达18米。树皮黄褐色，有灰色斑纹与皱纹，老时纵裂。叶互生，卵形或卵状长圆形，长6.5~12厘米，宽3~6厘米，基部圆形或阔楔形，顶端渐尖，边缘有锯齿，两面有粗糙平贴毛，基部叶脉3出，侧脉直而与基脉平行，顶端直达锯齿缘，叶脉在表面凹陷，背面凸出，托叶线形。花黄绿色，单性，与叶同时开放或先叶开放；雄花腋生伞房花序，花被、雄蕊均5数，雌花单生于枝顶或叶腋，花被5裂，子房上位，1室。核果球形，熟时黑色。</p> <p>生态分布：产我国山东、长江流域至南部各省；多生于山坡林中，沟谷溪边，公路边，村落附近也有生长。</p> <p>药用部分：根皮、树皮入药，夏秋采收。</p> <p>用途：治腰部损伤疼痛。</p>
784	爵床	观音草，疳积草。	爵床科	<p>植物形态：一年生草本，匍匐或倾斜，高达30厘米。茎有4棱，多分枝，有灰白色细柔毛，节部稍膨大。叶对生，卵形或长椭圆状卵形，长1~3.5厘米，宽6~18厘米，基部楔形，先端钝尖，全缘；表面深绿色，背面淡绿色，两面疏生细毛，叶柄长约5毫米，密生细毛。花粉红色或紫红色，顶生或腋生多苞片的穗状花序，萼片5枚，花冠唇形，上唇2浅裂，下唇3</p>

			<p>裂，雄蕊2枚，子房上位，2室。蒴果线形。</p> <p>生态分布：产我国南部各省；多生于山坡林边草地中，沟谷丛林边，路边湿地，村落城镇庭园中也极为常见。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味咸、寒，无毒。能除热，通血脉，祛湿消毒。治腰脊病，血胀，创伤，疟疾等。用量：5钱~1两。</p>
785	繁缕	鹅儿肠，鹅肠菜。	<p>石竹科</p> <p>植物形态：一年生草本，高达20~40厘米。茎细长多分枝，下部偃伏，上端直立，一侧有细毛1行，余侧光滑无毛。叶对生，下部的有长柄，卵圆形，基部圆形或浅心形，先端突尖，全缘或呈波状，两面无毛，上部的叶无柄，椭圆形或披针形。花白色，两性，腋生或顶生聚伞花序，萼片、花瓣均5片，花瓣短，深2裂，雄蕊10枚，子房上位，花柱3枚。蒴果卵形，萼宿存。</p> <p>生态分布：产我国中部和东部各省；多生于路边草地，田边或村落城镇庭园中。</p> <p>药用部分：茎、叶、种子入药，春夏采收。</p> <p>用途：性味酸，平。能破血，解毒，利尿。治产后腹中瘀痛，治痔疾及阴茎溃烂。又为净血剂，去分娩后之子宫收缩痛，并能促进乳汁的分泌。</p> <p>用量：1.5~3钱。</p>
786	樟树	梓木，枫荷桂，天 鹅枫。	<p>樟科</p> <p>植物形态：落叶大乔木，高可达35米。幼时树皮黄绿色，平滑，老时变灰褐色，成不规则的纵裂；小枝有毛，后渐脱落。叶互生或聚生于新枝的顶部，薄革质，叶片多态，阔卵形至椭圆形，或上部2~3裂，长10~22厘米，宽4~15厘米，基部楔形，有时两侧不对称，先端渐尖或急尖，表面深绿色，幼时有毛，后变光滑，下部2条侧脉特大，与中脉合成为离基3出脉，直达各裂片顶端，下面显著隆起；叶柄长1~5厘米。花小，黄色，杂性异株，先叶开放，顶生总状花序，花被6裂，发育雄蕊9枚，不育雄蕊3枚，药4室，子房下位，1室。核果球形，呈兰黑色，果梗淡红色，肥大呈棒状。</p> <p>生态分布：产我国长江流域中下游各省；多散生于阔叶树林中。</p> <p>药用部分：树皮、叶、根及根皮入药，秋后采集。</p> <p>用途：性味甘、淡，微温。祛风逐湿，活血散瘀；治扭伤筋骨及半身不遂。用量：5钱~1两。</p>
787	韩信草	耳挖草，铁灯盏， 大力草，印度黄 芩。	<p>唇形科</p> <p>植物形态：多年生被毛草本，高达25厘米。茎基部伏地，上部直立。叶互生，具柄、卵圆形，长1.5~2.5厘米，基部截形或近心形，先端钝、边缘有齿。花蓝色，顶生总状花序，稍稠密，萼钟状，2唇，结果时上唇的附属体增大，膜质，常为紫红色，花冠唇形，5裂，雄蕊2枚，子房上位，2室。小坚果有小凸点。</p> <p>生态分布：产我国中部、东部、南部各省；多生于山坡丛林边，荒山草地，村落、城镇庭园边偶有生长。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味微苦、辛，平。治跌打损伤，祛风，壮筋骨，治蛇咬伤，散血消肿。用量：3~5钱。</p>
788	蟋蟀草	鸭脚草，牛筋草。	<p>禾本科</p> <p>植物形态：一年生丛草本，秃净，高达60厘米，秆直立或基部伏地，扁平，叶二列式互生，线形，长10~30厘米，宽3~7厘米，叶鞘松弛，扁平，秃净或被睫毛，鞘口有毛。花绿色、顶生指状穗状花序2~7枚、小穗有小花3~6朵，颖不等长，第一颖有脉1条，较小，第二颖和外稃有脉3条。颖果长椭圆形或近三角形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域至南部各省；多生于旷野、路边、草地中，村落、城镇庭园中也有生长。</p> <p>药用部分：全草或根入药，夏季可采。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。能祛风胜湿。主治小儿消化不良，黄疸型肝炎，外伤出血，跌打损伤，疝气，风湿性关节炎。用量：全草5钱~1两。</p>
789	藜	灰苋菜，灰灰菜。	<p>藜科</p> <p>植物形态：一年生草本，高可达3米。茎直立，有棱角和绿色条纹，通常带红紫色，幼枝叶均被有灰色霜粉。叶互生，下部的叶片为棱状三角形，</p>

				<p>基部宽楔形，先端钝，边缘具有大牙齿或不规则的浅裂，叶柄长；上部的叶片呈披针形，尖锐，稍有牙齿或全缘，表面绿色，背面灰色带紫红色，两面均被霜粉，尤以下面和幼枝为多。花黄绿色，顶生圆锥花序，花被5片，卵形，背面被霜粉，雄蕊5枚，子房上位，2心皮。胞果完全包在花被内。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于路旁，荒地或山坡湿地。</p> <p>药用部分：幼嫩的全草入药，春夏采收。</p> <p>用途：全草性味甘、平。能杀虫，外用煎汤洗虫疮，捣烂涂诸虫伤，去癫风。果实性味甘、苦，寒。利水通淋，除湿。用量：全草、果1~3钱。</p>
790	藜芦	棕包兜，邢氏藜芦，铁扁担，人头发。	百合科	<p>植物形态：多年生草本，地下具多数肉质细长宿根。茎直立，高达1米，基部较粗，常包被有由叶鞘腐烂后残存的细长棕状纤维。叶互生，根出叶通常1~4枚，长卵形至椭圆形，叶脉纵列，叶片常呈折扇状，稍带革质，两面均无毛，基部呈鞘状而抱茎，先端渐尖，全缘，茎生叶披针形，无柄，先端尖，在总花轴上叶渐细小而呈苞片状。花褐绿色或褐黑色，杂性，顶生圆锥花序，雄花多生上部，两性花在下部，花被6片，雄蕊6枚，子房半下位，3室。蒴果三角形。</p> <p>生态分布：产我国长江流域下游各省；多生于山坡林下湿地、沟谷丛林下、溪边灌丛中。</p> <p>药用部分：根入药，冬春采收。</p> <p>用途：性味辛、苦、寒，有毒。根可治高血压，吐风痰，定癫痫，补气止汗，能治自汗盗汗；外用搽疥癣恶疮；并作杀虫剂及农药。用量：5分~1钱。孕妇忌用。</p>
791	瞿麦	野麦	石竹科	<p>植物形态：多年生草本，全体光滑无毛。茎丛生，有节，上部分枝，高达60厘米。叶对生，基部连合，抱茎；叶片线状披针形，长2.5~6厘米，先端尖，有3~5脉。花淡紫色，有香气，顶生聚伞花序；萼筒状，5裂，花瓣5片，边缘细深裂，雄蕊10枚，子房上位，1室。蒴果圆柱形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡疏林边，荒山草地，溪边草地中。</p> <p>药用部分：全草入药，夏秋采收。</p> <p>用途：性味苦、寒。能利尿；治水肿及淋症，膀胱或肾脏出血、疼痛。通经利尿，治闭经。过量可致孕妇流产。用量：1.5~3钱。</p>
792	翻白草	叶下白，鸡爪莲，鸡腿根，茯苓草。	蔷薇科	<p>植物形态：多年生草本，高可达30厘米。根粗壮，呈纺锤形，两端尖，表面暗褐色；根茎短，不明显。根出叶丛生，平贴地面，奇数羽状复叶，有长柄，密生灰白色长柔毛；小叶2~5对，顶端小叶最大，两侧小叶向下渐小，长椭圆形，边缘有锯齿，表面深绿色，疏生细长毛，背面密生白色绵毛，茎生叶为3小叶，与根生叶相似，脉羽状，表面下陷，背面凸出。花黄色，顶生聚伞花序，付萼5片，花萼5裂，花瓣5瓣，雄蕊多数，雌蕊多数分离，子房上位，各1室。瘦果多数，细小，卵形或带肾形。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡，路旁，田畔草地中，村落城镇庭园中也常有生长。</p> <p>药用部分：全草及根入药，夏、秋、冬季采收。</p> <p>用途：性味甘，苦。有凉血解毒，止血，解热之效；治吐血，下血，崩中诸出血症。又治间歇热及阿米巴痢疾。用量：根1.5~3钱。</p>
793	藿香	土藿香，排香草。	唇形科	<p>植物形态：一年生草本，高达1.2米，全体有芳香。茎直立，方形，稀生细毛，枝向上伸展。叶对生，叶柄细长，叶片卵形或三角状卵形，基部圆或平截，或稍呈心形，先端长尖，边缘有粗锯齿，两面均有毛，且密生圆形鳞腺。花淡紫色，顶生总状轮生花序，萼钟形，有15条显明纵脉，5裂，花冠长漏斗状唇形，5裂，雄蕊4枚，2强，子房上位，4室。小坚果黄色，长方状，上端具长细毛。</p> <p>生态分布：产我国南北各地；多生于山坡林边湿地，路边，田边，溪边，村落附进也有生长。</p> <p>药用部分：大伏天时连根拔起，立即扎把曝晒，晚间堆叠，闷1夜再晒干，干后切去根，如欲收子，则至立冬，老熟后，剪下果蕙晒干搓籽。</p>

				用途：性味辛、温，无毒。能去恶气，开胃进食，温中快气，理气发汗，醒脾和胃，辟恶止呕；治霍乱，心腹痛，呕吐，暑天口渴头昏，小便黄或闭经。用量：全草1.5~3钱。
794	穰荷	土里开花，阳藿，野山姜。	穰荷科	<p>植物形态：多年生草本，高达1米余。根较粗，有须根；根茎多节，地下横行，淡黄色或白色。叶2列式互生，质薄，长椭圆状披针形，长16~38厘米，宽5~7厘米，全缘，基部楔形，先端尖锐，叶鞘绿色。花淡黄或白色，穗状花序，生于叶丛下的极短花茎上，不易发觉，萼管膜质，3裂，花冠管细长，雄蕊1枚，退化雄蕊2枚，子房下位，3室。蒴果球形，红色，3瓣裂。</p> <p>生态分布：产我国长江流域各省；多生于山坡林边湿地，沟谷丛林下。</p> <p>药用部分：根茎、花、嫩芽入药，夏秋采收。</p> <p>用途：根茎性味辛、淡、温，无毒。能治老年咳嗽、气喘，虚性白浊，妇人血寒经冷及月经不调等症。用量：根茎1~2两。</p>
795	魔芋	花杆莲	天南星科	<p>植物形态：多年生草本，地下有扁球形肥大球茎，茎多肉，圆柱形，具有褐色及暗紫色斑，高达1米。叶根生，大形，3回掌状复叶，小叶又作羽状全裂，叶轴具不规则的翅，小裂片披针形，长4~8厘米，基部楔形，先端尖，叶脉网状。花单性，淡黄白色，为顶生肉穗花序，生于佛焰苞内，上部多为褐色雄花，下部为多数红紫色雌花。浆果球形或扁球形，密集成圆柱形的果穗。</p> <p>生态分布：产我国中部及南部；多生于山沟、溪旁湿地及林下。</p> <p>药用部分：球茎入药，秋季采收。</p> <p>用途：性味辛、温、麻，有毒。能杀虫，利尿。治痈肿，风毒，消渴，疟疾，并可预防蛇咬。用量：5钱~1两。</p>
796	山羊	青羊，山羊。	牛科	<p>动物形态：体健壮，身长1.2米左右。头短，鼻端无毛，耳尖狭，雌雄羊的角等长，短直较小，色黑，长约10~14厘米，向后曲伸，较头部为短，有环状棱，左右角基接近，颈背无鬃毛，下颌无胡须。四肢健壮，蹄阔，尖端钝，椭圆形，悬蹄离地高。尾长10~14厘米。体毛厚软，呈棕灰色，耳廓内和喉部均白色，四肢前缘灰白色；夏季毛色比冬季晦暗。</p> <p>生态分布：全国各地有饲养。</p> <p>药用部分：山羊血和雄羊尿（百草丹）入药。</p> <p>用途：山羊血性味温、咸，无毒。能活血散瘀，续筋接骨，止咯血，吐衄。治跌打损伤，筋骨疼痛及一切痈肿。用量：1~2钱。兑酒服或为丸服。</p>
797	土鳖虫	地鳖，地鳖虫，土别，地乌龟。	地鳖科	<p>动物形态：全体呈扁卵形，长约22毫米。雌雄异形，雄虫有翅，雌虫缺翅。头部细小，藏在前胸下，向后倾斜，触角较短，线状，复眼1对，肾形，位于触角外侧，单眼2个，口器发达，咀嚼式。前胸宽大如盾，盖住头的全部。足3对相似，基节宽大，胫节具趾，跗节为5小节，腹部10节。尾须1对较短，分节。雄虫第0腹节有刺突1对，背部灰褐或黑褐色，腹部及足带红褐色。</p> <p>生态分布：全国各地有出产。主要生于灶墙脚下及墙角阴湿松土中。</p> <p>药用部分：全虫入药，5~8月捕捉，沸水烫死晒干或烘干。</p> <p>用途：性味咸、寒，有毒。能活血通经，消症瘕，止久疟。治筋骨折伤，妇女月经闭止，乳汁不通等症。孕妇及出血病患者忌用。用量：8分~1钱5分。</p>
798	五谷虫	大粪蛆	原动物为大头金蝇，丽蝇科。	<p>动物形态：五谷虫系大头金蝇的幼虫生长在粪坑内无尾的大粪蛆。黄白色，躯体分14节，头部1节，胸部3节，腹部10节，单通常只见8节。</p> <p>生态分布：全国各地均产。</p> <p>药用部分：全虫入药，夏秋收集。</p> <p>用途：性味咸，寒。能清热解毒，消积导滞。主治热病神昏，毒痢作呕，小儿疳积，痈肿疔疮。用量：5分~1钱。</p>
799	水蛭	细齿蚂蝗，水蚂蝗，金边蚂蝗。	水蛭科	<p>动物形态：细齿蚂蝗体长3~4厘米，略呈半圆柱形。背面稍拱，腹面扁平，体前端腹面有口，口能吸着外物，称为口吸盘，又叫前吸盘；体后端腹侧有1圆盘状吸盘，叫后吸盘，背侧有肛门。能由2吸盘交互吸着。作尺蠖行，或借肌肉收缩而游泳。头部特别细小，体环24节，眼5对排成弧形，</p>

				<p>背面黑绿色，中线上有淡黄色纵行条纹，腹面具暗灰色斑点。</p> <p>生态分布：我国各地池沼及水田中有生长。</p> <p>药用部分：水蛭的干燥体。</p> <p>用途：性味苦、咸、平，有毒。能破血通经，消胀除积。治妇女血滞经闭，症瘕积聚及跌打损伤等症。用量：3~5分，作煎剂或散剂。</p>
800	水牛	无	牛科	<p>动物形态：水牛为大家畜，体壮，蹄大，额方，鼻宽，嘴向前伸，下额和颈几乎与地面平行。公母牛皆有角，角呈方楞状或成三角形，弧形对生，角面多带纹。上颌无门齿及犬齿，白齿皆强大，颈较短。体躯肥满，腰隆凸，四肢强健，肢具四趾，各有蹄，前2趾着地，后2趾不着地而悬蹄。毛粗硬，稀疏，皮毛黑灰色而有光泽，冬季则为青灰色，品种不多，毛色以灰青、石板青为多，黑色、黄褐色为少，纯白色则较罕见。</p> <p>生态分布：全国各地均有饲养。</p> <p>药用部分：角入药。</p> <p>用途：水牛角性味苦、咸、寒，无毒。治风热头痛，喉头红肿，小儿惊风，及吐血等症。用量：5分~1钱，作煎剂或磨粉用。</p>
801	水鸭	绿头鸭，水鸭，野鸭，大麻鸭。	鸭科	<p>动物形态：体形似家鸭，体长48厘米。雌雄异色，雄鸭头颈呈金属绿色，颈下部具不完整的白色环纹，背黑色，两翼暗褐色，并具鲜明的紫蓝色翼镜，胸紫栗色，下体灰白，有灰褐色小斑，中央尾羽黑色并显蓝色光辉，羽端向上卷曲，尾下复羽绒黑色。雌鸭较小，上体及两翼黑褐色并具棕黄色的羽缘或横斑，下体棕黄，黑褐部分成斑点，中央尾羽末端不向上卷。</p> <p>生态分布：水鸭为冬候鸟，我国南部平原湖沼及河川地区为其迁居地点。</p> <p>药用部分：鸭掌、咀壳、鸭肉、鸭毛均入药。</p> <p>用途：水鸭毛性味咸、平，无毒。能解毒退火，可治汤火灼伤。脚掌及咀、壳治妇人月后寒。</p>
802	乌鱼	乌棒，七星鱼。	鳢科	<p>动物形态：体呈圆筒形，长可达60厘米。头部上下扁平，尾部左右侧扁，体侧有多数深浅杂交的黑色斑点，头部的鳞片很明显，侧面有黑条纹。口大、牙尖、眼小，无触须，背鳍和臀鳍很长，无硬棘，有腹鳍，胸位、尾鳍呈圆形。</p> <p>药用部分：活乌鱼。</p> <p>用途：性味甘、寒，无毒。治湿痹，疗面目浮肿，利大小便；亦治肠痔下血，又能预防小儿麻疹。用量：4~8两。煮汤服或煎汤外洗。</p>
803	乌鸦	老鸦	鸦科	<p>动物形态：体长约35厘米，咀大，近端缺刻，有咀须，无蜡膜，跗蹠后缘呈棱状，后列鳞联成整片，后爪比中爪大。全身黑色，上体有绿色光辉，翼圆，并有紫色光辉，喉部羽毛尖锐，嘴跗蹠和爪均为黑色。</p> <p>生态分布：我国各地有分布。</p> <p>药用部分：乌鸦肉入药。</p> <p>用途：乌鸦肉性味酸、咸、平，无毒。治老人头风，头风目黑，小儿疯狂，癆伤吐血。用量：6~12两或1只，炖汤服。</p>
804	田螺	螺蛳	田螺科	<p>动物形态：螺塔和螺口约为55~60毫米，螺口略大于螺塔，右旋，壳薄，顶端骤尖，壳外表除生长线外都很光滑，没有肋纹。螺口有厣，如瓶盖。行动时伸出腹足，腹足甚发达，头部明显，背面两侧各有1个尖针状的触角，收缩性不强。眼生于触角基部外侧的短柄上。雄性的输精管从右触角的先端开口，所以较左触角粗短；雌性的触角左右相等，由此可以区分雌雄。和它相近的种叫胡螺，螺塔略长，身体稍小。</p> <p>生态分布：遍布我国各地，多生于水田、池沼或小河沟中，凡有水田的地方几乎都有生长。</p> <p>药用部分：田螺的外壳，厣和肉。</p> <p>用途：性味甘、咸、寒，无毒。能清腹中结热，压丹石毒，利大小便。治黄疸，反胃；汁滴入耳心，治耳心痛，还可搽痔疮。用量：肉2~4两，炖汤服；壳3~4钱，水煎服或烧存性外搽。</p>
805	石膏	土石膏	无	<p>性状：本品呈不规则的块状，略呈棱柱形，厚薄不一，色白，微透明，</p>

				<p>略带淡紫红色的光泽，并有马尾丝状的明显结晶，质松绵，易剥碎，以块头厚，色泽明亮，质松和无杂质者为佳。产江西泰和等地。</p> <p>用途：性味辛、甘，寒。能清热降火，止渴解烦，解肌生津，治阳病壮热，自汗烦渴，口腔发炎，肺热喘急，发斑发疹，牙龈肿痛，外治金疮、肿疡及湿疹等症。（内服生用，外用宜煨）。用量：2~3钱。</p>
806	朱砂	朱砂,辰砂,丹砂。	无	<p>性状：本品通常为鲜红色，质极重。一般大小厚薄不均的板片状，或是不规则的块状、粒状与土状等；纯品鲜红，色越鲜红越好。打碎后，吸去铁屑，水飞应用。</p> <p>分布：常呈矿脉产于石灰岩、板岩、砂岩中。</p> <p>用途：性味甘、微寒，有小毒。能镇心安神，定惊，解毒。治心神不安，惊痫癫狂，失眠多梦；外用治咽喉肿痛，痈疽疮疡。用量：1~3分。本品不宜多服久服。</p>
807	朴硝	皮硝，芒硝	无	<p>性状：呈暗白色圆柱状或不规则块片状，颗粒状结晶体，置空气中易失去水分而成白粉状（风化硝），易溶于水，不溶于酒精。</p> <p>分布：由盐碱地产的硫酸钠经精制而成；在秋冬季节，碱质地面生出白霜，刮取后放入锅内加水煮炼，经过结晶，上面细芒如锋状的称芒硝，下面结晶较粗的称朴硝。</p> <p>用途：性味苦、咸，寒。能润燥软坚，荡涤肠胃实热积滞。治肠胃实热积滞，停痰痞满。孕妇忌用。用量：1~3钱。</p>
808	伏龙肝	灶心土	无	<p>性状：本品为多年锅灶不规则的块状泥土，呈黄褐色，表面具刀削痕，有时具蜂窝窝状的孔隙。质较硬，但可砸碎。</p> <p>用途：性味辛，温。能温中燥湿，止吐，止血。治虚寒泄泻，呕吐反胃，吐血，便血，崩中带下等症。用量：5钱~1两。</p>
809	百乌不停蠹虫	倒长刺虫，斗米虫。	无	<p>动物形态：系寄生于百乌不停（五加科的惚木）树心内的一种白色昆虫，形如小蚕。</p> <p>药用部分：全虫入药，秋冬季采收。</p> <p>用途：性味咸，寒。能清凉解毒，散节，定惊。主治痈疔毒，麻疹，癫痫。用量：1~2条。</p>
810	血余	人头发灰，血余炭。	无	<p>性状：本品呈不规则的块状，略似干漆。大小不等，黑褐色，略带光泽，具有多数大小不等的小孔洞。体质不甚沉重，质脆，以手搓之则成黑色粉末，撒在水面久后下沉，嗅之有头发烧焦了的焦臭气味，以煨存性者为佳。</p> <p>用途：性味苦，微温。能通便利窍，止血，和血，祛瘀。治咳嗽吐血，流鼻血，血崩，疗五淋，血痢，齿缝血及转胞不通等症。用量：2~4钱。</p>
811	地龙	蚯蚓	蚯蚓科	<p>动物形态：体呈圆筒形，长约13.5厘米，粗0.5厘米，体为110~138节，雌雄同体。环带位于14~16节，生殖时期为苍白色。雄性生殖孔1对，位于18节，在腹面两侧隆起，呈乳头状；雌性生殖孔1个，位于14节，在腹面正中。除环带各节环生刚毛，甚短，肉眼不易看见。背面深绿色，中央有紫色纵条纹，腹面灰白色。</p> <p>生态分布：全国各地分布甚广，生于多腐殖质的沙质土中。</p> <p>用途：性味咸、腥、寒，有小毒。能清凉利尿，镇痉活络。治高热发狂，小便不通，高血压，动脉硬化，风湿病，惊搐及半身不遂等症。用量：研末1~3钱，生捣服1~10条。若用大蚯蚓则1~2条，作散剂或汤剂服。</p>
812	龟	金龟，乌龟。	龟科	<p>动物形态：体外具椭圆形的硬壳，壳的前后端各有一个大孔，头尾和四肢都可由此伸缩。硬壳可分为背甲、腹甲，后缘呈三角形凹状，各由大型的角质板和骨质板所组成，骨质板跟躯干部的背柱和肋骨愈合，硬壳是骨骼组成部分。吻较尖，无齿，上下颌有角质鞘，边缘锐利，能够咬断食物，头顶后部复以颗粒状的皮肤，头部前端上方有眼和鼻。四肢短，略扁平，具5趾，趾间有蹼，趾具爪，尾长且尖。背甲栗黄色，有3条纵隆起，中央的最显著，且为黑褐色。头、颈、四肢及尾均为橄榄色，头的两侧有少数黄色线状条纹，下颌有不规则的黄色线纹和斑点，颈上有由黄色斑点组成的线纹，腹甲深褐色，腹甲后缘、前缘及部分缝线均为</p>

				<p>淡黄色。</p> <p>药用部分：乌龟整体、龟板、龟尿、龟血、龟肉等。</p> <p>用途：龟板（龟的背腹甲板）性味甘、咸、寒，有小毒。能滋阴降火，潜阳退蒸。治肾虚遗精，骨蒸癆热，崩漏带下，久咳久疟，痔疮漏症及小儿囟门不合等症。用量：2~5钱。龟肉治女子干病，老人尿多，流血不止。</p>
813	鸡	无	雉科	<p>动物形态：鸡为家禽中最普通的一种。咀短，上咀稍弯曲，鼻孔被鳞状瓣，为裂状；眼具瞬膜，头部有冠及肉瓣，此肉冠及肉瓣雄大雌小，翼短小，不能高飞。两脚健壮，跗蹠及趾皆被鳞板，趾4个，后趾短小，比前趾所生处较高，雄鸡跗蹠后方有距。尾发达，独雄有摇羽。雄体比雌体大，羽毛亦较美。羽毛以淡黄色为基本色，余从纯白到纯黑，无不应有尽有。冠形也是各种各样。</p> <p>药用部分：鸡内金（鸡的砂囊内膜）、凤凰衣（为雏鸡孵出后卵壳的内膜），鸡血、鸡蛋等，均入药。</p> <p>用途：鸡内金性味甘，平。能健脾止痢，帮助消化；治胸腹饱闷，食积不消，噎气腹鸣，反胃呕吐及肠鸣泻痢等症。凤凰衣，性味甘、温，无毒。能理气，消翳障；治久咳气急，目中生翳，失音，反胃，并涂疮毒。用量：1~3钱，作煎剂或散剂。</p>
814	苍耳蠹虫	麻虫，苍耳虫，野落苏虫，秋分虫。	无	<p>动物形态：系寄生子苍耳草（菊科植物）茎中的一种白色昆虫，形如小蚕，又似五谷虫。</p> <p>药用部分：全虫入药，秋分前五天采收。</p> <p>用途：性味咸，寒。能清火解毒；主治各种疔疮疖毒。用量：2~3条。</p>
815	青鱼	钢青	鲤科	<p>动物形态：青鱼外形很象草鱼，略呈圆柱状，稍侧扁，体光滑，背面和鳍都为显著的黑色，，腹面呈白色；胸复鳍各1对，背鳍条有7根，臀鳍条8根，硬棘都没锯齿，侧线鳞41片。尾叉形，口部无须，有咽齿1行，作臼齿状，这是和草鱼不同的地方。</p> <p>生态分布：全国各养鱼池及池塘均有饲养。</p> <p>药用部分：取胆囊，结扎管的上部，挂起晾干供药用。</p> <p>用途：性味苦、寒，无毒。治目赤肿痛及喉痹蛾子，并涂恶疮白秃。用量：5分~1钱，作煎剂或外涂。</p>
816	青蛙	蛤蟆，黑斑蛙。	蛙科	<p>动物形态：背面绿色或橄榄绿色，背面的基色为黄绿色或深绿色或带灰棕色，具有不规则的黑斑，背中央常有一条宽窄不一的浅色的纵脊线；四肢背面有黑色横斑，股后方无纵纹，而只有几条横纹。腹面白色无斑。</p> <p>生态分布：我国各地池塘、水沟及水田中均有分布。</p> <p>药用部分：青蛙肉，青蛙胆。</p> <p>用途：性味甘，平。能补虚，退热。</p>
817	泥鳅	鱼鳅	鳅科	<p>动物形态：体呈圆筒形，长可达17厘米。遍体黄褐色，腹面较淡，有不规则的深褐色斑点，体背较密，口部有触须10条，眼小，下面无眼下刺。背鳍短，只有软鳍条8根和腹鳍相对，尾鳍、背鳍和臀鳍都呈圆形，鳞片细小，侧线完全。</p> <p>生态分布：我国各地水泽、水田中均有分布。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。能调中益气，利小便，壮阳，治皮肤瘙痒，痔疮下坠及疥疮发痒。用量：4~8两，炖汤服。</p>
818	虻虫	牛蚊子，牛苍蝇。	虻科	<p>动物形态：体长约17毫米。头阔，复眼大，触角分3节，第1、2节短，基节不呈球形，第3节的第一环节有1齿状突出物，其余4个环节呈球状，口器发达，为刺吸式，下唇宽阔，内面有1沟，唇端具有1对大唇瓣，内面有环沟，舌、下颚、上颚、上唇都落入下唇沟中，上唇和舌合拢时中间成一管腔，下颚须1对，分2节，胸部扁平被绒毛，中间一节最发达，中胸两旁有坚强宽广的翅1对，膜质，透明无斑纹，翅瓣大，腹部大，扁平椭圆，分7节，足强大，跗节末端具2爪，爪间有3个发达的肉垫。体暗灰色，颜面灰黄色，触角黄色。胸背具5条纵的灰白色条纹。腹部黑色，各节的后缘中央有三角形淡黄色斑点，翅稍带褐色；足黑，胫节黄色。</p> <p>用途：性味苦、寒，有毒。能破血逐瘀，通经堕胎；治月经闭止，小腹</p>

				硬痛，症瘕积聚及跌打仆伤痛等症。用量：1~1.5钱，作煎剂或散剂。无瘀结食滯者及孕妇忌用。
819	茴香虫	金凤蝶，黄凤蝶。	凤蝶科	<p>动物形态：体形大，展翅达95毫米，头上有细长的球棒状触角1对，及半圆球形复眼2个，口器为虹吸式，翅宽阔，色彩鲜艳，黄的底色中散布有黑色的斑纹，后翅具有一个尾状突。雌雄蝶的前足均很发达，前胫节上具有前胫突1枚，爪大，内缘光滑，不分叉，幼虫即茴香虫，形状与家蚕相似，体长约50毫米，体表光洁而无棘突，胸部有足3对，足皆分节，前胸前方中央具有黄色叉形的臭角1枚，受惊时能伸出体外，臭气散溢，节以御敌，后胸粗壮，腹部有假足5对，体浅绿色，有黑色环状条纹并间有金黄色斑点。</p> <p>生态分布：本种动物多寄生于茴香等植物上，以叶及嫩枝为食。幼虫生长发育成熟后就在植株上化蛹，蛹浅绿色或枯叶色，因尾端以丝缢体附着于植株上，故称为缢蛹。茴香栽培地方有分布。</p> <p>用途：性味甘、平，无毒。治胃气痛，小肠疝气及噎膈。将茴香虫以酒醉死，放瓦上焙干，研末，酒服或开水服。成人每次服3条，小儿每次服1条。胃有热及体虚者忌服。</p>
820	雄黄	明雄黄，雄精，腰黄，鸡冠石。	无	<p>性状：为形状不一的块状与粒状体，面较平整而光滑，色深红或橙红；外表带有黄色或橙色粉末。性脆易砸成粉。有砷的蒜臭味。多用水飞法制成粉末应用。</p> <p>分布：产于低温热液矿脉中。产温泉中是由含砷物质升华凝结而成。</p> <p>用途：性味辛，温。能燥湿，祛痰，杀虫，化療解毒消肿；治疥癬、恶疮，解蛇毒，疔疮痈肿；内服治惊痫，久疟等症。用量：内服1~4分；外用为主，内服宜慎。</p>
821	硫磺	石硫磺，鱼子黄。	无	<p>性状：通常结晶成锥体、板状、块状或粉状。性脆，具黄色、草黄、淡灰黄色。半透明至不透明。燃点为27度。易熔融，热至140度即溶化。制硫磺为硫磺与等量豆腐同煮至豆腐变黑色，取出硫磺，晒干。</p> <p>分布：硫常与石膏拌存，分布于火山口邻近。</p> <p>药用部分：天然硫不直接供药用，多经过炼制后入药。</p> <p>用途：性味酸、温，有毒。能补火壮阳，疏利大肠，杀虫。内服治阳痿，老人虚寒便闭。外用治疥癬疮痢。用量：内服5分~2钱。畏朴硝。</p>
822	猪	无	猪科	<p>动物形态：华南型猪，体短而宽，呈椭圆形，咀短额凹，耳小耸立，额面具有深的横纹。背宽但有凹背，后腿丰满。鬃毛粗长，毛色不一致，自全白到全黑各都有，但以黑白色者为多。</p> <p>药用部分：胆、肾、心、肺、肝、脑髓、小肚、尾椎骨、尾，前蹄均入药。</p> <p>用途：猪胆性味苦、寒，无毒。能除伤寒热渴，止干呕，通便结，清心热，凉肝火。治小儿五疳，明目及疔喉痹等症。猪肾（腰子）性味咸、冷，无毒。能补肾气，通膀胱。猪心性味甘、咸、平，无毒。能补心血，定惊悸。猪肺性味甘、寒，无毒。能补肺。猪肝苦、温，无毒。能补肝明目。猪脑髓性味甘、寒。能补骨髓，益虚劳。猪小肚（尿泡）治小儿遗尿。猪前蹄治妇人乳少。</p>
823	猫	无	猫科	<p>动物形态：体长约60厘米，面部略圆，躯干长，四肢较短，尾有长短之别，耳短小，末端尖，能自由转动，用以兜声，故善听；眼大，其瞳孔能随感光强弱而收放，正午收缩如线，夜中放大如钱，下颌关节嵌入颞颥骨窝，只能直动向咬物，不便横动咀嚼；唇有须，舌面粗，密生逆沟，适于舔食附骨的肉。门齿上下各6个；犬齿上下各2个，强大而锐；臼齿尖锐，上臼齿上6个，下4个；大臼齿上下各2个。前肢5趾，后肢4趾，皆有可以伸缩的锐爪；掌部有肉块如垫，行走无声。毛软，有黄、黑、白、灰褐色等色及狸斑。</p> <p>生态分布：我国各地均有饲养。</p> <p>药用部分：猫肉、猫涎、猫尿、猫屎、猫骨头、猫油等入药。</p> <p>用途：猫肉性味甘、酸、咸、温，无毒。治风湿痹痛，散療痲结核，补虚劳，消肿胀和疗烫火伤。用量：4~8两，炖汤或泡酒服。猫涎治療痲。</p>

			猫尿治老鼠咬伤。
824	黄牛	无	牛科 动物形态：黄牛是大形偶蹄动物。体强大，四肢短。公、母牛头上均有角1对，角弯形，生于头骨上，始终不脱；前额平，鼻阔，眼、耳皆大；上颚无门牙及犬牙，上、下颚之间齿皆强壮；喉至胸部有垂肉。肢具4趾为蹄，后2趾为悬蹄。毛短，以黄色居多，尾端具丛毛。 分布：我国各地均有饲养。 药用部分：胆囊中的胆汁入药，以汁浓，色绿褐者佳。 用途：性味苦、寒，无毒。能除心腹热渴，明目消肿。治惊疳，止下痢，疗口焦躁等症。
825	蛇蛻	龙衣，蛇皮，蛇壳子。	游蛇科 动物形态：黑眉锦蛇体长约1.7米喙端板宽稍大于高。上唇鳞片9片，眼前鳞2片，眼后鳞2片，颞颥鳞5片，体鳞微弱起棱，颈部25行，体中部23~25行，肛前19行，腹鳞雄性为230~259片，雌性237~248片，尾下鳞雄性93~105对，雌性84~95对，体背呈橄榄色，有黑色花纹，此花纹由黑纵线的小鳞片所组成，在体后三分之一处渐渐不显，体侧有2行或3行不明显的黑色点，愈近体后部愈暗淡。腹部淡黄色，具深色点及黑色带，带由吻端直达尾尖，头部褐色、黄色，从颊鳞至最后的2片上唇鳞的上半部有黑色横带，状如黑眉。 生态分布：我国各地均有分布。 用途：蛇蛻性味咸、平，有小毒。能驱风，杀虫，除翳。治痘后生翳，惊痫痉挛，皮肤疮毒及瘙痒疮等症。用量：5分~1钱。
826	斑蝥	斑猫，斑猫虫。	芫青科 动物形态：本品为鞘翅目昆虫，体大，长1.5~3厘米，黑色，被黑色绒毛，鞘翅具棕黄色或黄色斑纹及横带。头具粗密刻点，额中央有1条光滑纵纹，复眼大，略呈肾形。人触及时，其即放出热性毒烟，灼人皮肤，可引起水泡。 生态分布：多寄生于大豆、花生、棉花、茄子、芝麻，瓜类等植物上，我国各地有分布。 药用部分：全虫入药，秋季采收。 用途：性味辛、寒，有毒。利尿攻毒，破血，截疟。主治淋病，疯狗咬伤，恶疮，瘰癧，疔疮疥癣，疟疾。用量：1~2分，孕妇忌用。
827	蜈蚣	金头蜈蚣，耳孔蜈蚣。	蜈蚣科 动物形态：体长约15厘米，头圆形，前方有鞭状触角1对，由18节组成，触角两侧有由4个单眼集合成的眼1对。口器由1对大颚，两对小颚及由第1对步足特化的颚足组成，颚足与毒腺相连，躯干部由21个彼此相似的梯形环节构成，每节分界显明，胸部和腹部的界限不分，每体节有同形的步足1对，最后1对步足很长，向后如尾，体两侧有椭圆形的气门10对，头部橙红色，背面黑绿色，有光泽，步足黄绿色，腹面黄褐色。 生态分布：我国各地均有分布。 用途：性味辛、温，有毒。能镇惊息风。治小儿惊痫，中风口禁，破伤风，蛇咬伤及瘰癧、秃疮等症。用量：1~2条，作煎剂或散剂。
828	蜣螂	推屎爬，推车虫，铁甲将军，牛屎虫。	金龟甲科 动物形态：成虫体长约35毫米，体为椭圆形，背面隆起，上片扩大呈扇状，盖于头的上面，上颚片的背面有很多较大的刻点，中央有1粗短的角状突起，两侧有1微棱，基部两侧有复眼2个。前胸背板有前方的突起2个及很多较大的刻点，突起的两侧有凹窝1个，足强大，腿节甚发达，前足较短，为发达的开掘式，腿节上有1束金色长毛，胫节上有齿状的突起3个，活动的刺突1个，跗节5节，末端有爪，中足胫节有较小的齿状突起3个，活动的刺突1个，跗节5节，末端有2爪，前翅为鞘翅盖于中胸及腹部的背面，上面有许多纵行刻线和细小的刻点，后翅膜质透明，拆于鞘翅之下，全体呈漆黑色而有光泽，触角褐色，片状节3节，浅褐色，无光泽，上被灰白粉，后翅浅褐色，腹面除腹部外均密生褐黄色毛。 生态分布：我国各地有分布；常栖息在牛粪堆或人粪堆中。 药用部分：夏秋季捕捉全虫，加烧酒或开水杀死后晒干备用。 用途：性味咸、寒，有毒。能除热定惊化积，通便，散毒破瘀。治小儿惊痫，便秘虫疳，痔漏疽疮，瘰癧久疔及暴噎吐食等症。用量：3~8分，作丸剂或散剂。

829	滑石	画石	无	<p>性状：本品多呈叶片状，或粗粒状、细粒状之块，性柔滑且易起粉，呈白色、银白色或苹果绿，也有带灰绿色的。本品可磨粉生用，或水飞用。</p> <p>分布：普通产于蛇纹石、绿泥片岩中。</p> <p>用途：性味甘，寒。能利尿，渗湿，清暑。治淋病，癃闭，水肿，暑热，烦渴，水泻热痢等。用量：3~5钱，布包入煎。</p>
830	硼砂	月石	无	<p>性状：不规则的长圆块状，棱形或柱形的结晶，性脆，呈玻璃状至树脂状；白色，有时淡黄、淡灰、淡蓝或淡绿色。微具甜咸味。</p> <p>分布：通常在盐湖或矿泉中与石盐、石膏等共存。</p> <p>用途：性味甘、咸、凉。能除胸噎痰热，防腐解毒。外用于口腔炎、齿齦炎、咽喉炎、亦作眼炎洗涤剂。用量：内服1~5分，不宜久服，多作外用。</p>
831	磁石	吸铁石，活磁石。	无	<p>性状：本品呈不规则块状，多数为八面晶体，少数为菱形十二面体，多具棱角；外表铁黑色至棕褐色，不透明，有金属光泽，有的附有少许棕红色物。破碎后面不整齐，若置铁粉于其上，即被吸成直立，称为活磁石。由受潮起锈，多无吸铁能力。</p> <p>分布：是一种普通铁矿物，见于许多岩浆岩和变质岩中。</p> <p>用途：性味辛，寒。能补肾潜阳，益血安神，纳气平喘。治头目眩晕，耳鸣耳聋，虚喘，血虚心悸。用量：3钱~1两。</p>
832	蝉蜕	虫退，蝉衣，蝉壳，蝉脱壳。	蝉科	<p>动物形态：蝉全体长40~48毫米，达翅端则为63~65毫米。体黑色而有光泽，胸、腹两侧有白粉，体上被金黄色细毛，体分头、胸、腹三部。头大，头顶隆起，复眼两个，形大，单眼3个很接近，在头的背面呈“品”字形排列，触角1对短生成刚毛状，位于复眼间前方，口吻发达，为刺吸式。前胸背板小，中胸最大，呈盾状，后胸背板亦较发达。具足3对，腿节变粗，下缘有刺，跗节3节，缺爪间突。翅两对，均膜质透明而无斑纹，前翅大，后翅小，翅基部黑褐色，翅脉黑色，缘脉显著，翅静上时复在背部如屋脊状。腹部分7节，雄蝉腹部第一节间有特殊的发音器官，雌蝉同1部位有听器，蝉蜕为蝉所脱的衣质。全体为空壳，其形态与蝉一样惟无翅膀。</p> <p>生态分布：蝉多栖于杨柳树或其他树木上。</p> <p>药用部分：蝉蜕入药，夏初至树枝上或树下采收，晒干即成，去头脚。</p> <p>用途：性味咸、甘，寒。能镇痉透疹，祛风化毒。治外感风热，小儿惊痫，痉挛抽搐，咳嗽失音，斑疹未透及目生翳障等症。用量：1~2钱。</p>
833	蜗牛	天螺蛳	蜗牛科	<p>动物形态：壳形小，直径20毫米，高约14毫米，右旋螺层5.5转；外层增大，壳表黄褐色，具刻线甚密，有光泽，周缘偏上有1条狭窄的猪肝色带环绕；壳底深圆。壳口新月形，无壳盖，口缘略反曲，内面白色，脐孔中等大小。</p> <p>生态分布：陆栖，常生活于阴湿坡地，晨昏和雨后出来活动，吃植物的茎叶。</p> <p>用途：性味咸、寒，有小毒。治痔疮，脱肛，风邪惊痫。用量：2~3两作煎剂，捣涂或烧存性用。</p>
834	蝼蛄	低蛄，土狗。	蝼蛄科	<p>动物形态：成虫体淡黄褐色或暗褐色，全身密被短小软毛。雌虫体长3.1~3.3厘米，雄虫略小于雌虫，体长2.8~3厘米。头的大部分被前胸板盖住。头圆锥形，前尖后钝，暗褐色，长约4毫米，宽约3.5毫米。触角丝状，长度可达前胸的后缘，第1节膨大，第2节较细，仅相当于第1节四分之一，以下各节较细，长短粗细大致相同，复眼卵形，黄褐色。在复眼内侧的后方，颜面中央有较明显的单眼3个。口器发达，咀嚼式，小颚须6节，下唇须短小，2节。前胸背板坚硬膨大，呈卵形，背中央有1条下陷的纵沟，长约5毫米，前翅革质较短，黄褐色，仅达腹部中央，形状近三角形。后翅大，膜质透明，淡黄色，翅脉呈网状，静止时卷缩折叠如尾状，超出腹部。前足特别发达，基节大，圆形，腿节强大而略扁，胫节扁阔而坚硬，尖端有锐利的扁齿4枚。上面有两个齿较大且可活动，因而形成开掘足，适于挖掘洞穴隧道之用。后足也较发达，腿节大，在胫节背侧内缘有3~4个能活动的刺，是与它种蝼蛄区分的主要特征。腹部</p>

				<p>纺锤形，背面棕褐色，腹面色较丹呈黄褐色，末端2节的背面两侧有弯向内方向的刚毛，最末节上生有尾毛2根，伸出体外。</p> <p>生态分布：躲藏在有机肥沃的地中，喜欢在潮湿，温暖的沙质土壤中繁殖。</p> <p>药用部分：全虫入药。于夏秋之间耕地翻土时用手捉住，晒干。</p> <p>用途：性味咸、寒，无毒。能治水肿，小便不利。用量：1~2钱或3~5只。</p>
835	蜘蛛	蜘蛛虫，壁钱。	壁钱科	<p>动物形态：体较扁平，全体密生细毛。头、胸的横径长于直径，单眼分3列，胸甲广阔呈心脏形，腹部也似心脏形，步脚4对，较短，等长；头胸部浅棕色，脚的颜色较头胸部略浅，腹部灰黑色，背面有一圈不规则的浅黄色斑纹。</p> <p>生态分布：我国各地有分布，多在屋檐下结圆形、扁平如钱的网（白幕）。白天躲在幕中，夜间出来活动，以小虫为食。</p> <p>药用部分：全虫活个体或所结的网入药，临用捕捉。</p> <p>用途：性味咸、苦、平，无毒。攻毒散结。主治鼻血，金疮出血，扁桃体炎，疳疾及毒蛇咬伤。用量：1~2只，不可内服。</p>
836	蝙蝠	飞鼠	蝙蝠科	<p>动物形态：体长约66毫米，尾长34毫米，不穿出股间膜，前臀长约34毫米，前肢为皮膜状的翼，适于飞翔，拇指短，有钩爪，其余四指各节延长，由飞膜连接，后肢5趾同长，具钩爪，能悬垂在树枝上。吻简单，象老鼠，没有叶状鼻，耳有耳屏，两耳距离远，阴茎长约10毫米。全身暗棕色，耳褐色，腹部毛的基部暗棕色，尖端灰色，妊娠期两月，4~6月生产，每胎一子。</p> <p>药用部分：蝙蝠及其粪（夜明砂，檐老鼠屎，五灵脂）供药用，四季皆可收集。</p> <p>用途：叶明砂性味辛、寒，无毒。能消积聚，去翳障。治夜盲症，目内障，间歇热及久疟。外用治齿痛，耳漏及腋臭。用量：2~3钱，作煎剂或丸剂。</p>
837	鲤鱼	无	鲤科	<p>动物形态：体侧扁，棱形，黄色带金属光泽，鳍有时红棕色，重者可达5~6公斤，口部有须4条，背鳍长，有软鳍条19根，臀鳍短，有软鳍条5根，都具硬棘，棘后缘有锯齿，鳞片大，侧线上约有36片；咽齿3行，呈白齿状。</p> <p>生态分布：我国各地湖沼，水产场均有分布。</p> <p>用途：性味辛、咸、平，无毒。能开胃健脾，消水肿；治胃病，胸前胀痛及久咳等症。用量：2~8两，蒸汤服。</p>
838	鲫鱼	乌鳞鲫	鲤科	<p>动物形态：外形象鲤鱼，体略高，最重者达1公斤以上，口部无须，咽齿有1行，扁片形，背灰褐色，体侧较淡，腹面苍白色，鳍微黑色，背鳍有硬棘4根，软鳍条17根，臀鳍有硬棘3根，软鳍条5根，硬棘后缘有锯齿。体上鳞片大，侧线上有鳞30片左右，尾鳍呈叉形。</p> <p>生态分布：我国各地湖沼、池塘及水产区均有分布。</p> <p>用途：性味甘、咸、温，无毒。能温中健胃，滋阴补肾；治胃痛呕吐，走马牙疳，牙痛，并能补脑和涂恶核肿毒。用量：2~4尾。</p>
839	蕲蛇	五步蛇，棋盘蛇。	蝮科	<p>动物形态：卵生爬行动物，体长可达3~4尺左右，头大扁平，呈三角形，吻鳞和鼻孔、鼻尖鳞向上前方突出。吻鳞之长为宽的2倍，鼻孔大，开口于两鼻鳞之间，后鼻鳞向内凹入呈弧形，背面灰褐色，两面有V形斑纹，在体部有18个，尾部有6个，斑纹呈暗褐色，边缘褐色，其顶点达背部中线，因此左右侧斑纹往往相连，斑纹的下部达腹鳞。腹面黄白色。爬动缓慢，常将身体盘曲。其唾腺有毒，如被咬伤有生命危险，希急速治疗。</p> <p>生态分布：我国南北均有分布，多生活在高山深林之中。</p> <p>用途：性味甘、咸、温，有毒。祛风除湿，舒筋活络，镇痉攻毒。主治风湿关节炎，四肢筋脉拘急，半身不遂，口眼歪斜，破伤风，疥癩，梅毒恶疮等症。用量：1~3钱。血虚及风热者忌用。</p>
840	银环蛇	毛巾蛇，百节蛇，金钱白花蛇，小白花蛇。	眼镜蛇科	<p>动物形态：卵生爬行动物，多生活于平原及山脚多水处，常见于住宅附近。体长达1米以上，头部稍大于颈部，眼小。吻鳞的宽度远大于高。鼻间鳞的宽约为其长一倍半。前额鳞大，宽大于长，长为鼻间鳞的2倍。眼</p>

			<p>上鳞的长约和前额鳞的长相等。鼻孔椭圆形，并于两鼻鳞之间。体鳞光滑，全身概为15行（但颈部有16、18、或19行者）。背中央的一行鳞片特别大，呈六角形。腹鳞200~218片，肛鳞1片。尾下鳞单行，40~51片。尾细长而尖。体黑色，每隔3或3鳞半有宽约1鳞左右的白色横斑，体部35~45个，尾部9~16个。爬动迟缓，夜间活动，喜扑蛇鼠类、鱼类及其他蛇类。此蛇不受惊扰不致咬人。其唾腺中具剧烈的神经性毒，咬伤后死亡率高，须急速救治。</p> <p>生态分布：产我国长江流域以南各省。</p> <p>用途：同蕲蛇。</p>
841	壁虎	守宫，爬壁虎。	<p>壁虎科</p> <p>动物形态：外形象蜥蜴，但身体较小，体上被有颗粒状的小鳞，背腹扁平，尾呈圆锥状，四肢短，趾端有吸盘，各趾底面具单列片，瞳孔垂直，鼻孔至眼睛间的距离等于眼睛至耳孔间的距离。上唇鳞11片，颈鳞五角形，比邻近的下唇鳞片大，下唇鳞片9片，有1对后颈鳞与下颈鳞相连接，后颈鳞的两侧各有1大小相似的鳞片，后面有很多多角形的小鳞片，身体上无小的瘤状物，体暗灰棕色或黄灰色，并杂以暗黑色斑纹，可使其体色和所栖息的壁，石或树木的颜色相混淆。</p> <p>生态分布：我国气候温暖的地方有分布，多生活于旧屋内。</p> <p>用途：性味咸、寒，有小毒。能驱风，破血积包块，消瘰癧结核。治中风瘫痪手足不举，历节风痛，肿瘤，小儿疳疾，破伤风及蝎螫伤等症。</p> <p>用量：1~3条，炙焙研末兑服，亦可作散剂外用。</p>
842	蟑螂	偷油婆	<p>蜚蠊科</p> <p>动物形态：成虫体长约35毫米，椭圆形，背腹扁平，头部较小，向腹面倾斜，口器发达，成咀嚼式，触角1对，长线形，复眼较发达，肾形，位于触角之上，单眼两个，前胸扩大如盾状，盖于头上，足3对，基节甚阔大，盖于胸的腹部面及腹基部分，腿节及胫节上具刺，5节，末端有2爪，翅2对，掩盖腹部端，腹部末端有尾须1对，体茶褐色，有油样光泽，前胸背板中央有互相连接的大黑斑2个，边缘有宽大的黄色带纹。</p> <p>生态分布：生活于厨房，碗柜，门窗缝隙尖。</p> <p>用途：性味咸、寒，有毒。能散瘀，消积，解毒，治梅毒，喉生蛾子，小儿疳疾，蜈蚣，蛇虫毒及痈疮肿毒等症。用量：3~5只。</p>
843	蟋蟀	灶鸡，灶鸡子。	<p>蟋蟀科</p> <p>动物形态：体长11~14毫米，头阔大呈圆形，触角长线形，口器为发达的咀嚼式；前胸背板略扁平，跗节3节。雌雄异形，雌的腹部大，尾后有一产卵器，呈细管状，末端似矛头，长不达后足末端，体黑褐色。</p> <p>生态分布：多生活于较湿润的耕地，溪沟边，乱石堆或草丛中。</p> <p>用途：性味辛、温，无毒。能催生，通小便，发豆疹，治阳痿，水蛊及小儿遗尿。用量：2~4只。</p>
844	蟾蜍	癞蛤蟆	<p>蟾蜍科</p> <p>动物形态：形体较大，体长一般在100毫米以上，分头、躯干、四肢三部，颈不明显，无尾，躯干粗短，体表覆盖裸露的皮肤，背部棕灰色具黑色斑纹，并有多数瘤状突起，雄体的瘤状突起上有刺，腹部较少，为青白色，有黑色小点，皮肤上具有腺体，可使皮肤不干燥，头宽，吻端圆，无鋤骨齿，上下颌亦无齿，口上有1对鼻孔，头两侧有凸出的眼及圆形鼓膜，眼后有一对大而长的耳后腺，前肢短而粗壮，具4指，指间无蹼，后肢大，并较前肢长两倍，具5趾，趾间有蹼，体后端有一泄殖孔。</p> <p>生态分布：我国各地村落、城镇庭园中有分布。</p> <p>药用部分：蟾蜍肝、胆、分泌物以及蟾蜍割去内脏后作药用。</p> <p>用途：性味甘、辛、凉，有毒。能除湿气，化湿邪，杀虫积，治小儿疳积。外用治痈肿恶疮。用量：1.5~3钱。</p>
845	鳖	脚鱼，团鱼。	<p>鳖科</p> <p>动物形态：形似龟，与龟有显著不同的特征是体外被柔软多皱纹的皮肤，皮肤下方为椭圆形的中央隆起的骨质背甲，复盖全身，但不如龟的骨质甲发达。甲无缘板，边缘围绕软骨，习称“裙边”。头部有长而能活动的软吻，吻的尖端有鼻孔。颈长，头、颈能完全缩入甲内。趾间有蹼膜，全身无鳞片。</p> <p>生态分布：我国各地水泽均有分布。</p> <p>药用部分：鳖和鳖甲（背甲）入药。</p>

			用途：鳖性味咸、平，无毒。能滋阴补胃；治骨间劳热，妇女干病，臃疮久治不愈，痔漏脱肛。用量：1~2只。鳖甲性味咸、寒，无毒。能益阴潜阳，除热散节；治骨蒸劳热，通月经，散瘀血，疗疟母，治坚症。用量：3~6钱。
846	桐子蠹虫	油桐子树内虫	无 动物形态：系一种寄生于油桐（大戟科植物）树枝、树干内的一种白色昆虫，形如小蚕。 药用部分：全虫入药，秋冬采收。 用途：性味甘，寒。能消积健胃，润肺止咳；治小儿疳积，肺癆咳嗽。 用量：1~2条。